

Динамика частиц в гравитационном поле

В. Б. Беляев,

E-mail: wbelayev@yandex.ru

Динамика частиц в гравитационном поле исследуется с использованием механики Лагранжа. Получены динамические уравнения, включающие скорость передачи энергии и импульса гравитационному полю. Рассмотрено движение частиц в поле Шварцшильда и в случае слабой гравитации определена пассивная гравитационная масса фотона и материальной частицы при условии соотношения между гравитационным потенциалом и ее скоростью $\alpha / r \ll V^2 / c^2$. Найдена активная гравитационная масса для частного случая системы из двух одинаковых тел, движущихся в противоположных направлениях.

1. Введение.

В общей теории относительности (ОТО) определение импульсов материальных и световых частиц, движущихся в криволинейном пространстве-времени, и сил, действующих на них, имеет целью найти релятивистские поправки к теории тяготения Ньютона для слабого гравитационного поля. Если в качестве составляющих 4-вектора силы, действующей на материальную частицу единичной массы, рассматривать вторые производные координат по пути [1-3], то в ньютоновском пределе величина, играющая роль пассивной гравитационной массы, оказывается зависящей от направления движения частицы [4]. Это же имеет место и для фотона, если с 4-силой отождествлять вторые производные координат по аффинному параметру, в качестве которого выбирается координатное время.

Другим подходом является выбор лагранжиана частицы, определение обобщенных сил как его частных производных по координате в соответствии с механикой Лагранжа. [5-8]. В ОТО физические скорости частиц ставятся в соответствие компонентам контравариантного вектора 4-скорости. Поэтому с физической силой связывается вектор с верхними индексами, ассоциированный с вектором обобщенных сил. В этом случае пассивная гравитационная масса как материальной, так и световой частиц оказывается независящей от направления их движения. Энергией и импульсами частиц считаются компоненты контравариантного 4-вектора энергии-импульса, как это делается в [1] для частицы, движущейся в пространстве-времени Миньковского.

В доказательстве Фока движения света по геодезическим [9] в качестве гамильтониана берется времененная составляющая ковариантного вектора 4-скорости. Применение основанного на лагранжевой механике вариационного принципа стационарного интеграла энергии (ПСИЭ) к движению свето-подобной частицы в гравитационном поле [5-8] не приводит к нарушению изотропности светового пути. В [10] был предложен обобщенный принцип Ферма, в котором используется вариация интеграла временной компоненты вектора 4-скорости, дающий траекторию движения света, совпадающую с геодезической.

2. Уравнения Лагранжевой механики

В общей теории относительности рассматривается четырехмерное псевдориманово пространство-время с координатами x^i и метрическими коэффициентами g_{ij} , интервал в котором записывается в виде

$$ds^2 = g_{ij} dx^i dx^j. \quad (2.1)$$

Обозначим $u^i = dx^i / d\mu$ вектор 4-скорости частицы, где μ - изменяемый параметр. Получим уравнения ее динамики в общем виде.

Лагранжиану частицы L соответствуют ковариантные обобщенные импульсы

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial u^i} \quad (2.2)$$

и обобщенные силы

$$F_i = \frac{\partial L}{\partial x^i}. \quad (2.3)$$

Движение частицы определяется принципом стационарного действия Гамильтона $\delta S = 0$ при

$$S = \int_{\mu_0}^{\mu_1} L d\mu, \quad (2.4)$$

где μ_0 , μ_1 - значения параметра μ в точках, которые соединяют искомая траектория движения. Условие экстремума S приводит к уравнениям Эйлера-Лагранжа

$$\frac{d}{d\mu} \frac{\partial L}{\partial u^\lambda} - \frac{\partial L}{\partial x^\lambda} = 0$$

(2.5) С учетом выражений для обобщенных импульсов (2.2) и сил (2.3) эти уравнения переписываются в виде

$$\frac{dp_\lambda}{d\mu} - F_\lambda = 0. \quad (2.6)$$

Лагранжиан выбирается так, что с физическими энергией и импульсом частицы связываются контравариантные импульсы

$$p^j = g^{j\lambda} p_\lambda. \quad (2.7)$$

Гравитационной силе, действующей на нее, ставится в соответствие ассоциированный (2.3) вектор

$$F^l = g^{l\lambda} F_\lambda \quad (2.8)$$

Переходя к ним в уравнениях (2.6), находим

$$g_{\lambda i} F^i = g_{\lambda i} \frac{dp^i}{d\mu} + \frac{\partial g_{\lambda i}}{\partial x^l} u^l p^i. \quad (2.9)$$

Умножив эти уравнения на $g^{k\lambda}$ и суммируя по дважды встречающемуся индексу λ , получаем

$$F^k = \frac{dp^k}{d\mu} + g^{k\lambda} \frac{\partial g_{\lambda i}}{\partial x^l} u^l p^i. \quad (2.10)$$

Наличие второго члена в правой части отражает то, что в гравитационном поле сохраняется не 4-импульс одной лишь материи, а 4-импульс материи вместе с гравитационным полем (см. [1] § 96). Его компоненты выражают скорость изменения приобретенных гравитационным полем энергии и импульса при движении в нем частицы

$$\frac{d\ddot{p}^k}{d\mu} = g^{k\lambda} \frac{\partial g_{\lambda i}}{\partial x^l} u^l p^i. \quad (2.11)$$

Интегрирование этой величины по μ дает энергию и импульс, полученных гравитационным полем на некотором промежутке ее траектории. В результате уравнение (2.10) может быть записано в виде

$$F^k = \frac{dp^k}{d\mu} + \frac{dp^k}{d\mu}. \quad (2.12)$$

Из законов сохранения энергии и импульса следует, что сила, действующая на частицу равна по величине и противоположна по знаку силе, действующей источник гравитации со стороны частицы. Это эквивалентно выполнению третьего закона Ньютона.

3. Динамика материальной частицы

Рассмотрим динамику материальной частицы. Лагранжиан материальной частицы с массой покоя m следующий

$$L_m = cm\sqrt{g_{ij}u^i u^j}, \quad (3.1)$$

Для материальных частиц параметр μ совпадает с интервалом: $\mu = s$. С физическими энергией и импульсом частицы связываются контравариантные импульсы (2.7), принимающие вид

$$p^i = c u^i. \quad (3.2)$$

Такой выбор обусловлен тем, что только в этом случае компоненты 4-вектора импульса совпадают по знаку с компонентами вектора 4-скорости. Первая компонента определяет энергию частицы

$$E = cp^1. \quad (3.3)$$

Гравитационная сила, действующая на материальную частицу, ввиду (2.8) определяется формулой

$$Q^l = cF^l = \frac{1}{2}c^2mg^{l\lambda}\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^\lambda}u^i u^j. \quad (3.4)$$

Согласно общей теории относительности движение материальной частицы определяется уравнениями геодезической линии. Для материальной частицы при лагранжиане (3.1) они могут быть получены из принципа стационарного действия Гамильтона [9] и тождественны уравнениям (2.6).

4. Материальная частица в поле Шварцшильда

Гравитационное поле сферического тела вне его источника в сферических координатах $x^i = (ct, r, \theta, \varphi)$ описывается метрикой Шварцшильда

$$ds^2 = c^2 \left(1 - \frac{\alpha}{r}\right) dt^2 - \left(1 - \frac{\alpha}{r}\right)^{-1} dr^2 - r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2), \quad (4.1)$$

где постоянная

$$\alpha = \frac{2\gamma M}{c^2} \quad (4.2)$$

задается гравитационной постоянной γ и гравитационной массой тела M .

Получим вектор 4-скорости материальной частицы, движущейся в нем. Уравнения (2.6) для времени-подобного интервала при лагранжиане (3.1) для $i = 1, 3, 4$ примут вид

$$\frac{d}{ds} \left[\left(1 - \frac{\alpha}{r}\right) u^1 \right] = 0, \quad (4.3)$$

$$\frac{d}{ds}(r^2 u^3) - r^2 \sin \theta \cos \theta u^4 = 0, \quad (4.4)$$

$$\frac{d}{ds}(r^2 \sin^2 \theta u^4) = 0$$

(4.5)

Дополнительно из выражения для метрики (4.1) следует

$$\left(1 - \frac{\alpha}{r}\right)(u^1)^2 - \frac{1}{\left(1 - \frac{\alpha}{r}\right)}(u^2)^2 - r^2 \left[(u^3)^2 + \sin^2 \theta (u^4)^2\right] = 1 \quad (4.6)$$

Из уравнения (4.3) находим

$$\frac{cdt}{ds} = \eta \left(1 - \frac{\alpha}{r}\right)^{-1} \quad (4.7)$$

где η - постоянная. Выберем систему координат так, что движение частицы происходит в плоскости $\theta = \frac{\pi}{2}$, что дает

$$\frac{d\theta}{ds} = 0. \quad (4.8)$$

Тогда (4.5) приносит

$$\frac{d\varphi}{ds} = \frac{A}{r^2}, \quad (4.9)$$

где A - постоянная. Подставляя (4.7)-(4.9) в (4.6), получаем

$$\frac{dr}{ds} = \pm \sqrt{\eta^2 - \left(1 + \frac{A^2}{r^2}\right)\left(1 - \frac{\alpha}{r}\right)}. \quad (4.10)$$

Деление (4.10) на (4.7) дает

$$\dot{r} = \pm c \left(1 - \frac{\alpha}{r}\right) \sqrt{1 - \frac{1}{\eta^2} \left(1 + \frac{A^2}{r^2}\right) \left(1 - \frac{\alpha}{r}\right)}. \quad (4.11)$$

Для мировых линий с неограниченным r значение η определяется величиной радиальной скорости на бесконечности $\dot{r} = V$ и составит

$$\eta_1 = \left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)^{-1/2}. \quad (4.12)$$

Если траектория свободно движущейся частицы такова, что радиальная координата имеет конечное экстремальное значение r_{ext} , то уравнение (4.11) ввиду условия $\dot{r}(r_{ext}) = 0$ приносит

$$\eta_2 = \left[\left(1 + \frac{A^2}{r_{ext}^2}\right) \left(1 - \frac{\alpha}{r_{ext}}\right) \right]^{1/2} \quad (4.13)$$

Для неограниченных по радиусу траекторий, имеющих ось симметрии, выполняется $\eta_1 = \eta_2$.

Подставляя найденные компоненты вектора 4-скорости в выражение для вектора гравитационной силы (3.4), действующей на материальную частицу, находим его единственную ненулевую компоненту

$$Q^2 = \frac{c^2 m \alpha}{r^2} \left(\frac{1}{2} - \frac{\eta^2 r}{r - \alpha} \right) + \frac{c A^2}{r^3} \left(1 - \frac{\alpha}{2r}\right). \quad (4.14)$$

При слабой гравитации, неограниченном радиальном движении ($A = 0$, $\eta = \eta_1$) и $\alpha / r \ll V^2 / c^2$ она преобразуется к виду

$$\tilde{Q}^2 = -\frac{c^2 m \alpha}{2 r^2} \left(\frac{c^2 + V^2}{c^2 - V^2} \right). \quad (4.15)$$

Однако при рассмотрении нерадиального движения ($A \neq 0$) во избежание появления фиктивной составляющей силы, обусловленной использованием сферической системы координат, следует использовать изотропную форму метрики Шварцшильда в прямоугольных координатах (ct, x, y, z) . К ней можно перейти с помощью преобразования

$$r = \left(1 + \frac{\alpha}{4\bar{r}} \right)^2 \bar{r}, \quad (4.16)$$

$$x = \bar{r} \cos \theta \cos \varphi, \quad y = \bar{r} \cos \theta \sin \varphi, \quad z = \bar{r} \sin \theta, \quad (4.17)$$

которое приносит

$$ds^2 = c^2 \left(\frac{1 - \frac{\alpha}{4\bar{r}}}{1 + \frac{\alpha}{4\bar{r}}} \right)^2 dt^2 - \left(1 + \frac{\alpha}{4\bar{r}} \right)^4 (dx^2 + dy^2 + dz^2). \quad (4.18)$$

Будем рассматривать движение в плоскости $z = 0$ и искать силу, действующую на частицу, в точке с координатами $(ct, x, 0, 0)$, соответствующими $\theta = \varphi = 0$ в сферической системе отсчета. Получаем при преобразованиях координат в плоскости

$$x = \bar{r} \cos \varphi, \quad y = \bar{r} \sin \varphi \quad (4.19)$$

в рассматриваемой точке соответствуют ненулевые пространственные компоненты вектора 4-скорости в прямоугольной системе координат

$$u_r^2 = \frac{dx}{d\mu} = \frac{d\bar{r}}{d\mu}, \quad u_r^3 = \frac{dy}{d\mu} = \frac{d\varphi}{d\mu} \bar{r} \quad (4.20)$$

при $\mu = s$ для материальной частицы. Из преобразования (4.16) следует

$$dr = \left(1 - \frac{\alpha^2}{16\bar{r}^2} \right) d\bar{r}. \quad (4.21)$$

Ввиду ковариантности уравнений геодезических можно перейти от их решений для метрики Шварцшильда в сферических координатах (4.7)-(4.10) к решению для метрики (4.18), сделав в них преобразование (4.16)-(4.17) и подставив в (4.20). В результате находим ненулевые компоненты вектора 4-скорости:

$$u_r^1 = \eta \left(\frac{1 + \frac{\alpha}{4\bar{r}}}{1 - \frac{\alpha}{4\bar{r}}} \right)^2, \quad (4.22)$$

$$u_r^2 = \pm \frac{1}{\left(1 - \frac{\alpha^2}{16\bar{r}^2} \right)} \left[\eta^2 - \left(1 + \frac{A^2}{\bar{r}^2 \left(1 + \frac{\alpha}{4\bar{r}} \right)^4} \right) \left(\frac{1 - \frac{\alpha}{4\bar{r}}}{1 + \frac{\alpha}{4\bar{r}}} \right)^2 \right]^{1/2}, \quad (4.23)$$

$$u_r^3 = \frac{A}{\bar{r} \left(1 + \frac{\alpha}{4\bar{r}} \right)^4} \quad (4.24)$$

Подставляя полученные компоненты вектора 4-скорости в выражение для силы (3.4) получаем единственную ее ненулевую компоненту

$$Q_{rest}^2 = -\frac{c^2 m \alpha}{2 \bar{r}^2 \left(1 + \frac{\alpha}{4 \bar{r}}\right)^3} \left(\eta^2 \left[\left(1 - \frac{\alpha}{4 \bar{r}}\right)^{-3} + \left(1 - \frac{\alpha}{4 \bar{r}}\right)^{-2} \right] - \left(1 + \frac{\alpha}{4 \bar{r}}\right)^{-2} \right). \quad (4.25)$$

Это выражение не зависит от постоянной A , определяемой угловой скоростью (4.9), в случае частицы, движущейся по неограниченной мировой линии, чему соответствует постоянная η (4.12). При слабой гравитации и $\alpha / r \ll V^2 / c^2$ компонента силы Q_{rest}^2 совпадет с выражением для силы в сферических координатах при радиальном движении (4.15). Оно является законом гравитации Ньютона при пассивной гравитационной массе материальной частицы

$$m_p^g = m \frac{c^2 + V^2}{c^2 - V^2}. \quad (4.26)$$

Однако в общем случае ввиду нековариантности вектора силы (3.4) при преобразованиях координат (4.16), (4.17) в формуле для силы в поле Шварцшильда в сферических координатах (4.14) полученное выражение не совпадет с (4.25) и для радиального движения частицы. В качестве примера рассмотрим гравитационную силу, действующую на неподвижную материальную частицу. Этому случаю соответствуют постоянные $A = 0$, $\eta = \eta_2$ и расстояние от центра $r = r_{ext}$. Ненулевая компонента вектора силы (4.14) примет вид

$$Q^2 = -\frac{c^2 m \alpha}{2 \bar{r}^2 \left(1 + \frac{\alpha}{4 \bar{r}}\right)^2} \quad (4.27)$$

а полученная для метрики в изотропных прямоугольных координатах компонента (4.25) при подстановке (4.16) составит

$$Q_{rest}^2 = -\frac{c^2 m \alpha \left(1 - \frac{\alpha}{2 \bar{r}} - \frac{15 \alpha^2}{16 \bar{r}^2} + \frac{\alpha^4}{64 \bar{r}^4}\right)}{2 \bar{r}^2 \left(1 - \frac{\alpha}{4 \bar{r}}\right)^2 \left(1 + \frac{\alpha}{4 \bar{r}}\right)^5}. \quad (4.28)$$

Поэтому об аналогии с ньютоновской гравитацией и гравитационной массе материальной частицы можно говорить только в пределе слабой гравитации.

5. Частный случай системы, состоящей из двух движущихся тел

Рассмотрим систему из двух тел А и В с одинаковой массой M . Предполагаем, что они движутся в противоположных направлениях в системе отсчета $K' = (t', x', y', z')$ с одинаковыми по величине скоростями v и $-v$. Будем считать, что в момент времени $t' = 0$ их расположение таково, что для определения создаваемой этой системой гравитации в рассматриваемой области расстоянием δr между ними можно пренебречь.

При слабой гравитации метрика (4.18) в приближенном виде становится следующей

$$ds^2 = c^2 \left(1 - \frac{\alpha}{\bar{r}}\right) dt^2 - \left(1 + \frac{\alpha}{\bar{r}}\right) (dx^2 + dy^2 + dz^2). \quad (5.1)$$

Применим к ней преобразования Лоренца

$$t = \frac{t' + \frac{\tilde{v}}{c^2} x'}{\sqrt{1 - \frac{\tilde{v}^2}{c^2}}}, \quad x = \frac{x' + \tilde{v} t'}{\sqrt{1 - \frac{\tilde{v}^2}{c^2}}}, \quad y = y', \quad z = z' \quad (5.2)$$

при условии $\alpha / \delta r \ll \tilde{v}^2 / c^2$. Оно означает, что искажения пространства и времени, вызываемые наличием Лоренц-фактора будут на порядок больше того, что вызывает гравитация. Поэтому влияние гравитации на преобразования Лоренца в данном случае можно считать несущественным и применять их к метрике (5.1). Преобразование координат при

$$\vec{r}' = \sqrt{\left(\frac{x' + \tilde{v}t'}{\sqrt{1 - \frac{\tilde{v}^2}{c^2}}} \right)^2 + y'^2 + z'^2} \quad (5.3)$$

приносит

$$ds^2 = c^2 \left(1 - \frac{c^2 + \tilde{v}^2}{c^2 - \tilde{v}^2} \frac{\alpha}{\vec{r}'} \right) dt'^2 - \frac{4c^2 \tilde{v}}{c^2 - \tilde{v}^2} \frac{\alpha}{\vec{r}'} dt' dx' - \left(1 + \frac{c^2 + \tilde{v}^2}{c^2 - \tilde{v}^2} \frac{\alpha}{\vec{r}'} \right) dx'^2 - \left(1 + \frac{\alpha}{\vec{r}'} \right) (dy'^2 + dz'^2). \quad (5.4)$$

В системах отсчета K_A , K_B , связанных с рассматриваемыми телами, гравитация каждого из них в отдельности описывается в соответствующей системе метрикой (5.1). Перейдем от этих систем к системе координат K' , с помощью преобразований Лоренца при

$$\tilde{v} = v \quad (5.5)$$

и

$$\tilde{v} = -v. \quad (5.6)$$

Если представить метрические коэффициенты в виде $g_{ij} = \eta_{ij} + h_{ij}$, где η_{ij} - соответствуют метрике Миньковского, то в случае слабой гравитации при рассмотрении общего поля, создаваемого n подсистемами [1] с метрическими коэффициентами $g_{ij}^n = \eta_{ij} + h_{ij}^n$, выполняется соотношение $h_{ij} \approx \sum_n h_{ij}^n$. Суммируя поля, получаемые после подстановок (5.5) и (5.6) в метрику (5.4), находим интервал пути для времени близком к $t' = 0$ в системе из двух тел:

$$ds^2 = c^2 \left(1 - \frac{c^2 + v^2}{c^2 - v^2} \frac{\alpha_1}{\vec{r}'} \right) dt'^2 - \left(1 + \frac{c^2 + v^2}{c^2 - v^2} \frac{\alpha_1}{\vec{r}'} \right) dx'^2 - \left(1 + \frac{\alpha_1}{\vec{r}'} \right) (dy'^2 + dz'^2) \quad (5.7)$$

при $\alpha_1 = 2\alpha$.

Получим ускорение материальной частицы в момент времени, когда она поконится в системе отсчета K' . Будем использовать уравнения геодезических

$$\frac{du^i}{ds} + \Gamma_{kl}^i u^k u^l = 0, \quad (5.8)$$

где $\Gamma_{ij}^l = \frac{1}{2} g^{lk} \left(\frac{\partial g_{jk}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{ik}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \right)$ - символы Кристоффеля. Для пространственных

координат с индексами $k = 2, 3, 4$ находим

$$\frac{du^k}{ds} = \frac{1}{2} g^{kk} \frac{\partial g_{11}}{\partial x^k} (u^1)^2. \quad (5.9)$$

При умножении на коэффициент $c^2 m$ правая часть этого выражения совпадет с гравитационной силой (3.4), так как неподвижная частица не передает импульс (2.11) гравитационному полю:

$$\frac{d\ddot{p}^k}{ds} = 0. \quad (5.10)$$

Уравнения (5.9) без учета малых величин большего порядка приносят координатные ускорения

$$\ddot{x}' = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{c^2 x'}{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \frac{c^2 + v^2}{c^2 - v^2} \frac{\alpha_1}{r'^3}, \quad \ddot{y}' = -\frac{1}{2} c^2 y' \frac{c^2 + v^2}{c^2 - v^2} \frac{\alpha_1}{r'^3}, \quad \ddot{z}' = -\frac{1}{2} c^2 z' \frac{c^2 + v^2}{c^2 - v^2} \frac{\alpha_1}{r'^3}. \quad (5.11)$$

в момент времени $t' = 0$. Если пространственный радиус-вектор частицы перпендикулярен линии движения тел ($x' = 0$), то полученный результат соответствует ньютоновской гравитации при активной гравитационной массе материальной частицы

$$M_1^g = M_1 \frac{c^2 + v^2}{c^2 - v^2}, \quad (5.12)$$

где $M_1 = 2M$. При $v = V$ эта формула тождественна соотношению между массой покоя частицы и ее пассивной гравитационной массой (4.26). Наличие Лоренц-фактора в качестве коэффициента при координате x' обусловлено тем, что движение частицы рассматривается в системе отсчета, относительно которой источники гравитации движутся вдоль этой координаты.

6. Принцип стационарного интеграла энергии

Для определения динамики фотона в гравитационном поле будем использовать ПСИЭ [5-8]. Рассмотрим интервал в псевдоримановом пространстве-времени с метрическими коэффициентами \tilde{g}_{ij} :

$$ds^2 = \tilde{g}_{ij} dx^i dx^j, \quad (6.1)$$

где $\tilde{g}_{11} = \rho^2 g_{11}$, $\tilde{g}_{1p} = \rho g_{1p}$, $\tilde{g}_{pq} = g_{pq}$ при $p, q = 2, 3, 4$. Движению света соответствует условие $ds = 0$. При $g_{11} \neq 0$ переменная ρ задается выражением

$$\rho = \frac{-g_{1p} u^p + \sigma \sqrt{(g_{1p} g_{1q} - g_{11} g_{pq}) u^p u^q}}{g_{11} u^1}, \quad (6.2)$$

где σ принимает значения ± 1 , а 4-скорости u^i определяются при условии, что μ является аффинным параметром. Далее будут рассматриваться вариации функции (6.2) вблизи ее значения $\rho = 1$, которому соответствуют метрические коэффициенты $\tilde{g}_{ij} = g_{ij}$.

Если $g_{11} = 0$ и хотя бы для одного p выполняется $g_{1p} \neq 0$, то получим

$$\rho = -\frac{g_{pq} u^p u^q}{2 g_{1k} u^1 u^k}, \quad (6.3)$$

где k принимает значения 2, 3, 4.

Лагранжиан свободно движущейся частицы берется в виде

$$L = -\rho. \quad (6.4)$$

Для обоих значений ρ (6.2), (6.3) ковариантные обобщенные импульсы (2.2) и силы (2.3) примут вид

$$p_\lambda = \frac{u_\lambda}{u^1 u_1}, \quad (6.5)$$

$$F_\lambda = \frac{1}{2 u_1 u^1} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^\lambda} u^i u^j. \quad (6.6)$$

Следует отметить, что величины F_λ формируют вектор, который не является тензором. Выбранный Лагранжиан соответствует соотношению

$$\rho = u^\lambda \frac{\partial L}{\partial u^\lambda} - L, \quad (6.7)$$

являющимся интегралом движения [11] и, соответственно, ρ будет энергией системы, объединяющей фотон и гравитационное поле, задаваемое метрикой (2.1).

Уравнения движения находятся из принципа стационарного действия Гамильтона (2.4), которое ввиду (6.4) может быть записано в форме

$$S = - \int_{\mu_0}^{\mu_1} \rho d\mu. \quad (6.8)$$

Величина ρ ненулевая, ее вариации оставляют интервал светоподобным. Уравнения движения будут уравнениями Эйлера-Лагранжа (2.5).

Контравариантный вектор обобщенных импульсов записывается в виде

$$p^\lambda = \frac{1}{u^1 u_1} u^\lambda. \quad (6.9)$$

В пространстве Миньковского при аффинном параметре $\mu = ct$ физические энергия и импульс фотона с частотой V составляют контравариантный 4-вектор импульса $\pi^i = (hV/c)u^i$, где h - постоянная Планка. При произвольном аффинном параметре он переписывается в виде

$$\pi^i = \frac{hV}{c} \frac{u^i}{u^1}. \quad (6.10)$$

И для псевдориманова пространства-времени аналогичные энергия и импульс фотона в координатной системе отсчета связываются с контравариантными импульсами. Полагая, что V_0 - некоторое фиксированное значение частоты фотона, такое, что выполняется $V = V_0 / u_1$, и сравнивая выражения для π^i и p^i , получаем

$$\pi^i = \frac{hV_0}{c} p^i. \quad (6.11)$$

Лаграгжиан (6.4) соответствует частице с единичной энергией. Для фотона он выбирается следующим:

$$L_{ph} = \frac{hV_0}{c} L. \quad (6.12)$$

В этом случае компонентам ассоциированного вектора обобщенных сил

$$F^l = g^{l\lambda} \frac{1}{2u_1 u^1} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^\lambda} u^i u^j \quad (6.13)$$

ставятся в соответствие гравитационные силы

$$Q^l = hV_0 F^l \quad (6.14)$$

7. Согласованность ПСИЭ для фотона и обобщенного принципа Ферма

Принцип Ферма для стационарного гравитационного поля [1,12] формулируется следующим образом

$$\delta t = \frac{1}{c} \delta \int \frac{1}{g_{11}} (dl - g_{1k} dx^k) = 0, \quad (7.1)$$

где элемент пространственного расстояния вдоль луча есть

$$dl^2 = \left(\frac{g_{1p} g_{1q}}{g_{11}} - g_{pq} \right) dx^p dx^q \quad (7.2)$$

Обозначив

$$df = \frac{1}{g_{11}} (dl - g_{1k} dx^k) \quad (7.3)$$

и сравнивая это выражение с (6.2), при $\sigma = 1$ записываем

$$\frac{df}{d\mu} = \rho u^1. \quad (7.4)$$

Поэтому вариация интеграла (7.1) равносильна вариации

$$S_F = \int_{\mu_0}^{\mu_1} \rho u^1 d\mu \quad (7.5)$$

В [10] предложен обобщенный принцип Ферма с применением принципа минимума Понтрягина из теории оптимального контроля. Данный подход распространяет принцип Ферма для стационарного гравитационного поля на нестационарные метрики. Получены динамические уравнения

$$Q = u^1, \quad (7.6)$$

$$\frac{d}{d\mu} \left(\frac{\partial Q}{\partial \dot{x}^q} \right) - \frac{\partial Q}{\partial x^q} - \frac{\partial Q}{\partial x^1} \frac{\partial Q}{\partial \dot{x}^q} = 0 \quad (7.7)$$

и показано, что их решения являются изотропными геодезическими.

Докажем, что эти уравнения тождественны уравнениям Эйлера-Лагранжа (2.5) при лагранжиане (6.4). Функция Q [10] совпадает с выражением для производной $df/d\mu$, получаемым из уравнения (7.3), при условии, что метрические коэффициенты зависят также и от времени. Поэтому из уравнения (7.4) следует выражение для энергии

$$\rho = \frac{Q}{u^1}. \quad (7.8)$$

Ввиду (6.9) уравнения (2.5) для пространственных координат приносят

$$\frac{1}{u^1} \frac{d}{d\mu} \left(\frac{\partial Q}{\partial u^q} \right) - \frac{1}{(u^1)^2} \frac{\partial Q}{\partial u^q} \frac{du^1}{d\mu} - \frac{1}{u^1} \frac{\partial Q}{\partial x^q} = 0. \quad (7.9)$$

Для временной координаты ($\lambda = 1$) из уравнений Эйлера-Лагранжа в форме (2.6) при обобщенных импульсах (6.5) и силах (6.6) следует

$$\frac{du^1}{d\mu} + \frac{u^1}{2u_1} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^1} u^i u^j = 0. \quad (7.10)$$

Сравнивая это уравнение и следующее из (2.3), (6.4) и (6.6) соотношение

$$\frac{\partial \rho}{\partial x^\lambda} = -\frac{1}{2u_1 u^1} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^\lambda} u^i u^j, \quad (7.11)$$

ввиду (7.8) получаем

$$\frac{du^1}{d\mu} = (u^1)^2 \frac{\partial(Q/u^1)}{\partial x^1} = u^1 \frac{\partial Q}{\partial x^1}. \quad (7.12)$$

Подстановка этого выражения в уравнения (7.9) и умножение их на u^1 дает уравнения (7.7). То есть, тождественность уравнений, полученных с помощью обобщенного принципа Ферма и ПСИЭ для свето-подобной частицы доказана. Ввиду эквивалентности решений, полученных из первого принципа, изотропным геодезическим, решения, следующие из второго принципа, также им эквивалентны. По сравнению с принципом Ферма ПСИЭ дает систему уравнений, которая имеет на одно уравнение больше. Это позволяет однозначно определить аффинный параметр и вектор энергии-импульса частицы.

8. Общий вид выражения для силы

Уравнение (2.12) для действующей на фотон силы (6.13) принимает вид

$$\frac{dp^k}{d\mu} + g^{kl} \frac{\partial g_{li}}{\partial x^l} u^l p^i = g^{kl} \frac{1}{2u_1 u^1} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l} u^i u^j. \quad (8.1)$$

Произведем замену аффинного параметра

$$d\bar{\mu} = d\mu \cdot u_1 u^1. \quad (8.2)$$

Выражение для импульсов (6.9) примет вид

$$p^l = \bar{u}^l, \quad (8.3)$$

где 4-скорость определяется как $\bar{u}^l = du^l/d\bar{\mu}$. Подстановка (8.2) в выражение (8.1) приносит

$$\frac{dp^k}{d\bar{\mu}} + g^{kl} \frac{\partial g_{li}}{\partial x^l} \bar{u}^l p^i = g^{kl} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l} \bar{u}^i \bar{u}^j. \quad (8.4)$$

Правая часть этой формулы с точностью до коэффициента совпадает с силой (3.4), действующей на материальную частицу единичной энергии. Она является ковариантной для линеаризованных метрик.

9. Динамика фотона в поле Шварцшильда

Рассмотрим динамику светоподобной частицы в статическом центрально-симметричном гравитационном поле, описываемом метрикой Шварцшильда (4.1).

Обобщенные импульсы (6.5) для циклических координат t, φ являются постоянными движения

$$B = \frac{cdt}{d\mu}, \quad (9.1)$$

$$C = r^2 \sin^2 \theta \frac{d\varphi}{d\mu} (1 - \alpha/r)^{-1}. \quad (9.2)$$

При $B = 1$ ввиду (6.9) и (6.11) временная компонента вектора 4-скорости соответствует величине энергии фотона

$$E_{ph} = c\pi^1 \quad (9.3)$$

на удалении от центра гравитации $E_{ph0} = h\nu_0$. Рассматривая движение в плоскости $\theta = \pi/2$ получим угловую компоненту вектора 4-скорости

$$\frac{d\varphi}{d\mu} = \frac{C}{r^2} \left(1 - \frac{\alpha}{r} \right) \quad (9.4)$$

Для изотропных кривых ($ds = 0$) из (4.1) находим

$$\frac{dr}{d\mu} = \pm \sqrt{\left(1 - \frac{\alpha}{r} \right)^2 - \left(\frac{C}{r} \right)^2 \left(1 - \frac{\alpha}{r} \right)^3}. \quad (9.5)$$

Единственной ненулевой компонентой ассоциированного вектора обобщенных сил (6.13) является

$$F^2 = -\frac{\alpha}{r^2} + \frac{C^2}{r^3} \left(1 - \frac{\alpha}{r} \right) \left(1 - \frac{\alpha}{2r} \right) \quad (9.6)$$

При радиальном движении, $C = 0$, она равна

$$F^2 = -\frac{\alpha}{r^2}, \quad (9.7)$$

что совпадает с удвоенной силой, действующей на частицу в ньютоновской гравитации. Ввиду (6.14) она соответствует пассивной гравитационной массе фотона

$$m_p^{ph} = \frac{2h\nu_0}{c^2}. \quad (9.8)$$

Этот результат согласуется с мысленным экспериментом по «взвешиванию» фотона [13], в котором он совершает периодическое движение в вертикальном направлении между двумя горизонтальными отражающими поверхностями.

При рассмотрении нерадиального движения во избежание появления фиктивной составляющей силы, обусловленной сферичностью системы координат, воспользуемся формой метрики Шварцшильда в прямоугольных координатах (4.18). Так же как и для материальной частицы, будем рассматривать движение в плоскости $z = 0$ и искать силу, действующую на светоподобную частицу в точке с координатами $(ct, x, 0, 0)$, что соответствует значению угловой координаты $\varphi = 0$ в сферической системе отсчета. Поскольку 4-скорости являются ковариантными векторами, то от решений уравнений движения светоподобной частицы (9.1), (9.4), (9.5) к компонентам вектора 4-скорости в прямоугольной системе координат можно перейти с помощью преобразований (4.20). Его ненулевые компоненты с учетом (4.16) и (4.21) примут вид

$$u^1 = 1, \quad u^2 = \pm \frac{\left(1 - \frac{\alpha}{4\bar{r}}\right)}{\left(1 + \frac{\alpha}{4\bar{r}}\right)^3} \left[1 - \frac{C^2 \left(1 - \frac{\alpha}{4\bar{r}}\right)^2}{\bar{r}^2 \left(1 + \frac{\alpha}{4\bar{r}}\right)^6} \right]^{1/2}, \quad u^3 = \frac{C \left(1 - \frac{\alpha}{4\bar{r}}\right)^2}{\bar{r} \left(1 + \frac{\alpha}{4\bar{r}}\right)^6}. \quad (9.9)$$

Подставляя эти значения и

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 - \frac{\alpha}{4\bar{r}} \\ \frac{\alpha}{4\bar{r}} \\ 1 + \frac{\alpha}{4\bar{r}} \end{pmatrix}, \quad (9.10)$$

в (6.13), находим единственную ненулевую компоненту вектора силы, действующей на светоподобную частицу:

$$F^2 = -\frac{\alpha \left(1 - \frac{\alpha}{8\bar{r}}\right)}{\bar{r}^2 \left(1 + \frac{\alpha}{4\bar{r}}\right)^5 \left(1 - \frac{\alpha}{4\bar{r}}\right)}. \quad (9.11)$$

Она преобразуется к виду

$$F^2 = -\frac{\alpha \left(1 - \frac{\alpha}{8\bar{r}}\right)}{r^2 \left(1 - \frac{\alpha^2}{16\bar{r}^2}\right)}. \quad (9.12)$$

Обобщенная сила, действующая на фотон, не зависит от направления его движения. Это выражение отличается от формулы (9.7), соответствующей радиальному движению в сферических координатах, что является следствием нековариантности вектора F^i . Однако в пределе слабой гравитации ($r \gg \alpha$) эти выражения асимптотически сходятся и дают закон тяготения Ньютона при пассивной гравитационной массе фотона (9.8), равной удвоенной гравитационной массе материальной частицы эквивалентной ему энергии.

Гравитационное поле потока электромагнитного излучения определяется из решения уравнений Эйнштейна $R_j^i - \frac{1}{2} \delta_j^i R = \chi T_j^i$ для тензора энергии-импульса электромагнитного поля $T_{ij}^{EM} = \frac{1}{4} g_{ij} F_{kl} F^{kl} - F_i^k F_{jk}$, где F_{ij} - тензор электромагнитного поля. В случае слабой гравитации из анализа ускорения материальной частицы в нем следует, что активная гравитационная масса пучка света или светового пакета в два раза больше аналогичной массы стержня равной ему энергии [14-16]. Следует отметить, однако, что гравитационное взаимодействие между электромагнитным излучением и материальными частицами отличается от этого взаимодействия между фотонами. Равенство активной и пассивной гравитационных масс фотона означает выполнение 3-го закона Ньютона при гравитационном взаимодействии света и материальных частиц и законов сохранения энергии и импульса.

10. Гравитационное красное смещение

Покажем, что значения энергии материальной частицы (3.3) и фотона (9.3) в поле Шварцшильда соответствуют гравитационному красному смещению. Оно определяется изменением соотношения между энергией статической материальной частицы и фотона [17]. В качестве материальной частицы может рассматриваться отдельный атом.

Найдем энергию материальной частицы, неподвижной в поле Шварцшильда. Ей будет соответствовать точка с максимальным радиусом траектории, задаваемой постоянной $\eta = \eta_2$ (4.13) при $A = 0$, которая составит

$$\eta = \left(1 - \frac{\alpha}{r_{ext}}\right)^{1/2}. \quad (10.1)$$

Подставляя это значение в выражение для 1-й компоненты вектора 4-скорости (4.7), при $r = r_{ext}$ получим

$$u^1 = \left(1 - \frac{\alpha}{r_{ext}}\right)^{-1/2}, \quad (10.2)$$

что ввиду (3.2) соответствует энергии неподвижной материальной частицы

$$E = \left(1 - \frac{\alpha}{r}\right)^{-1/2} E_0, \quad (10.3)$$

где $E_0 = mc^2$ - ее энергия покоя в собственной системе отсчета.

Энергия фотона (9.3) ввиду (6.9) и (6.11) составляет

$$E_{ph} = \frac{h\nu_0}{u_1}. \quad (10.4)$$

В поле Шварцшильда при временной компоненте вектора 4-скорости $u^1 = 1$ она примет вид

$$E_{ph} = h\nu_0 \left(1 - \frac{\alpha}{r}\right)^{-1}. \quad (10.5)$$

Здесь ν_0 соответствует частоте фотона в точке траектории на удалении от центра гравитации ($r \rightarrow \infty$). При обозначении энергии фотона в этой точке E_{ph0} это выражение переписывается как

$$E_{ph} = E_{ph0} \left(1 - \frac{\alpha}{r}\right)^{-1}. \quad (10.6)$$

Отношение энергии фотона к энергии неподвижной материальной частицы следующее:

$$\frac{E_{ph}}{E} = \frac{E_{ph0}}{E_0} \left(1 - \frac{\alpha}{r}\right)^{-1/2}. \quad (10.7)$$

Его изменение проявляется в гравитационном красном смещении частоты фотонов, испущенных в точке с меньшим расстоянием от центра по сравнению с точкой их поглощения атомами.

11. Выводы

Динамика частиц в криволинейном пространстве-времени рассмотрена с использованием механики Лагранжа. Установлено соответствие между физическими энергией и импульсом частицы, определяемыми из негравитационных взаимодействий, и контравариантным вектором обобщенных импульсов. Полученные динамические уравнения включают в себя скорость изменения вектора энергии-импульса, компоненты которого выражают приобретенные гравитационным полем энергию и импульс при движении в нем частицы. При рассмотрении динамики отдельной частицы этот вектор является аналогом псевдотензора, используемого в законах сохранения в тензорном виде.

Хотя полученные обобщенные силы не являются ковариантными величинами, в пределе слабой гравитации, описываемой метрикой Шварцшильда, они выражают ньютоновский закон гравитации с пассивной массой частиц, соответствующей активной гравитационной массе движущихся точечных тел и светового пучка. При этом, пассивная гравитационная масса фотона не зависит от направления его движения. Совпадая с активной гравитационной массой направленного электромагнитного излучения, она равна удвоенной массе материальной частицы эквивалентной его энергии. Нековариантность вектора обобщенных сил и вектора, составленного из скоростей передачи энергии и импульса гравитационному полю при движении в нем частицы, имеет ту же природу, что и нековариантность псевдотензора энергии-импульса гравитационного поля, с помощью которого были рассчитаны подтвержденные экспериментально изменения круговых орбит двух тел, движущихся вокруг общего центра, в результате потери энергии, вызванной излучением гравитационных волн (Нобелевская премия, 1993).

Рассмотрена система из двух близко расположенных одинаковых тел, движущихся в противоположных направлениях, с малой потенциальной энергией по сравнению с ее кинетической энергией. Его можно описать с помощью метрики, полученной путем применения преобразований Лоренца к метрике Шварцшильда. Ее гравитационное воздействие на материальную частицу зависит от угла между радиус вектором и линией движения тел.

Применение ПСИЭ и обобщенного принципа Ферма для свето-подобной частицы в гравитационном поле приводит к общему решению, которое является изотропной геодезической линией. ПСИЭ определяет систему уравнений, имеющую по сравнению с результатом обобщенного принципа Ферма на одно уравнение больше. Это позволяет однозначно определить вектор энергии-импульса частицы. В поле Шварцшильда соотношение между энергией фотона и неподвижной материальной частицы соответствует характеристике гравитационного красного смещения.

Литература

1. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, *Теоретическая физика*, т. 2: *Теория поля*, Физматлит, М. (2003).

2. С. Вайнберг, *Гравитация и космология*, Мир, М. (1975).
3. В. И. Ритус, УФН **185**, 1229 (2015).
4. Л. Б. Окунь, УФН **158**, 511 (1989).
5. В. Б. Беляев, *Динамика в общей теории относительности: вариационные методы*, УРСС, М. (2017).
6. D. Yu. Tsipenyuk and W. B. Belayev, J. Phys.: Conf. Ser. **1251** 012048 (2019).
7. D. Yu. Tsipenyuk and W. B. Belayev, Rom. Rep. Phys., **71**:4 109 (2019).
8. Д. Ю. Ципенюк, В. Б. Беляев, РЭНСИТ, **11**:3, 249 (2019).
9. В. А. Фок, *Теория пространства, времени и тяготения*, ГИФМЛ, М. (1961).
10. V. P. Frolov, Phys. Rev. D, **88**:6 06403910 (2013).
11. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, *Теоретическая физика*, т. 1: *Механика*, Физматлит, М., (2004).
12. V. Perlick, Living Rev. Relativity, 7 9 (2004).
13. Л. А. Ривлин, УФН, **167** 309 (1997).
14. Р. Толмен, *Относительность, термодинамика и космология*, Наука, М., 1974.
15. R. C. Tolman, P. Ehrenfest, B. Podolsky, Phys. Rev., **37**, 602 (1931).
16. V. Faraoni, R. M. Dumse, Gen. Relativ. Gravit. **31**, 91 (1999).
17. Л. Б. Окунь, К. Г. Селиванов, В. Телегди, УФН **169** 1141 (1999).