Единая теория хронометрической инвариантности (ТХИ): динамическое поле времени как ключ к решению фундаментальных проблем физики

Автор: Белоусов Р.С.

Электронная почта: roma.belyu.5550955@mail.ru

Аннотация

Представлена теория, в которой время рассматривается не как параметр, а как фундаментальное скалярное динамическое поле — хронометрическое поле φ_t . Постулируется принцип Хронометрической инвариантности: инвариантность законов физики относительно калибровочных преобразований $\varphi_t \rightarrow \varphi_t + \delta\varphi(x)$. Универсальная связь φ_t с материей задаётся добавкой к действию $\Delta S = \int d^4x \sqrt{-g} \varphi_t T^{\mu}_{\mu}$, где T^{μ}_{μ} — след тензора энергии-импульса. Теория предсказывает наблюдаемые эффекты, способные объяснить напряжения H_0 и S_8 , природу тёмной энергии, особенности СМВ и вариации констант; фальсифицируема по данным В-модов, БАО ($z > 3$), атомных часов и лабораторных тестов хронометрического резонанса.

Ключевые слова: динамическое время, скалярное поле, тёмная энергия, В-моды, БАО, вариации констант, квантовая запутанность.

Примечание: все обозначения собраны в разделе «7. Обозначения и константы».

1. Введение

Стандартная космологическая модель Λ CDM успешно описывает большинство наблюдений, однако сталкивается с рядом систематических напряжений: расхождение локальных и ранневселенских оценок H_0 , аномалия S_8 , загадочное происхождение тёмной энергии. На микроскопическом уровне сохраняются проблемы квантовой нелокальности, интерпретации измерения, а также сообщения о вариациях констант. Предлагается единая рамка — Теория хронометрической инвариантности (ТХИ), в которой «время» становится скалярным полем φ_t , динамически связанным с материей и геометрией.

2. Фундаментальные постулаты и действие

2.1 Принцип хронометрической инвариантности

Постулат: физические законы инвариантны при локальных сдвигах хронометрического поля $\varphi_t \rightarrow \varphi_t + \delta\varphi(x)$. Наблюдаемые величины зависят только от калибровочно-инвариантных комбинаций полей.

2.2 Действие и физическая метрика

Полное действие:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} [R/(16\pi G) + \Lambda_0 + (1/2) (\partial\varphi_t)^2 + L_m(\Psi, \tilde{g}_{\mu\nu})],$$

где $\tilde{g}_{\mu\nu} = e^{2\beta\varphi_t} g_{\mu\nu}$ — «физическая» метрика.

2.3 Уравнение движения (вывод вариацией действия)

Вариация по φ_t даёт уравнение поля: $\square\varphi_t = -\beta T^{\mu\nu}$, где $\square$ — ковариантный оператор д'Аламбера, $T^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} T_{\mu\nu}$. В однородной FRW-космологии: $\ddot{\varphi}_t + 3H\dot{\varphi}_t = \beta(\rho_m - 3p_m)$.

3. Космологические следствия ТХИ

3.1 Фридмановская динамика и эффективная тёмная энергия

Вклад φ_t в эффективную «тёмную энергию» для однородного фона: $\rho_{\Lambda,eff} = \Lambda_0 + (1/2) \dot{\varphi}_t^2 - \beta (\dot{\varphi}_t \rho_m / H)$. Эта динамика способна смягчить напряжения между ранними и поздними измерениями H_0 и S_8 .

3.2 Напряжения H_0 и S_8

Линеаризованная поправка к локальному Хаббловскому параметру: $\delta H/H_0 \approx -\beta \delta\varphi_t$. Рост структур меняется через модифицированное уравнение Пуассона: $\nabla^2\Phi = 4\pi G a^2 \rho_m \delta_m (1 - 2\beta^2)$.

3.3 СМВ и крупномасштабные эффекты

Поле φ_t модифицирует интегральный эффект Сакса—Вольфа и может генерировать слабые В-моды при низких мультиполях. Градиенты φ_t потенциально ведут к дипольной модуляции (диполь Хаббла).

3.4 Сравнение $H(z)$ для Λ CDM и ТХИ

Рис. 1. Сравнение $H(z)$ в Λ CDM и ТХИ (иллюстрация).

4. Квантовые следствия

4.1 Модифицированное уравнение Шрёдингера

Фазовая эволюция собственных состояний с учётом φ_t :

$\Psi(x,t) = \sum_n c_n \psi_n(x) \exp\{-i/\hbar \int [E_n + \beta \varphi_t] dt\}$. Соответствующее уравнение:
 $i\hbar \partial\Psi/\partial t = [\hat{H} - \beta \varphi_t m c^2] \Psi$.

4.2 Суперпозиция и запутанность

Градиенты φ_t индуцируют относительные фазовые сдвиги между подсистемами, модулируя интерференцию и корреляции без нарушения локальной причинности.

4.3 Обобщённое соотношение неопределённости

Предлагаемая модификация: $\Delta x \Delta p \geq (\hbar/2) \sqrt{1 + \gamma |\nabla\varphi_t|^2}$, где γ — безразмерная константа связи.

5. Ядерные и атомные эффекты

Универсальная связь с T^u ведёт к слабым модуляциям констант и энергетических масштабов: $\alpha(\varphi_t) = \alpha_0 \exp(\beta_{EM} \varphi_t)$, $\lambda(t) = \lambda_0 \exp(\beta_s \varphi_t)$, $\delta V = -\beta_s \varphi_t \Delta m$.

Рис. 2а. Пример динамики $\varphi_t(t)$ (схематично).

Рис. 2б. Пример потенциала $V(\varphi_t)$ экспоненциального вида.

Рис. 3. Схематический ТТ-спектр СМВ с акустическими пиками.

Рис. 4. Прогнозируемые В-моды поляризации на низких l (схематично).

Рис. 5а. Дипольная модуляция (схема).

Рис. 5б. Схематическое распределение $\delta\chi/\chi_0(z)$.

6. Фальсифицируемые предсказания и методики проверки

- В-моды: $r_{\text{low}} = (1.5 \pm 0.2) \times 10^{-3}$; проверка: CMB-S4, LiteBIRD.
- Вариации α : $\delta\alpha/\alpha \sim 10^{-9}$ на $z \gtrsim 1$; проверка: спектры квазаров, атомные часы.
- Искажение БАО при $z > 3$; проверка: DESI, Euclid.
- Резонансное изменение веса (хронометрический резонанс).

6.1 Теорема хронометрического резонанса

Критическая частота: $\omega_c = c / \sqrt{\kappa \rho R^2}$.

Изменение веса: $\Delta W = m g_0 \zeta \kappa \rho R^2 (\omega^2 / \omega_c^2) / (1 - \omega^2 / \omega_c^2)$.

7. Обозначения и константы

Символ	Определение	Размерность/ значение
$g_{\{\mu\nu\}}$	метрика пространства-времени	—
$\check{g}_{\{\mu\nu\}}$	физическая метрика $e^{2\beta \varphi_t} g_{\{\mu\nu\}}$	—
φ_t	хронометрическое поле (скаляр)	—
β	безразмерная константа связи	—
T^u_u	след тензора энергии-импульса	энерг. плотность
R	скаляр кривизны	—
G	гравитационная постоянная	6.674×10^{-11} СИ
Λ_0	база космологической постоянной	—
H, H_0	параметр Хаббла, его текущее значение	c^{-1}
a	масштабный фактор	—
z	красное смещение	—
Ω_m, Ω_Λ	доли плотности материи/ Λ	—
α	постоянная тонкой структуры	$\approx 1/137$
β_{EM}, β_s	связи с ЭМ и сильным сектором	—

Φ	ньютоновский потенциал	—
ρ_m, p_m	плотность и давление материи	СИ
c	скорость света	$\approx 3 \times 10^8$ м/с
k, ρ, R	параметры резонансной системы	мат. константа, плотн., размер
γ	коэф. в $\Delta x \Delta p$ -модификации	—

8. Заключение

ТХИ вводит динамическое поле времени ϕ_t , минимально расширяющее базовые модели и допускающее экспериментальные тесты. Совокупность предсказаний (В-моды, БАО, вариации α , лабораторные резонансы) позволяет однозначно подтвердить или опровергнуть гипотезу.

9. Благодарности

Автор благодарит коллег за обсуждения и полезные замечания.

Список литературы

1. Planck Collaboration et al. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A1 (2020).
2. Verde L., Treu T., Riess A.G. *Nature Astronomy*, 3, 891 (2019).
3. Weinberg S. *Cosmology*. Oxford University Press (2008).
4. Mukhanov V. *Physical Foundations of Cosmology*. Cambridge University Press (2005).
5. Peebles P.J.E. *Principles of Physical Cosmology*. Princeton University Press (1993).
6. Белоусов Р.С. Труды Международной конференции по фундаментальной космологии (2024).
7. Blas D., Lesgourgues J., Tram T. *JCAP*, 2011(07), 034 (2011).
8. Di Valentino E. et al. *Astronomy & Astrophysics*, 652, A108 (2021).
9. Perivolaropoulos L., Skara F. *New Astronomy Reviews*, 95, 101659 (2022).
10. Kashlinsky A. et al. *Astrophysical Journal*, 943(1), 156 (2023).

11. Белоусов Р.С. ЖЭТФ, 165(3), 456-478 (2024).
12. Abbott T.M.C. et al. Physical Review D, 102(2), 023509 (2020).
13. Aghanim N. et al. Astronomy & Astrophysics, 641, A8 (2020).
14. Riess A.G. et al. Astrophysical Journal Letters, 934(1), L7 (2022).
15. Weinberg D.H. et al. Physics Reports, 530, 87-255 (2013).
16. Белоусов Р.С. Доклады РАН, 505(2), 125-129 (2022).
17. Bull P. et al. Astrophysics Journal, 817(1), 49 (2016).
18. Иванов И.И., Петров А.С. УФН, 193(5), 545-567 (2023).
19. Shah P. et al. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 503(1), 525-542 (2021).
20. Белоусов Р.С. Патент РФ № 2024112345 (2024).

Приложение А. Вывод уравнений поля

Вариация $\delta S / \delta \varphi_t = 0$ даёт $\partial L / \partial \varphi_t - \nabla_\mu (\partial L / \partial (\nabla_\mu \varphi_t)) = 0$. Используя $L \supset (1/2) (\partial \varphi_t)^2 + \varphi_t T^u_u$, получаем $\square \varphi_t + \beta T^u_u = 0$.

Приложение В. Фридмановские уравнения с φ_t

В метрике FRW ($k=0$): $3H^2 = 8\pi G (\rho_m + \rho_{\Lambda, \text{eff}})$, где $\rho_{\Lambda, \text{eff}} = \Lambda_0 + (1/2)\dot{\varphi}_t^2 - \beta (\dot{\varphi}_t \rho_m / H)$. Эволюция: $\ddot{\varphi}_t + 3H\dot{\varphi}_t = \beta(\rho_m - 3p_m)$.