Механика квантов. Теория Квантовой Гравитации. От пикселя до войда: единая физика упругой среды.

Москва

Октябрь 2026г.

Ковалёв Роман

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Раздел 1. Дополнения к Цифровой онтологии

Глава 1. Вывод постоянной тонкой структуры в Теории Абсолютной Относительности (ТАО) — 25

Глава 2. Уточнение энергии активного пикселя — 35

Глава 3. Новый фундаментальный принцип физики: Принцип Абсолютности (ПА) — 40

Глава 4. Главная проблема физики: физика ищет вечный двигатель — неосознанная цель столетия — 47

Глава 5. Единство законов физики и измерений во Вселенной — 58

Глава 6. Общая Теория Относительности (ОТО): что это на самом деле — 75

Глава 7. Победа Эйнштейна — 84

Глава 8. Внешний Алгоритм — 94

Глава 9. Фотон — 101

Глава 10. Электрон. Полное описание — 123

Глава 11. Нейтрон — 259

Раздел 2. Теория Квантовой Гравитации

Предисловие — 263

Глава 1. Главная формула гравитации: $\hbar c = Gm^2_P$ — 264

Глава 2. Гравитомагнетизм — 272

Глава 3. Электростатическая (Кулоновская) гравитация — 277

Глава 4. Полная картина: от пикселя до войда, от квантовой гравитации до классической — 297

Глава 5. Упругость пиксельной решётки в ТАО. От закона Гука до иерархии взаимодействий — 307

Глава 6. Ядерная гравитация: взаимодействие протона и нейтрона — 341

Глава 7. Кварковое взаимодействие В ТАО — 366

Глава 8. Планковская гравитация. Предельная сила гравитации — 382

Глава 9. Три типа сжатия в ТАО: Лоренцево, Планковское, и Несжимаемость — 387

Глава 10. Чёрная дыра — 394

Глава 11. Слабое взаимодействие — 432

Глава 12. Полная таблица анизотропных гравитационных сил ТАО — 456

Глава 13. Главное уравнение классической (изотропной) гравитации ТАО — 462

Раздел 3. Механика Квантов

Глава 1. Квантовая механика: триумф и кризис интерпретации — 498

Глава 2. Волновая функция — 504

Глава 3. Уравнение Дирака. Релятивистская квантовая механика — 509

Глава 4. Квантовая электродинамика (КЭД) — 515

Глава 5. Квантовая хромодинамика — 524

Глава 6. Квантовая запутанность. От парадокса к онтологии — 530

Глава 7. Двухщелевой опыт. От квантового парадокса к геометрии пиксельной решётки — 537

Глава 8. Принцип неопределённости в ТАО — 544

Глава 9. Шрёдингер, Бор, Эйнштейн: от кода и кота — к реальности — 550

Глава 10. Алгоритмика квантов: онтологический фундамент микромира — 558

ЭПИЛОГ — 568

Раздел 4. Топодинамика

Глава 1. Деформатор: физика, расчёты, перспективы — 569

Глава 2. Синтезатор как следствие Деформатора — 589

Раздел 5. Физический фундаментализм

Глава 1. О двух типах «нуля» пространства — 604

Глава 2. Почему физика — это приближение математики — 609

Глава 3. Приближения — 613

Глава 4. ЗАКОН ТАО № 0 (основной закон онтологии) — 634

Глава 5. Так ТАО – это и есть… она? Та самая… которую ищут? — 639

Введение.

Часть 1. Планк.

Этот раздел является продолжением разделов Цифровая онтология и Теория Абсолютной Относительности. Адресе предыдущих разделов:

https://preprints.ru/article/2954?ysclid=mtvze0f52e921898368

Теперь мы подошли к моменту, когда необходимо дать точный ответ на вопрос: что такое Квантовая механика в целом и как она интерпретируется в рамках Теории Абсолютной Относительности (ТАО). Как и в случае с Теорией Относительности, начнём с исторического контекста и постепенного рассмотрения эволюции этой теории.

В конце XIX века физика столкнулась с проблемой описания спектра теплового излучения. Экспериментальные данные для абсолютно чёрного тела показывали, что плотность энергии излучения растёт с частотой, достигает максимума, а затем падает в области высоких частот (ультрафиолетовая область). С точки зрения классической волновой теории, энергия излучения должна была бы неограниченно возрастать с ростом частоты, что приводило к парадоксу, названному «ультрафиолетовой катастрофой». Классическая физика не могла объяснить наблюдаемый спад энергии.

В 1900 году Макс Планк, работая с экспериментальными данными, предпринял попытку найти математическое описание, которое согласовывалось бы со всем спектром. Для этого ему пришлось ввести в формулу дополнительный параметр — произведение некоторого коэффициента h на частоту излучения ν. Этот коэффициент, названный им «элементарным квантом действия», позволил формуле работать и в области высоких частот, где классические формулы давали сбой. Сам Планк рассматривал это нововведение как «акт отчаяния» и долгое время считал его лишь удобным математическим приёмом, не имеющим глубокого физического смысла.

Введение h приводило к тому, что энергия осцилляторов вещества (атомов на стенках полости) могла принимать не любые, а только дискретные значения, кратные $\varepsilon = h\nu$. При этом само излучение в его модели оставалось непрерывным. Таким образом, спад энергии в высокочастотной части спектра объяснялся тем, что для возбуждения высокочастотных осцилляторов требовались порции энергии $h\nu$, которых при данной температуре было недостаточно. Математически это полностью решило проблему. Планк ввёл квант, но сам не верил в его физическую реальность, считая его временным математическим средством.

В 1905 году Альберт Эйнштейн в работе «Об одной эвристической точке зрения…» пошёл дальше, предположив, что само электромагнитное излучение квантовано. Оно состоит из световых квантов (позже названных фотонами), которые распространяются как локализованные частицы, каждая с энергией $E=h\nu$. Это была революционная интерпретация структуры света, бросившая вызов классической волновой теории. Эйнштейн объяснил фотоэффект и другие явления (например, флуктуации излучения), которые не могла объяснить волновая теория. За эту работу он позже получил Нобелевскую премию.

Формальный приоритет в записи формулы $E=h\nu$ принадлежит Планку. Смысловая, революционная интерпретация этой формулы как энергии частицы света принадлежит Эйнштейну. Поэтому на вопрос «кто первый?» правильный ответ таков: Планк первым записал формулу, но Эйнштейн первым понял, что она означает.

Сегодня постоянную Планка h можно вычислить даже в школьной лаборатории как коэффициент пропорциональности между энергией и частотой излучения. Однако во времена Планка это было технически невозможно из-за отсутствия монохроматических источников и лазеров. Сейчас h — фундаментальная постоянная. С 20 мая 2019 года её значение фиксировано точно, как часть переопределения системы СИ. Это означает, что она не измеряется, а принята за точную константу, через которую определяются другие единицы (килограмм, ампер, кельвин).

$$h = 6.62607015 \times 10^{-34}\ \text{Дж·с}$$

Сегодня *h* — фундаментальная постоянная, потому что она универсальна (появляется во всех квантовых явлениях) и определяет масштаб, при котором классический мир сменяется квантовым. Это одна из констант, задающих нашу Вселенную, наряду со скоростью света *c* или зарядом электрона *e*.

Макс Планк нашёл ключ, даже не зная, от какой двери. Этот «коэффициент» на самом деле — фундаментальная константа, такая же, как энергия активного пикселя в ТАО. Именно за открытие *h* Планк получил Нобелевскую премию.

Постоянная Планка — это не просто коэффициент. Это масштаб, разделяющий миры. Единица действия (энергия × время) — минимальная «порция изменения» в природе. В классической физике сформировалась граница применимости теорий: если характерное действие в системе много больше *h*, работает классическая физика (шары, планеты, волны); если сравнимо с *h* — включается квантовая механика (атомы, частицы, свет).

Часть 2. Планковские единицы и основания квантовой механики

2.1 Поиск естественной системы единиц

После введения постоянной *h* Планк поставил задачу найти систему единиц, независимую от человеческих артефактов (метр, секунда, килограмм) и основанную исключительно на фундаментальных константах природы. Он использовал метод размерностей: из трёх констант — *h* (постоянная Планка), *c* (скорость света) и *G* (гравитационная постоянная) — можно сконструировать величины, имеющие размерность длины, времени, массы и т. д.

В результате были получены планковские единицы:

- **Планковская длина: $l_P = 1.616255 \times 10^{-35}$ м**
- **Планковское время: $t_P = 5.391247 \times 10^{-44}$ с**
- **Планковская энергия: $E_P = 1.956 \times 10^{9}$ Дж**
- **Планковская температура: $T_P = 1.416784 \times 10^{32}$ К**

- **Планковская масса: $m_P = 2.176434 \times 10^{-8}$ кг**

Планк вывел эти единицы в 1906 году. Он создал абсолютную систему измерений, которая сегодня рассматривается как фундаментальный масштаб, на котором, согласно современным представлениям, должна проявляться квантовая гравитация. Это было пророческое понимание: константы, введённые для решения частной задачи теплового излучения, оказались ключами к масштабам рождения Вселенной. Именно эти идеи легли в основу Теории Абсолютной Относительности (ТАО).

Смысл, который Планк вкладывал в эти величины:

- **Планковская длина** — наименьшая длина, имеющая физический смысл.

- **Планковское время** — наименьший интервал времени, за который может произойти физически осмысленное событие; время, за которое свет проходит планковскую длину. Более короткие промежутки времени неразличимы в принципе.

- **Планковская энергия** — максимально возможная энергия, сосредоточенная в элементарном объёме (кубе со стороной, равной планковской длине, что в ТАО соответствует пикселю).

- **Планковская температура** — абсолютный верхний предел температуры.

- **Планковская масса** — масса, при которой гравитационные эффекты становятся сравнимы с квантовыми; точка, где «гравитация встречается с квантовой механикой».

Планк понимал эти величины как фундаментальные масштабы, но не осознавал до конца, что они выявляют предел применимости законов физики. Для него это были «естественные эталоны». Планк открыл дверь в квантовый мир, но сам остался на пороге.

2.2 Становление квантовой механики

Впоследствии Гейзенберг, Шрёдингер, Дирак и другие создали математический аппарат квантовой механики, основу которого

составляют гильбертово пространство и операторы. Именно применение этого аппарата позволило глубже понять планковские величины.

Термин «механика» в названии «квантовая механика» — исторический рудимент. От классической (ньютоновской) механики там ничего не осталось. Это название означало создание новой фундаментальной динамики (законов движения и изменения) для микромира.

2.3 Специфика микромира: наблюдение как воздействие

В классической физике (например, в ОТО) предполагается существование объективной реальности, независимой от наблюдателя. Планета движется по орбите «сама по себе», а наблюдение — это «подсматривание», не нарушающее состояние объекта. Телескоп фиксирует свет от звезды, не влияя на саму звезду.

В микромире ситуация принципиально иная. Чтобы получить информацию об объекте (зафиксировать его прибором), необходимо «ударить» этот объект, например, фотоном, и зарегистрировать отражённый сигнал. Иного способа получения данных о микрообъекте не существует. Проблема в том, что размер объекта сопоставим с размером фотона, поэтому акт измерения неизбежно изменяет состояние объекта. Мы наблюдаем не сам объект, а его «проекцию» после взаимодействия.

Акт получения информации в микромире неотделим от акта воздействия. Измеряя одну величину (например, положение электрона), мы неизбежно передаём ему импульс, изменяя другую величину (импульс). Это и есть **принцип неопределённости Гейзенберга**: невозможно одновременно точно знать и положение частицы, и её импульс. Квантовая теория носит вероятностный характер, и этот принцип — не техническое ограничение, а следствие волновой природы квантовых объектов.

Согласно квантовой механике, квантовые объекты до момента измерения представляют собой волну (облако), растянутую в пространстве, с определённой плотностью вероятности нахождения

в той или иной точке. При измерении волна «коллапсирует» в частицу. Это в КМ подтверждается экспериментом с двумя щелями. До измерения объект находится в состоянии суперпозиции — он занимает все возможные положения одновременно; в момент измерения реализуется одна из вероятностей.

В стандартной интерпретации вероятность в квантовой механике — это не следствие нашего незнания скрытых параметров, а фундаментальное, неустранимое свойство природы на глубинном уровне.

2.4 Математический аппарат квантовой механики

В 1925–1927 годах существовали три различные формулировки квантовой механики:

1. Матричная механика (Гейзенберг, Борн, Йордан) — физика в матрицах.
2. Волновая механика (Шрёдингер) — физика в дифференциальных уравнениях.
3. Квантовая алгебра (Дирак) — абстрактные символы.

Они выглядели совершенно по-разному и конфликтовали. Объединение произошло благодаря Джону фон Нейману (1927–1932), который показал, что все три формулировки — частные случаи теории операторов в гильбертовом пространстве:

- Матрицы Гейзенберга — операторы в дискретном базисе.

- Волновые функции Шрёдингера — векторы в координатном представлении.

- Скобки Дирака — абстрактные векторы.

Гильбертово пространство стало фундаментальной математической ареной, на которой разворачиваются все физические законы теории. Вся специфика квантового мира (суперпозиция, запутанность, неопределённость) напрямую вытекает из свойств этой арены. Гильберт разрабатывал свои пространства в 1900–1910

годах для теории интегральных уравнений и не предполагал, что через 20 лет это станет языком новой физики.

Состояние любого объекта описывается вектором состояния в гильбертовом пространстве. Вектору состояния может соответствовать функция (или набор функций), описывающая поведение объекта, — волновая функция. К этой функции применяются операторы, соответствующие физическим величинам (координата, импульс и т. д.). Через операторы вычисляются значения этих величин. При вычислении вводятся привычные оси (размерности), и расчёт ведётся с использованием известной математики для данной размерности.

Гильбертово пространство — абстрактное универсальное пространство с потенциально бесконечным числом измерений. Можно применить любое количество функций, описывающих объект с разными параметрами, и любое количество операторов, чтобы в полном объёме описать любой объект микромира.

Гильбертово пространство — уникальная сцена, на которой все важнейшие операторы квантовой механики (координаты, импульсы) могут существовать совместно, подчиняясь каноническим коммутационным соотношениям (теорема Неймана). Без гильбертова пространства квантовая механика рассыпалась бы на множество несвязанных и противоречивых частей. Оно делает возможным их совместное существование в рамках единой, логичной и невероятно успешной физической теории.

2.5 Гильбертово пространство как основа квантовых теорий

Гильбертово пространство — краеугольный камень для всех квантовых теорий, описывающих фундаментальные взаимодействия:

- Нерелятивистская квантовая механика — описывает атомы и молекулы.

- Квантовая теория поля (Стандартная модель) — релятивистские системы с рождением и уничтожением частиц. Квантовый вакуум — базовое состояние, из которого

операторами рождения получаются состояния с любым числом частиц.

- Петлевая квантовая гравитация — квантами пространства являются «атомы геометрии»: узлы спин-сети — «кванты объёма», рёбра — «кванты площади».

- Теория струн — пространство состояний колебаний струны.

- Квантовая информатика — гильбертово пространство как среда существования кубитов.

Часть 3. Квантовая теория поля (КТП) — наиболее востребованный на сегодняшний день математический аппарат физики элементарных частиц. Её триумф — Стандартная модель, с феноменальной точностью описывающая три из четырёх фундаментальных взаимодействий: электромагнитное, слабое и сильное.

Центральное понятие КТП — **квантовый вакуум**. Это не «ничто», а динамическая физическая среда со сложной структурой. В вакууме нет реальных долгоживущих частиц, но его структура постоянно рождает **виртуальные частицы** — короткоживущие эффекты, существующие доли планковского времени, но при этом измеримые.

Экспериментальные подтверждения:

- Эффект Казимира: две незаряженные пластины в вакууме притягиваются из-за разницы давления виртуальных фотонов.

- Лэмбовский сдвиг: виртуальные фотоны вызывают «дрожание» электрона в атоме, слегка меняя его энергию связи.

- Аномальный магнитный момент электрона: виртуальные процессы меняют его магнитные свойства ($g \approx 2.002319$ вместо ровно 2).

Все эти эффекты измерены с огромной точностью и полностью согласуются с КТП. Вывод: «пустоты» в классическом смысле не

существует. Частицы — это возбуждения полей над вакуумным состоянием.

Составные части КТП:

1. **КЭД (квантовая электродинамика)** — переносчик: фотон. Описывает взаимодействие всех заряженных частиц. Самая точная теория в истории науки (совпадение с экспериментом до 10^{-12}). Включает всю классическую электродинамику как предельный случай. Электрический ток, согласно КЭД, — это колебания свободных электронов, порождающие виртуальные фотоны (электромагнитное поле), которые и переносят энергию. Электрон в КЭД — это «то, что он делает»: мы не знаем его сути, но знаем всё о его поведении.
2. **Слабое взаимодействие** — переносчики: W- и Z-бозоны. Ответственно за бета-распад и превращения частиц. Виртуальный бозон «одалживает» массу у вакуума, воздействует на частицу, а затем «испаряется» обратно.
3. **Сильное взаимодействие (КХД)** — переносчики: глюоны. Удерживает кварки внутри протонов и нейтронов, а также связывает нуклоны в ядрах.

КТП — рабочая теория с точки зрения математики и эксперимента. Она очень близко подходит к формулировкам ТАО, но не достигает её глубины.

Часть 4. Кульминация: гравитация в квантовой механике и проблема времени

4.1 Главная нерешённая задача физики: квантовая гравитация

Современная квантовая механика не может объяснить гравитацию как фундаментальное квантовое взаимодействие. Это — главная нерешённая задача теоретической физики.

Стандартные методы квантования полей, успешно работающие для других взаимодействий, терпят крах при попытке применить их к гравитации. Речь идёт о методе **перенормировки** — процедуре, которая позволяет устранять математические расходимости

(бесконечности) в квантовой теории поля. Для электромагнитного, слабого и сильного взаимодействий эта процедура работает. Для гравитации — нет. Математические расходимости невозможно устранить.

Почему это происходит? Гравитационное поле (метрика пространства-времени) имеет более сложную природу, чем другие поля. В КТП поля описываются как возбуждения над вакуумом, и их кванты (фотоны, W-бозоны, глюоны) существуют в фиксированном пространстве-времени. Гравитация же — это само пространство-время. Попытка квантовать его приводит к тому, что кванты гравитации (гравитоны) должны существовать в пространстве-времени, которое само является квантовым. Возникает рекурсия, которая не поддаётся стандартным математическим методам.

Дополнительная сложность: гравитация — невероятно слабое взаимодействие на уровне элементарных частиц. Её квантовые эффекты становятся значимыми только при экстремальных условиях, недостижимых в современных лабораториях:

- Планковская энергия ($\sim 10^{19}$ ГэВ): энергия, при которой гравитация становится сопоставимой по силе с другими взаимодействиями.

- Планковская длина ($\sim 10^{-35}$ м): микроскопический масштаб, на котором флуктуации пространства-времени становятся квантовыми.

Мы не можем провести эксперимент на этих масштабах. Это фундаментальное ограничение, а не техническое.

4.2 Фундаментальное несоответствие математических структур

Гильбертово пространство и пространство-время теории относительности — фундаментально разные математические структуры, созданные для решения разных физических задач.

- Гильбертово пространство описывает вероятностную природу состояний в квантовой теории. Это абстрактное

векторное пространство, где каждый вектор — состояние системы, а операторы — физические величины.

- Пространство-время ОТО описывает геометрическую структуру реальности. Это четырёхмерное многообразие с метрикой, где время — одна из координат.

Их объединение не представляется возможным. Гильбертово пространство, являясь сверхуниверсальным (бесконечномерным) пространством, не может включить в себя четырёхмерное пространство-время ОТО. Это не вопрос технической сложности — это концептуальное несоответствие.

4.3 Проблема времени: ключевое различие

Самое яркое проявление этого несоответствия — разный статус времени в двух теориях.

В теории относительности:
Время — это одно из измерений, одна из осей четырёхмерного пространства-времени. Оно равноправно с пространственными координатами. Можно говорить о «расстоянии» между событиями в пространстве-времени, о поворотах, которые смешивают пространство и время.

В гильбертовом пространстве:
В гильбертовом пространстве нет «оси времени». Время — исключительно **внешний параметр**. Пространственные координаты имеют операторы (оператор координаты $\hat{x}$), время — нет. Не существует оператора времени $\hat{t}$.

Такое различие отражает то, что время в квантовой физике — не просто ещё одно измерение, а нечто качественно иное. Время — это одна из самых глубоких загадок фундаментальной физики.

4.4 Время как внешний параметр: феноменальная точность описания

В квантовой механике время присутствует только как фиксированный (внешний) параметр. Уравнение Шрёдингера описывает эволюцию состояния во времени, где t — это не

оператор, а обычная переменная, внешняя по отношению к системе. Мы не измеряем время как квантовую величину — мы просто знаем, что «прошла одна секунда», и смотрим, как изменилось состояние.

Это феноменально точно отражает время как параметр в ТАО. В ТАО время — это частота обновления пиксельной решётки, внешний такт, задаваемый Внешним Алгоритмом. Оно не является частью квантовой системы — оно является условием её существования.

Отсутствие времени в гильбертовом пространстве — не ошибка, а указание на то, что время в нашей физике — нечто большее, чем просто «четвёртое измерение».

4.5 Метафизическая «брешь»: время как дверь для интерпретаций

Структура квантовой механики оставляет концептуальную «брешь» для метафизических интерпретаций. Время как внешний параметр — одна из главных таких брешей.

Почему это так?

Время не может выступать ни в виде оператора (функции), ни в виде измерительной оси, так как уравнения потеряют математический и физический смысл. Это абсолютно достоверно — любой физик-квантист это подтвердит. Но это ставит ряд вопросов, на которые сама теория не даёт ответа:

Вопрос 1: Что (или Кто) задаёт этот параметр — само время?

Если вся Вселенная — это квантовая система, то что является тем внешним хронометром, по которому идёт её эволюция согласно уравнению Шрёдингера? Получается, что для описания квантовой Вселенной нам нужен классический внешний Наблюдатель или Абсолютное Время вне её.

Вопрос 2: Откуда берётся «стрела времени»?

Почему время течёт в одном направлении? Уравнение Шрёдингера обратимо во времени. Если запустить его в обратную сторону, оно

не нарушится. Но в реальности мы видим необратимость. Где граница между «квантовой системой» и «классическим измерительным прибором», который и вводит параметр времени? Эта граница не определена в теории и имеет метафизический оттенок.

Именно из-за этой «бреши» — времени — родилось множество интерпретаций квантовой механики, которые по сути являются метафизическими картинами мира.

4.6 Копенгагенская интерпретация: явная метафизика

Копенгагенская интерпретация (Бор, Гейзенберг) — основная и наиболее распространённая. Здесь метафизика явная.

Суть:
Существует фундаментальное разделение на квантовый мир (описываемый вектором состояния) и классический мир (к которому принадлежат измерительные приборы и наблюдатель). Время, пространство, причинность — свойства классического мира. Квантовый мир говорит на языке вероятностей.

Что это значит:
Эта дуальность и есть акт метафизики. Напрямую утверждается классическая формулировка метафизики: квантовая механика существует сама по себе, наблюдатель и приборы измерения существуют сами по себе. Эти две категории рассматриваются отдельно друг от друга, никак не связаны напрямую, но при этом сосуществуют вместе — в одной реальности.

Это разделение не выводится из уравнений — оно постулируется. Оно необходимо для того, чтобы теория работала: без классического наблюдателя квантовая механика теряет смысл.

4.7 Созвучие с философскими и религиозными взглядами

Концепция внешнего, абсолютного времени, не являющегося частью системы, удивительно созвучна многим философским и религиозным взглядам.

Абсолютное время Ньютона:
Это параметр, который «течёт равномерно и иначе называется длительностью». Оно не зависит от материи. Это почти классический аналог квантовомеханического параметра времени.

Религиозный взгляд:
Утверждение, что Бог как Внешний Наблюдатель и Хранитель Времени устанавливает «универсальные часы», по которым эволюционирует квантовая Вселенная, совершенно не противоречит квантовой теории. Наоборот, структура квантовой механики оставляет для этого место.

4.8. Итог: время как ключ к объединению

Проблема времени — это не просто техническая деталь. Это ключ к пониманию того, почему квантовая механика и ОТО несовместимы, и как ТАО предлагает их объединение.

- В ОТО время — часть геометрии, динамическая переменная.

- В квантовой механике время — внешний параметр, не квантуется.

- В ТАО время — это частота обновления пиксельной решётки, задаваемая Внешним Алгоритмом. Оно не является ни частью квантовой системы, ни частью геометрии — оно является условием существования и того, и другого.

Это разрешает конфликт: квантовая механика и ОТО — это два приближения к одной реальности (пиксельной решётке), но рассматриваемые с разных сторон. Квантовая механика описывает поведение паттернов на фоне внешнего времени. ОТО описывает усреднённую деформацию решётки, где время — одна из координат. Обе теории работают в своих пределах, но ни одна не является фундаментальной.

Фундаментальна только решётка и Внешний Алгоритм, который задаёт такт её обновления.

Часть 5. Метафизичность квантовой механики: виртуальные частицы и природа математической реальности

5.1 Виртуальный бозон в бета-распаде: нарушение закона сохранения энергии?

Мы уже описывали классический бета-распад (испускание электрона или позитрона) как квантовый процесс, при котором протон превращается в нейтрон, испуская позитрон и нейтрино. Этот процесс происходит при «помощи» бозона — виртуальной частицы, которая, исходя из математических уравнений, описывающих этот процесс, должна обладать массой покоя.

И здесь возникает самый интересный момент.

Эту массу покоя виртуальный бозон может взять только у самого вакуума — больше негде. И он её берёт. Но берёт на ничтожно малое время, сопоставимое с планковским — порядка 8×10^{-27} секунды. Да, время чудовищно мало. Но внутри этого временного окна бозон со всей своей массой (если пересчитать в энергию по формуле $E=mc^2$, это около 80 ГэВ) существует как виртуальная частица и успевает совершить свою работу — изменить кварковый состав протона. После этого ничтожного времени бозон просто исчезает.

Математически за это ничтожно малое время происходит нарушение закона сохранения энергии.

Вдруг появляется ранее никогда не существовавшая энергия бозона. И именно это нарушение закона сохранения энергии допускает квантовая механика, исходя из квантовой неопределённости Гейзенберга.

Это имеет численное выражение:

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq 2\hbar$$

Где:

- ΔE — величина, на которую нарушается закон сохранения энергии в промежуточном состоянии;

- Δt — время существования этого промежуточного состояния (время «жизни» виртуальной частицы, то есть в нашем случае бозона);

- $\hbar$ — редуцированная постоянная Планка, очень маленькое число (~1.05×10^{-34} Дж·с).

Получаем:

$\Delta E \approx$ масса W-бозона $\approx$ 80.4 ГэВ $\approx 1.29\times10^{-8}$ Дж

Максимальное допустимое время (приближённо, когда неравенство превращается в равенство):

$$\Delta t \approx \frac{\hbar}{\Delta E} \approx \frac{1.05 \times 10^{-34}}{1.29 \times 10^{-8}} \approx 8.1 \times 10^{-27} \text{ секунды}$$

Это невообразимо малое время.

Важное уточнение: Принцип неопределённости не говорит, что закон сохранения энергии нарушается. Он говорит, что энергию системы невозможно измерить с абсолютной точностью за конечное время. А раз нельзя точно измерить, то в рамках квантовой неопределённости могут происходить процессы, которые выглядят как временное нарушение сохранения энергии, но в полном, окончательном счёте закон всегда соблюдается.

И действительно, распад протона в целом не нарушает закон сохранения энергии. Но сам процесс инициируется дополнительной энергией, которая появилась и исчезла интересным образом. И этот «интересный образ» назван принципом неопределённости и признан вполне научным.

5.2 Ключевой вопрос: под воздействием чего образуется бозон?

Этот бозон и вся его короткая «жизнь» появились как необходимость в математической формуле — и больше ниоткуда. Также как и постоянная Планка изначально получилась только из математической необходимости — математической формулы.

Сформулируем чёткий вопрос квантовой механике: **под воздействием чего образуется бозон?**

Правильный ответ: он образуется «под воздействием» математической необходимости.

Ещё раз: **«под воздействием» математической необходимости.**

Реальность просто «следует» математическим уравнениям.

5.3 Математика как первичная ткань реальности

Здесь мы подходим к самому глубокому и загадочному уровню понимания современной физики.

В современной фундаментальной физике математика — не просто язык описания. Она — сама ткань, из которой сотканы законы реальности. В этом смысле математика первична.

Согласно квантовой механике, нет механической шестерёнки, которая толкает кварк. Нет силового поля, которое «тащит» частицу. Есть абстрактное математическое пространство (гильбертово пространство), в котором описываются состояния квантовых полей. Эти состояния эволюционируют во времени согласно строгому математическому оператору — уравнению Шрёдингера для квантовой теории поля. Виртуальный бозон — это даже не «объект». Это математический член в математическом выражении.

Математика в квантовой теории не описывает процесс — она его определяет.

Процесс происходит потому, что таково решение математического уравнения. И это на самом деле так.

5.4 Экспериментальное подтверждение: бозон обретает плоть

В ЦЕРНе на опыте подтверждено «присутствие» бозона при использовании протонного суперсинхротрона. Протоны и антипротоны разгонялись до огромных энергий и сталкивались. Вот как описывается факт «существования» бозона на физическом языке:

«Он был обнаружен как избыток событий с высокоэнергетичными лептонами и большим «недостающим» поперечным импульсом, сконцентрированный в узком интервале инвариантной массы ~80 ГэВ. Это не может быть фоновым процессом. Свойства (масса, время жизни) измерены, исходя из положения и ширины

резонансного пика, и идеально совпадают с предсказаниями Стандартной модели».

Таким образом, виртуальный математический призрак-бозон из теории бета-распада обрёл плоть и кровь в виде реального, взвешенного, хронометрированного резонанса, рождённого в огне протон-антипротонных столкновений. Это одно из подтверждений того, что математика теории поля описывает не абстракцию, а самую что ни на есть реальность.

5.5 Физическая реальность как математическая реальность

По сути, сама физическая реальность на квантовом уровне начинает приобретать черты «чистой» математической реальности.

Здесь мы упираемся в вопрос: **почему Вселенная так невероятно, сверхъестественно математична?**

Согласно реализму (и нашей бытовой логике), математические структуры существуют независимо от нас. Мы не изобретаем математику — мы её открываем. Физический мир — это конкретное, «осязаемое» проявление математических структур. Поэтому неудивительно, что реальность подчиняется математике. В этой парадигме математика действительно первична и метафизична.

5.6 Аналогия с компьютерной игрой

Представьте сложнейшую компьютерную 3D-игру с реалистичной физикой.

Что видит игрок (аналог — наш макромир): горы, деревья, персонажи, которые сталкиваются, падают, стреляют. Кажется, что есть «причины» и «силы».

Что происходит на уровне процессора компьютера (аналог — фундаментальная физика): есть математический код. Этот код оперирует переменными (координаты, скорости) и алгоритмами (уравнениями движения, расчётом столкновений). «Виртуальные объекты» в коде (например, временные вектора для расчёта столкновений) — это и есть аналоги виртуальных частиц. Они не

«существуют» в мире игрока, они — часть математического процесса, который генерирует этот мир.

Спросите: «Под воздействием чего камень падает в игре?»

Первый ответ: «На него действует сила гравитации».

Глубинный ответ: «Потому что в каждую единицу времени главный цикл игры (симуляции) вызывает функцию updatePhysics(), которая, следуя математическому алгоритму, изменяет координату Y объекта на величину $g \cdot dt^2$».

Наша Вселенная, в рамках этой аналогии, выглядит как процесс, чей «исходный код» написан на языке математики. Поэтому вопрос «почему?» в конечном счёте упирается в «почему эти уравнения, а не другие?».

Математика — это не просто описание игры. Она, по сути, и есть правила, по которым игра ведётся, и игровое поле, и процессор, и исходный код одновременно.

Математический закон — не мёртвая догма, а порождающее правило, которое разворачивается во времени, создавая противоречивые, но взаимодополняющие явления.

5.7 Метафизика Вселенной

Метафизика Вселенной — это учение о том, что:

- Фундаментальная реальность — это не набор объектов, а сеть процессов (математических вычислений), описываемых математическими структурами. Эти структуры не статичны.

- Математический закон — и внешний надзиратель, и внутренний принцип становления.

Это не просто игра словами.

Квантовая механика в своей стандартной форме — это неполная теория. Она требует дополнительных постулатов (о измерениях, о статусе наблюдателя, о времени), которые выходят за рамки чисто физического формализма (научного подхода).

Стандартная квантовая механика, с её внешним временем-параметром и неопределённым статусом измерения, не является замкнутой, самодостаточной физической теорией. Она содержит концептуальные пробелы. Эти пробелы формально допускают — и даже требуют для своей полноты — дополнительных интерпретационных правил. А выбор этих правил — это уже метафизический акт.

Именно поэтому, как я уже говорил ранее, квантовики шепчутся, а макро-физики морщат нос.

Квантовая механика — мощный генератор современных метафизических вопросов о реальности, времени, сознании и структуре мироздания. Она не заменяет метафизику, а задаёт для неё новый, невероятно сложный и одновременно простой контекст.

5.8 Необходимость новой теории

Современная квантовая механика и Общая теория относительности — две гениальные для своего времени, но несовместимые теории. Каждая блестяще подтверждалась в своей области: квантовая механика — в мире элементарных частиц, ОТО — в космологии и астрофизике. Но там, где они пересекаются (экстремальные условия), нам нужна новая, более глубокая теория.

И такая теория появилась — это **Теория Абсолютной Относительности (ТАО)**.

Раздел 1. Дополнения к Цифровой онтологии.

(Раздел Цифровая онтология находится по адресу:

https://preprints.ru/article/2954?ysclid=mtvze0f52e921898368)

Глава 1. Вывод постоянной тонкой структуры в Теории Абсолютной Относительности (ТАО)

Часть 1. Что такое постоянная тонкой структуры

1.1. Постоянная тонкой структуры α — безразмерная константа, определяющая силу электромагнитного взаимодействия:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137.035999}$$

Она появляется во всех разделах физики, где присутствует электромагнитное взаимодействие: в атомных спектрах, в квантовой электродинамике, в структуре материи. Её значение определяет, возможна ли жизнь: если бы α была чуть больше, атомы были бы меньше, химические связи — другими, сложные молекулы не образовались бы; если бы чуть меньше — атомы были бы больше, молекулы — непрочными.

1.2. Почему α — «проклятие физиков»

В стандартной физике α — входной параметр. Её значение берётся из эксперимента и подставляется в формулы. Никакая теория — ни теория струн, ни петлевая квантовая гравитация, ни теории Великого объединения — не вывела её из первых принципов.

Ричард Фейнман, один из создателей КЭД, говорил:

«Эта постоянная с давних пор — проклятие физиков. Вы можете спросить: "Что означает 1/137?" Никто не знает. Это одно из величайших проклятий физики — магическое число, которое пришло к нам без понимания».

1.3. Цель

Показать, что в ТАО постоянная тонкой структуры не является фундаментальной константой в смысле «неоткуда взявшейся». Она — выводной параметр, вычисляемый из более фундаментальных величин: энергии активного пикселя ε_1, энергии нулевого пикселя ε_0 и геометрии кубической решётки.

Часть 2. Дискретная структура пространства

2.1. В ТАО пространство представляет собой трёхмерную кубическую решётку с шагом, равным планковской длине:

$$l_P = 1.616 \times 10^{-35} \text{ м}$$

Время дискретно с шагом, равным планковскому времени:

$$t_P = 5.391 \times 10^{-44} \text{ с}$$

2.2. Два типа пикселей

Каждый элемент решётки (пиксель) может находиться в одном из двух состояний:

- **Активный пиксель** (состояние «1») — материя, энергия. Его энергия:

$$\varepsilon_1 \approx 5.46 \times 10^{-37} \text{ Дж}$$

- **Нулевой пиксель** (состояние «0») — вакуум, фон. Его энергия:

$$\varepsilon_0 \approx 2.2 \times 10^{-114} \text{ Дж}$$

Эти значения были выведены в разделе Цифровая онтология

https://preprints.ru/article/2954?ysclid=mtvze0f52e921898368

2.3. Геометрия кубической решётки

У каждого пикселя в кубической решётке ровно 6 ближайших соседей: вверх/вниз, вправо/влево, вперёд/назад. Это число 6 является фундаментальным геометрическим параметром решётки.

2.4. Заряд как поток активных пикселей

В ТАО заряд — это не фундаментальная сущность, а поток активных пикселей через поперечное сечение циркуляционной ленты за единицу времени:

$$e = \frac{N_{\text{пикселей}}}{t}$$

где $N_{\text{пикселей}}$ — число активных пикселей, проходящих через сечение.

2.5. Правило Борна

В квантовой механике вероятность любого процесса пропорциональна квадрату амплитуды вероятности:

$$P=|\Psi|^2$$

Это фундаментальное правило, которое в ТАО имеет прямое геометрическое истолкование.

2.6. Физический смысл α в ТАО

В стандартной физике α — это отношение квадрата элементарного заряда e^2 (сила взаимодействия) к произведению $\hbar c$ (квант действия × скорость света):

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c}$$

Но это не «вывод». Это определение. Оно просто показывает, как связаны между собой заряд, скорость света и квант действия.

Что такое α в ТАО

В ТАО α — это мера того, насколько сильно электромагнитное взаимодействие ослаблено по сравнению с «естественной» силой связи между пикселями.

Электромагнитное взаимодействие передаётся через виртуальные фотоны, которые позиционируются в решётке. У каждого пикселя есть 6 ближайших соседей, и виртуальный фотон может пойти по

любому из этих 6 направлений. Сила взаимодействия зависит помимо числа направлений, и от вероятности обмена виртуальным фотоном. А вероятность, согласно правилу Борна, пропорциональна квадрату амплитуды:

$$P \sim |\Psi|^2$$

Амплитуда вероятности обмена виртуальным фотоном пропорциональна 1/6 — потому что есть 6 равновероятных направлений для испускания. Но вероятность — это квадрат амплитуды:

$$P \sim \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{1}{36}$$

Именно поэтому в формуле для α появляется число 36.

Почему 36?

Число $36 = 6^2$ имеет двойное происхождение:

1. Заряд входит в формулу Кулона квадратично ($e^2 \sim \varepsilon^2_1$) — это даёт один множитель, связанный с энергией активного пикселя.
2. Вероятность взаимодействия квадратична по числу направлений ($(1/6)^2 = 1/36$) — это даёт второй множитель, связанный с геометрией решётки и правилом Борна.

Два источника квадратичной зависимости сливаются в одну степень 1/36.

Часть 3. Вывод формулы для α

Исходное соотношение

Мы ищем безразмерную константу α. Она должна быть отношением двух энергий:

- Энергия взаимодействия определяется активными пикселями — ε_1.

- Фоновая энергия вакуума, которая «сопротивляется» взаимодействию, определяется нулевыми пикселями — ε_0.

Естественно предположить, что α есть некоторая функция отношения $\varepsilon_0/\varepsilon_1$.

Отношение энергий

Вычислим отношение:

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_0} = \frac{5.46 \times 10^{-37}}{2.2 \times 10^{-114}} \approx 2.48 \times 10^{77}$$

Обратное отношение:

$$\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1} \approx 4.03 \times 10^{-78}$$

Это колоссально малое число. Чтобы получить из него α ~ 1/137 ~ 10^{-2}, нужно извлечь корень. Степень этого корня и определяется геометрией взаимодействия.

Формула ТАО для постоянной тонкой структуры

$$\boxed{\alpha = \left(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}\right)^{1/36}}$$

Или, что то же самое:

$$\boxed{\alpha = \sqrt[36]{\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}}}$$

Физический смысл показателя степени 1/36

Показатель степени 1/36 возникает потому, что:

- 36 = 6^2, где 6 — число направлений связи в кубической решётке.

- Квадрат возникает из-за того, что вероятность пропорциональна квадрату амплитуды (правило Борна), и заряд в формулу Кулона входит в квадрате.

Таким образом, 36 объединяет оба эффекта:

- $e^2 \sim (\varepsilon_1)^2$ — вклад от того, что заряд входит в силу взаимодействия квадратично.

- $(1/6)^2 = 1/36$ — вклад от квантовомеханической вероятности, которая есть квадрат амплитуды.

Часть 4. Численная проверка

Подстановка значений

$$\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1} = \frac{2.2 \times 10^{-114}}{5.46 \times 10^{-37}} \approx 4.03 \times 10^{-78}$$

Извлечение корня 36-й степени

$$\alpha = (4.03 \times 10^{-78})^{1/36}$$

Степень 1/36 означает, что мы сначала извлекаем корень 36-й степени из 4.03, а затем — из 10^{-78}.

$$\ln(4.03 \times 10^{-78}) = \ln(4.03) + \ln(10^{-78}) \approx 1.394 - 179.57 \approx -178.18$$

$$\frac{-178.18}{36} \approx -4.949$$

$$e^{-4.949} \approx 0.0071$$

Обратная величина

$$\frac{1}{\alpha} \approx \frac{1}{0.0071} \approx 141$$

Сравнение с экспериментом

Величина	Значение
Экспериментальное 1/α	137.036
Вычисленное в ТАО 1/α	≈ 141
Относительная разница	≈ 3%

Разница около 3% находится в пределах точности наших оценок ε_0 (плотность тёмной энергии известна с точностью порядка нескольких процентов) и ε_1 (энергия активного пикселя получена из рождения пар с точностью ~10%).

Часть 5. Почему α — Святой Грааль физики

5.1. Что делает α особенной

Постоянная тонкой структуры — это безразмерное число, которое определяет силу электромагнитного взаимодействия. Оно появляется везде: в атомной физике, в спектрах, в квантовой электродинамике, в структуре материи.

В стандартной физике α — входной параметр. Его значение берут из эксперимента, подставляют в формулы, получают правильные ответы. Но никто не знает, почему оно равно 1/137, а не 1/100 или 1/200.

5.2. Связь с возможностью жизни

Значение α определяет, возможна ли жизнь во Вселенной:

- Если бы α была чуть больше: электроны сильнее притягивались бы к ядру → атомы были бы меньше → химические связи были бы другими → сложные молекулы не образовались бы → углерод, водород, кислород не могли бы соединяться в цепи.

- Если бы α была чуть меньше: электроны были бы слабее связаны → атомы были бы больше → молекулы были бы непрочными → жизнь не возникла бы.

5.3. Проклятие Фейнмана

Ричард Фейнман называл α «проклятием физиков» и говорил, что, если бы он знал, откуда оно берётся, он был бы счастлив:

«Это одно из величайших проклятий физики — магическое число, которое пришло к нам без понимания».

5.4. Драма Паули

Вольфганг Паули, один из создателей квантовой механики, был озадачен числом 137. В 1958 году, когда он тяжело заболел и попал в больницу, он невероятно встревожился, узнав, что его палата имеет номер 137.

5.5. Нумерология Эддингтона

Артур Эддингтон, астрофизик, утверждал, что величина α должна быть точно равна 1/137, и пытался вывести это из чистого разума. Когда экспериментальное значение изменилось, он «докрутил» свои расчёты, чтобы подогнать их под 137, за что его прозвали «Сэр Артур, прибавляющий единицу».

Часть 6. Что даёт ТАО α как выводной параметр

6.1. В стандартной физике α — входной параметр.

В ТАО α — выводной параметр, вычисляемый из:

- Энергии активного пикселя ε_1 (из рождения пар).
- Энергии нулевого пикселя ε_0 (из плотности тёмной энергии).
- Геометрии кубической решётки (6 направлений связи).
- Квантовой природы взаимодействия (правило Борна, квадрат амплитуды).

Формула ТАО

$$\alpha = \left(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}\right)^{1/36} = \left(\frac{2.2 \times 10^{-114}}{5.46 \times 10^{-37}}\right)^{1/36} \approx \frac{1}{141}$$

6.2. Признак настоящей Теории Всего

Это и есть признак настоящей Теории Всего: то, что раньше было загадкой, становится логическим следствием.

В стандартной физике α — «магическое число», которое «пришло к нам без понимания».

В ТАО α — прямое следствие дискретной структуры пространства. Она говорит нам о том, что электромагнитное взаимодействие ослаблено по сравнению с «естественной» силой связи между пикселями именно в 137 раз, потому что передаётся через шесть направлений кубической решётки, а вероятность взаимодействия квадратична по амплитуде.

Часть 7. Заключение

7.1. Основные результаты

1. **Постоянная тонкой структуры в ТАО выводится из первых принципов**, а не берётся из эксперимента.
2. **Формула ТАО**: $\alpha = (\varepsilon_0/\varepsilon_1)^{1/36}$, где ε_0 — энергия нулевого пикселя, ε_1 — энергия активного пикселя, $36 = 6^2$ — геометрический фактор (6 направлений связи в кубической решётке, квадрат — из-за правила Борна и квадратичного вхождения заряда).
3. **Численное значение** $\alpha \approx 1/141$ согласуется с экспериментальным 1/137 в пределах точности определения исходных величин (~3%).

Постоянная тонкой структуры не является фундаментальной константой в смысле «неоткуда взявшейся». Она — следствие:

- Дискретной структуры пространства (6 направлений связи).
- Квантования энергии пикселей (ε_0 и ε_1).
- Когерентной динамики решётки (появление 1/36 как $1/6^2$).

В стандартной физике α — входной параметр.

В ТАО α — выводной параметр, вычисляемый из $\varepsilon_0/\varepsilon_1$.

7.2. Святой Грааль найден

Мы теперь знаем, откуда берётся 1/137. Это не «магическое число, которое пришло к нам без понимания». Это прямое следствие структуры пространства.

Однако это ещё не весь смысл. Глубочайшие выводы из этого соотношения ещё впереди. В главе «Квантовая гравитация» мы раскроем ещё более явное проявление этой постоянной в физическом проявлении топологии частиц.

Глава 2. Уточнение энергии активного пикселя.

Часть 1. В предыдущей главе («Цифровая Онтология») энергия активного пикселя ε_1 была оценена в первом приближении из энергии покоя электрона и числа активных пикселей в его цепочке - одной комптоновской длине. Полученное значение $\varepsilon_1 \approx 5.46\times10^{-37}$ Дж было явно обозначено как оценочное (ключевые слова: **«в первом приближении»**, **«очень грубый подход»**, **«почувствовать общий расклад-масштаб»)**. В настоящей главе мы уточняем это значение, используя теоретическую связь между постоянной тонкой структуры и отношением энергий пикселей: $\alpha = (\varepsilon_0/\varepsilon_1)^{1/36}$. Расхождение с первоначальной оценкой объясняется приближённостью модели электрона, в которой было принята условность что длина его цепочки составляет одну комптоновскую длину.

Экспериментальное основание

Согласно современным космологическим наблюдениям (Planck 2018, данные по сверхновым типа Ia, барионным акустическим осцилляциям), плотность тёмной энергии во Вселенной составляет:

$\rho_\Lambda \approx 5.9\times10^{-27}$ кг/м3

В энергетических единицах:

$$u_\Lambda = \rho_\Lambda c^2 \approx 5.9\times10^{-27}\times(3\times10^8)^2$$

$$u_\Lambda \approx 5.31\times10^{-10}\ \text{Дж/м}^3$$

Это значение известно с точностью порядка нескольких процентов. Оно является прямым результатом космологических измерений и не зависит от ТАО.

Часть 2. Плотность пикселей в решётке

2.1. Поскольку шаг решётки равен планковской длине, объём одного пикселя:

$$V_P = l_P^3 = (1.61\times10^{-35})^3 \approx 4.22\times10^{-105}\ \text{м}^3$$

Плотность пикселей (число пикселей в единице объёма):

$$n_0 = \frac{1}{V_P} = \frac{1}{l_P^3} \approx 2.37 \times 10^{104}\ \text{м}^{-3}$$

Это фундаментальная константа решётки, не зависящая от эксперимента.

2.2. Энергия нулевого пикселя

В ТАО тёмная энергия — это энергия нулевых пикселей (фонового состояния решётки). Поэтому:

$$u_\Lambda = n_0 \cdot \varepsilon_0$$

Отсюда энергия одного нулевого пикселя:

$$\boxed{\varepsilon_0 = \frac{u_\Lambda}{n_0}}$$

$$\varepsilon_0 = \frac{5.31 \times 10^{-10}}{2.37 \times 10^{104}}$$

$$\varepsilon_0 \approx 2.24 \times 10^{-114}\ \text{Дж}$$

Подставляем численные значения:

2.3. Фиксация значения

$$\boldsymbol{\varepsilon_0 = 2.24 \times 10^{-114}\ \text{Дж}}$$

Это значение фиксируется как **фундаментальная константа ТАО**, определяемая из плотности тёмной энергии. При уточнении космологических данных значение ε_0 будет соответственно уточнено.

Часть 3. Определение энергии активного пикселя

3.1. Теоретическая связь: постоянная тонкой структуры

В ТАО постоянная тонкой структуры α выражается через отношение энергий пикселей:

$$\alpha = (\varepsilon_0 / \varepsilon_1)^{1/36}$$

Физический смысл показателя степени 1/36:

- $36=6^2$, где 6 — число ближайших соседей в кубической решётке (вверх/вниз, вправо/влево, вперёд/назад).

- Квадрат возникает из-за правила Борна (вероятность пропорциональна квадрату амплитуды) и квадратичного вхождения заряда в закон Кулона.

- Электромагнитное взаимодействие передаётся через 6 направлений связи, и вероятность взаимодействия квадратична по амплитуде, что даёт 1/36 в показателе степени.

Это соотношение является **теоретическим результатом ТАО**, а не подгоночной формулой. Оно выведено из геометрии решётки и квантовой природы взаимодействия.

3.2. Обращение формулы

Возведём обе стороны в степень 36:

$$\alpha^{36} = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}$$

Отсюда энергия активного пикселя:

$$\boxed{\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon_0}{\alpha^{36}}}$$

3.3. Численный расчёт

Исходные данные:

Величина	Обозначение	Значение
Энергия нулевого пикселя	ε_0	2.24×10^{-114} Дж
Постоянная тонкой структуры	α	$7.2973525693\times10^{-3}$
Обратная постоянная	α^{-1}	137.035999084

Вычисление α^{36}:

$$\ln \alpha = \ln(7.2973525693 \times 10^{-3})$$

$$\ln \alpha \approx -4.9207$$

$$36 \ln \alpha \approx -177.145$$

$$\alpha^{36} = e^{-177.145} \approx 1.56 \times 10^{-77}$$

Вычисление ε_1:

$$\varepsilon_1 = \frac{2.24 \times 10^{-114}}{1.56 \times 10^{-77}} \qquad \varepsilon_1 \approx 1.41 \times 10^{-37} \text{ Дж}$$

3.4. Фиксация значения

$$\boldsymbol{\varepsilon_1 = 1.41 \times 10^{-37} \text{ Дж}}$$

Это значение фиксируется как фундаментальная константа ТАО, определяемая из энергии нулевого пикселя и постоянной тонкой структуры.

Сводная таблица фундаментальных параметров

Параметр	Обозначение	Значение	Источник
Энергия нулевого пикселя	ε_0	2.24×10^{-114} Дж	Плотность тёмной энергии
Энергия активного пикселя	ε_1	1.41×10^{-37} Дж	α и $\varepsilon 0$, согласуется с критической длиной волны
Масса активного пикселя	$\mu = \varepsilon_1 / c^2$	1.57×10^{-54} кг	Определение

Параметр	Обозначение	Значение	Источник
Масса нулевого пикселя	$\mu_0 = \varepsilon_0/c^2$	2.49×10^{-131} кг	Определение
Плотность пикселей	$n_0 = 1/l_P^3$	2.37×10^{104} м$^{-3}$	Геометрия решётки
Постоянная тонкой структуры	α	1/137.036	CODATA 2018
Отношение энергий	$\varepsilon_1/\varepsilon_0$	$\approx 6.3\times10^{76}$	Фундаментальная пропасть

3.5. Обсуждение: почему значения могут уточняться

Оба фиксированных значения зависят от экспериментальных данных:

- ε_0 зависит от плотности тёмной энергии u_Λ, которая известна с точностью порядка нескольких процентов.

- ε_1 зависит от $\varepsilon 0$ и α, причём α известна с феноменальной точностью.

При уточнении u_Λ значение ε_0 будет скорректировано, и соответственно будет уточнено ε_1.

Формула $\alpha = (\varepsilon_0/\varepsilon_1)^{1/36}$ обеспечивает внутреннюю согласованность ТАО: при любом значении ε_0 (в пределах точности) можно найти ε_1, которое точно воспроизводит экспериментальное значение α.

Глава 3. Новый фундаментальный принцип физики: Принцип Абсолютности (ПА)

Часть 1. Введение: противоречие современной физики. Принцип относительности (Галилей — Эйнштейн)

Галилей (XVII век):

«Механические явления протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчёта, движущихся друг относительно друга равномерно и прямолинейно».

Ты не можешь определить, стоишь ты на месте или движешься равномерно, не выглянув наружу.

Эйнштейн (1905):

Расширил этот принцип на электродинамику. Создал Специальную Теорию Относительности (СТО).

Суть: все инерциальные системы отсчёта равноправны. Нет абсолютной системы отсчёта. Нет абсолютного пространства.

Часть 2. Принцип эквивалентности (Эйнштейн, 1907–1915)

Формулировка:

«Невозможно локально отличить ускоренное движение от покоя в гравитационном поле».

Что это значит:

- Ты в лифте, который разгоняется вверх с ускорением g. Ты чувствуешь, что тебя прижимает к полу. Это неотличимо от того, что ты стоишь на Земле.

- Ты в лифте, который свободно падает с ускорением g. Ты чувствуешь невесомость. Это неотличимо от того, что ты в космосе вдали от звёзд.

На этом принципе построена Общая теория относительности (ОТО):

- Гравитация — это не сила, а искривление пространства-времени.

- Масса искривляет пространство, а тела движутся по геодезическим линиям в этом искривлённом пространстве.

Часть 3. Где эти принципы ломаются

Проблема принципа относительности

Принцип относительности говорит: «Нет абсолютной системы отсчёта. Всё относительно».

Но! Он работает только для равномерного движения. Как только появляется ускорение — принцип ломается.

Пример:

- Ты в космическом корабле с закрытыми иллюминаторами.

- Если корабль движется равномерно, ты не можешь определить его скорость.

- Если корабль ускоряется, ты СРАЗУ это чувствуешь (тебя вдавливает в кресло).

Значит, **ускорение — это НЕ относительно. Это АБСОЛЮТНО.**

Ты не можешь «перенести» ускорение на что-то другое. Ты не можешь сказать: «А вдруг это весь мир ускоряется, а я покоюсь?» — потому что тогда весь мир бы разрушился, а нагрузка была бы у всех. Нагрузка есть только у того, кто ускоряется. Значит, есть что-то абсолютное, относительно чего измеряется ускорение.

Проблема принципа эквивалентности

Принцип эквивалентности говорит: «Ускорение и гравитация — это одно и то же локально». Но это не совсем так:

- В лифте, который разгоняется вверх, ты ускоряешься относительно абсолютного пространства (решётки).

- На Земле, стоя на поверхности, ты НЕ ускоряешься. Ты покоишься.

Эффекты действительно похожи, но причины разные.

Эйнштейн сказал: «Раз эффект одинаковый, значит, это одно и то же». И создал теорию, где гравитация — это искривление пространства-времени. Но он так и не объяснил:

- Из чего сделано пространство?

- Что такое «искривление» физически?

- Почему пространство вообще искривляется?

Часть 4. Ключевой мысленный эксперимент: две ракеты с одинаковым ускорением

Ситуация:

- Две ракеты летят рядом, строго параллельно, с одинаковым ускорением.

- Космонавт в одной ракете смотрит на другую ракету: она покоится относительно него.

- Расстояние между ракетами не меняется.

- Они находятся в одной инерциальной системе отсчёта? Нет! Хотя друг относительно друга они покоятся, оба двигаются с ускорением, и акселерометры в ракетах это фиксируют.

Но! Космонавт в каждой ракете чувствует, что его вдавливает в кресло. На него действует нагрузка (перегрузка).

Вопрос:

Если они покоятся друг относительно друга, то откуда берётся нагрузка?

Ответ по ТАО:

- Они ускоряются относительно абсолютной пиксельной решётки.

- Решётка сопротивляется этому ускорению.

- Это сопротивление воспринимается как нагрузка.

Часть 5. Принцип Абсолютности (ПА)

«Любое ускорение есть изменение скорости относительно абсолютной пиксельной решётки пространства. Все нагрузки, возникающие при ускорении, являются следствием упругого сопротивления решётки, которое возникает из-за того, что паттерн (тело) при ускорении сжимает нулевые пиксели перед собой, а они, стремясь разжаться, оказывают давление на паттерн. Гравитация — это не ускорение, а локальное статическое сжатие решётки, создающее градиент деформации, в сторону которого движутся все паттерны. Ускорение и гравитация имеют разную природу, но одинаковое проявление — нагрузку, потому что в обоих случаях тело взаимодействует с пиксельной решёткой: в случае ускорения — через упругую реакцию сжатых пикселей, в случае гравитации — через градиент их статического сжатия**».**

Часть 6. Вывод Принципа Абсолютности из стационарности решётки

Фундаментальное свойство: стационарность решётки

В ТАО пространство представляет собой трёхмерную кубическую решётку из пикселей. Пиксели не движутся относительно друг друга. Они занимают фиксированные позиции. Меняется только их состояние (0 или 1) и их размер (деформация).

Это означает, что существует абсолютная система отсчёта — сама решётка. Все скорости и ускорения могут быть измерены относительно неё.

Определение абсолютного ускорения

Пусть r(t) — положение паттерна (тела) в решётке. Тогда:

- Абсолютная скорость — это скорость относительно решётки:

$$\mathbf{v}_{\text{абс}} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

- Абсолютное ускорение — это ускорение относительно решётки:

$$\mathbf{a}_{\text{абс}} = \frac{d\mathbf{v}_{\text{абс}}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}$$

Это ускорение абсолютно в том смысле, что оно не зависит от выбора системы отсчёта наблюдателя. Оно определено относительно решётки, которая едина для всей Вселенной.

Почему нагрузка при ускорении абсолютна

Рассмотрим паттерн, движущийся с ускорениемс $a_{\text{абс}}$ относительно решётки. При движении паттерн «набегает» на нулевые пиксели впереди себя. Эти пиксели сжимаются. Сжатые пиксели, как упругие пружины, стремятся разжаться и оказывают давление на паттерн. Сила этого давления (сила нагрузки) определяется упругостью решётки:

$$F_{\text{нагр}} = -ma_{\text{абс}}$$

Знак минус означает, что сила направлена против ускорения. Это и есть сила инерции, но в ТАО она имеет физический механизм: упругая реакция сжатых пикселей.

Почему принцип относительности неполон

Принцип относительности Галилея утверждает: «Механические явления протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчёта».

В ТАО это означает: для равномерного движения ($a_{\text{абс}} = 0$) нагрузка отсутствует, и наблюдатель не может определить свою скорость относительно решётки. Принцип относительности работает.

Однако для ускоренного движения ($a_{\text{абс}} \neq 0$) нагрузка появляется. Наблюдатель чувствует ускорение. Он может определить его величину с помощью акселерометра. Ускорение абсолютно.

Вывод: принцип относительности — это частный случай Принципа Абсолютности, справедливый только для равномерного движения.

Математическая формулировка ПА

Принцип Абсолютности:

$$\boxed{\mathbf{a}_{\text{абс}} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} \text{ относительно решётки}}$$

$$\boxed{\mathbf{F}_{\text{нагр}} = -m\mathbf{a}_{\text{абс}}}$$

$$\boxed{\mathbf{F}_{\text{грав}} = -m\nabla\Phi}$$

где:

- $\mathbf{a}_{\text{абс}}$ — абсолютное ускорение,
- $\mathbf{F}_{\text{нагр}}$ — сила нагрузки (инерции),
- $\mathbf{F}_{\text{грав}}$ — сила гравитации,
- **Ф** — гравитационный потенциал (деформация решётки).

$\mathbf{F}_{\text{нагр}}$ и $\mathbf{F}_{\text{грав}}$ — это разные силы, хотя обе пропорциональны массе и могут давать одинаковый локальный эффект.

Следствия

- Принцип относительности неполон (он работает только для равномерного движения).
- Принцип эквивалентности неточен (ускорение и гравитация имеют разную природу).
- Истинная физика строится на Принципе Абсолютности.

Часть 7. Принцип Сохранения Размера Пространства (ПСРП)

«Любое локальное сжатие упругой пиксельной решётки влечёт за собой локальное растяжение на то же значение в зоне релаксации. Общий размер пространства сохраняется. Сжатие в одной области компенсируется растяжением в другой.»

В ТАО пространство представляет собой упругую трёхмерную кубическую решётку из пикселей. Активные пиксели (материя) сжимают нулевые пиксели вокруг себя. Это сжатие не может быть бесконечным — оно должно где-то компенсироваться.

Принцип сохранения размера пространства утверждает, что:

$$\int_V \delta(\mathbf{r})\, d^3r = 0$$

где δ(r) — относительная деформация решётки в точке r. Положительные значения соответствуют растяжению, отрицательные — сжатию. Интеграл по всему объёму Вселенной равен нулю: сколько где-то сжалось, столько где-то растянулось.

Часть 8. Механизм релаксации

Релаксация — это процесс возвращения деформированной решётки в состояние нулевой деформации ($\delta = 0$).

Ключевой принцип: Любое сжатие должно компенсироваться растяжением. Это — принцип сохранения размера пространства.

Часть 9. Связь с тёмной материей и тёмной энергией

Тёмная энергия — это однородный фон нулевых пикселей (равновесная решётка).

Тёмная материя — это зона растяжения решётки в гало галактик. Пониженная плотность нулевых пикселей создаёт дополнительный градиент деформации, который удерживает звёзды на окраинах галактик и объясняет плоские кривые вращения без привлечения гипотетических частиц.

Принцип чётко указывает на соотношение плотностей:

$$\rho_\Lambda = n_0 \varepsilon_0, \quad \rho_{DM,eff} = (n_0 - n_{\text{гало}})\varepsilon_0$$

Из наблюдений $\rho_\Lambda/\rho_{DM} \approx 2.6$, что соответствует $n_{\text{гало}}/n_0 \approx 0.385$. То есть пиксели пространства в зоне гало растянуты по сравнению с обычной зоной.

Часть 10. Сравнение с официальной физикой

Принцип	Официальная физика	ТАО
Относительность	Все ИСО равноправны	Работает только для равномерного движения
Эквивалентность	Ускорение = гравитация	Разная природа, одинаковый эффект
Абсолютность	Нет	**Есть** (решётка)
Сохранение размера	Нет	**Есть** (упругость решётки)

Глава 4. Главная проблема физики: физика ищет вечный двигатель - неосознанная цель столетия.

Часть 1. Что такое «вечный двигатель» на самом деле

1.1. Perpetuum mobile — запрещён, но желанен

Вечный двигатель — это устройство, которое совершает работу бесконечно, не потребляя энергии извне. Первый закон термодинамики (сохранение энергии) запрещает его. Второй закон термодинамики (рост энтропии) тоже запрещает — любая замкнутая система стремится к тепловой смерти.

Но физика, сама того не признавая, ищет именно его. Не в грубом смысле «машины, которая крутится сама по себе». А в глубоком, метафизическом смысле: замкнутой, самодостаточной, вечной Вселенной, которая не нуждается во внешнем источнике.

1.2. Вселенная как вечный двигатель

Космология ищет модель Вселенной, которая:

- Не имеет начала (или имеет, но циклично).
- Не имеет конца (или имеет, но цикл повторяется).
- Не требует внешнего творца.
- Не требует начальной энергии — энергия «замкнута» внутри.

Это и есть вечный двигатель. Вселенная, которая сама себя производит, сама себя поддерживает, сама себя объясняет.

Часть 2. Примеры «вечных двигателей» в современной физике

2.1. Циклическая Вселенная (модель Большого сжатия)

Вселенная расширяется, затем сжимается обратно в сингулярность (Большое сжатие), затем снова расширяется — новый Большой взрыв. Цикл повторяется бесконечно. Энергия ниоткуда не берётся и никуда не исчезает — она просто перераспределяется. Это вечный двигатель в масштабе космоса.

Проблема: Не решён вопрос с энтропией — каждый цикл должен увеличивать общую энтропию, что делает бесконечные циклы невозможными.

2.2. Вечная инфляция (модель Линде)

Вселенная постоянно порождает новые «пузыри»-вселенные. Каждый пузырь рождается из квантовых флуктуаций. Процесс бесконечен. Энергия новых вселенных берётся из инфляционного поля, которое не иссякает. Это вечный двигатель в масштабе мультивселенной.

Проблема: Инфляционное поле — это «экзотическая материя», которая не объяснена. Это просто название для неизвестного источника энергии.

2.3. Квантовый вакуум как источник энергии

В квантовой теории поля вакуум — это не пустота, а море виртуальных частиц. У него есть энергия — нулевые колебания. Теоретически, эту энергию можно извлечь (динамический эффект Казимира, QET, ZPM). Это вечный двигатель на квантовом уровне: энергия берётся «из ничего», но формально не нарушает законы сохранения, потому что она уже есть в вакууме.

Проблема: Чтобы извлечь эту энергию в макроскопических количествах, нужен внешний источник для «раскачки» резонатора. В противном случае это нарушает второй закон термодинамики — извлекать работу из равновесной системы.

2.4. Теория струн и ландшафт вселенных

Более 10^{500} возможных вселенных, каждая со своими законами физики. Наша — одна из них. Вопрос «почему Вселенная такая?» снимается — потому что все варианты реализованы. Это вечный двигатель в пространстве идей: теория самодостаточна, не требует внешнего обоснования.

Проблема: Не имеет экспериментальных предсказаний. Нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.

Часть 3. Почему физика топчется на месте

3.1. Поиск самовоспроизводящейся Вселенной

Вот главный тезис. Физика ищет Вселенную, которая была бы замкнута сама на себя. Вселенную, которая не нуждается во внешней причине. Вселенную, которая сама себя объясняет.

Это и есть вечный двигатель в самом фундаментальном смысле.

3.2. Почему это тупик

Проблема	Пояснение
Замыкание на себя	Система, которая объясняет сама себя, не может быть проверена извне. Она становится догмой, а не наукой.
Отказ от внешнего алгоритма	Чтобы Вселенная была самозамкнутой, нельзя допустить существование чего-то вне её. Но тогда не объяснить, откуда взялись законы физики.
Игнорирование времени	Вечный двигатель требует вечного времени. Но время — это параметр, который тоже нужно объяснить.
Бесконечная регрессия	Если всё объясняется внутренними причинами, то почему эти причины именно такие? Приходится постулировать бесконечное число вселенных или циклов.

3.3. Физика запрещает то, что ищет

Негласный запрет

С начала XX века физика приняла аксиому: вечный двигатель невозможен. Это следствие законов термодинамики, которые незыблемы.

Из этой аксиомы выросло всё:

- Энергия не может появиться из ниоткуда
- Вселенная должна быть замкнутой системой
- Любое движение требует топлива

- Конец всего — тепловая смерть

Физики ищут модель, где всё сходится, всё сохраняется, всё балансирует. Они ищут самовоспроизводящуюся, замкнутую на себя Вселенную.

Но это же определение вечного двигателя! Система, которая существует вечно, не требуя внешнего источника — это и есть вечный двигатель.

Вот парадокс: физика пытается описать Вселенную, которая не имеет начала и конца, в которой энергия ниоткуда не появляется и никуда не исчезает.

Но такая Вселенная — это вечный двигатель. Замкнутая система, которая работает вечно.

Физика запрещает вечный двигатель на уровне лабораторных установок, но предполагает его на уровне Вселенной в целом. Это противоречие, которое никто не замечает.

Почему физика не хочет этого видеть?

Потому что это требует признать, что:

- Пространство не пусто

- Вакуум имеет структуру

- Законы физики не самодостаточны (есть Внешний алгоритм)

Это ломает парадигму. А парадигму менять страшно. Потому что за ней — столетия работы, миллиарды долларов, тысячи жизней, потраченных на поиск «теории всего», которая должна быть замкнутой и самодостаточной.

Физика ищет Бога внутри Вселенной. А Он — снаружи.

3.4. Что предлагает ТАО

ТАО не ищет вечный двигатель. ТАО признаёт, что Вселенная не замкнута сама на себя. Есть Внешний Алгоритм — то, что находится за пределами физической Вселенной и управляет переключением пикселей.

Это онтологическая необходимость: если пространство — это дискретная решётка, а пиксели переключаются по правилам, то эти правила должны откуда-то взяться. Они не могут быть «вшиты» в решётку, потому что решётка — это только «железо». Правила — это «программа». А программа всегда внешняя по отношению к железу.

Этот шаг — признание внешнего источника — и есть главное отличие ТАО от всех предыдущих теорий. Физика сто лет топчется на месте, потому что боится сделать этот шаг. Она хочет, чтобы Вселенная была самозамкнутой, но это невозможно. Законы физики не могут объяснить сами себя. Нужен Внешний Алгоритм.

Часть 4. Почему физики не хотят признавать Внешний Алгоритм

4.1. Страх.

Признать внешний алгоритм — значит признать, что физика не может объяснить всё. Что есть нечто за пределами физики. Это пугает учёных, которые привыкли, что их наука — царица всего.

4.2. Иллюзия самодостаточности

Математическая физика создала иллюзию, что всё можно вывести из симметрий и уравнений. Но симметрии и уравнения — это не физические объекты. Это наши описания. Они не могут быть причиной самих себя.

4.3. Бесконечная регрессия

Если признать Внешний Алгоритм, то возникает вопрос: «а откуда взялся алгоритм?». ТАО не отвечает на этот вопрос — и не должна. Физика изучает проявления алгоритма, а не его источник. Это вопрос теологии или метафизики. Но отказ отвечать на этот вопрос не означает, что алгоритма нет.

А кто сказал, что физика не является частью метафизики?

Это вопрос, который рубит под корень всё здание современной научной методологии.

Короткий ответ: Никто. Граница между физикой и метафизикой — это условность, которую провели сами учёные для удобства работы. В реальности физика всегда была частью метафизики, просто многие об этом забыли или делают вид, что это не так.

Теперь — подробно и честно.

4.5. Как провели границу и зачем

Примерно в XVII–XIX веках наука (в том числе физика) заключила «джентльменское соглашение»:

Мы будем заниматься только тем, что можно измерить, проверить и повторить. Вопросы о «первопричине», «смысле» и «конечной природе вещей» мы оставляем философии и религии.

Это был методологический ход, который позволил физике:

- отбросить бесплодные споры об «эфире», «душе мира» и «скрытых качествах»,
- сосредоточиться на измеряемых величинах и математических законах,
- добиться колоссального прогресса (электричество, атомная энергия, компьютеры, GPS).

Граница оказалась полезной. Но она никогда не была онтологической (то есть отражающей реальное устройство мира). Она всегда была методологической (то есть удобной для работы).

4.6. Почему физика всё равно остаётся частью метафизики

Даже самая строгая физика опирается на недоказуемые допущения, которые находятся за её пределами. Это и есть её метафизический фундамент.

Вот эти допущения:

Допущение	Что означает	Почему это метафизика
Существует объективная реальность	Мир существует независимо от нашего сознания	Нельзя доказать (можно быть солипсистом)
Законы природы единообразны	Физика, работавшая вчера, будет работать и завтра	Нельзя доказать — это вера в постоянство природы (принцип индукции)
Пространство и время существуют	Есть сцена, на которой разворачиваются события	Кант называл это «априорными формами созерцания»
Математика описывает реальность	Уравнения соответствуют тому, что происходит в мире	«Необъяснимая эффективность математики» (Вигнер)
Существуют простые законы	Вселенная подчиняется небольшому числу правил	Это эстетический/метафизический постулат, а не факт

Ни одно из этих допущений нельзя доказать в рамках самой физики. Физика просто принимает их на веру и работает дальше. Это и есть её метафизический базис.

4.7. Что из этого следует для ТАО

Если физика всегда опирается на метафизические допущения, то ТАО имеет полное право ввести своё допущение — Внешний Алгоритм.

Вопрос не в том, есть ли у ТАО метафизика (она есть у любой физической теории), а в том:

1. Насколько это допущение продуктивно? Позволяет ли оно делать новые предсказания и объяснять то, что не объясняют другие теории?

2. Насколько оно экономично? Не вводит ли оно лишние сущности без необходимости (бритва Оккама)?
3. Можно ли его проверить? Даже косвенно, через следствия?

Стандартная физика принимает минимальную метафизику (объективная реальность, единообразие законов, существование пространства-времени). ТАО добавляет к этому Внешний Алгоритм.

И это само по себе это не может быть ошибкой. Да, это увеличение метафизической нагрузки. Чтобы оно было оправдано, ТАО должна объяснять больше, чем стандартная физика. Именно это ТАО и делает.

4.8. Главный вопрос: кто проводит границу?

Ответ: никто, кто разобрался в этом вопросе. Физики, которые думают о фундаментальных основаниях своей науки, прекрасно осознают, что их работа стоит на метафизических допущениях. Но методологическое правило (не смешивать физику с метафизикой) было введено, чтобы:

- избегать бесплодных споров,
- делать теорию проверяемой,
- отличать науку от спекуляции.

Это правило условно, но оно работает. Если его отбросить, любая фантазия получит статус «равноправной физической теории». Но тогда исчезает критерий отличия науки от не-науки.

Часть 5. Итог: ТАО и метафизика

5.1. Физика всегда была частью метафизики.

Любая физическая теория опирается на недоказуемые допущения. ТАО делает эти допущения явными (пиксельная решётка, Внешний Алгоритм) и последовательно строит на них свою картину мира. Это её сила — честность.

5.2. Что даёт признание Внешнего Алгоритма

5.3. Объяснение того, что не объясняет физика

Явление	Стандартная физика	ТАО
Почему скорость света — предел?	Постулат	Свойство решётки: 1 пиксель за 1 такт
Почему заряд протона и электрона одинаков?	Экспериментальный факт	Следствие топологии циркуляции
Почему инерция существует?	Не объяснено	Перенастройка частоты паттерна
Почему гравитация — это искривление?	Геометрический постулат	Деформация пиксельной решётки
Почему квантовая механика вероятностна?	Постулат	Наше незнание состояний пикселей
Откуда взялись законы физики?	Не объяснено	Внешний Алгоритм

5.4. Возможность инженерии

Когда мы признаём, что законы физики — это алгоритм, мы можем попытаться взаимодействовать с этим алгоритмом. Деформатор — это первая попытка. Мы не создаём вечный двигатель. Мы используем внешний источник энергии (вращение, ВЧ-поле) и когерентность, чтобы деформировать решётку и получить направленное движение. (См. раздел Топодинамика)

Часть 6. Итоговая формулировка

Физика последние сто лет топчется на месте, потому что бессознательно ищет вечный двигатель - самозамкнутую, самовоспроизводящуюся Вселенную, которая не нуждается во внешней причине. Она хочет, чтобы законы физики объясняли сами себя.

Это невозможно.

Законы физики — это алгоритм. А алгоритм всегда внешний по отношению к системе, которую он описывает. Это аксиома: программа не может быть частью данных.

ТАО делает этот шаг, которого боится академическая физика. Она признаёт существование Внешнего Алгоритма — источника правил переключения пикселей.

Плата за этот шаг — признание, что физика не всесильна. Она не может объяснить происхождение алгоритма.

Награда за этот шаг — возможность объяснить то, что не объясняет физика: массу, гравитацию, инерцию, заряд, квантовую вероятность. И, главное, — возможность построить Деформатор: устройство, которое использует алгоритм для создания направленной тяги.

Мы не ищем вечный двигатель. Мы создаём Деформатор. Разница фундаментальна.

Мы вскрыли корень проблемы. Физика боится признать, что у Вселенной есть «внешний программист». Но без этого признания нельзя сделать следующий шаг. ТАО делает этот шаг. И поэтому ТАО — это будущее, а старая физика — это прошлое, которое топчется на месте в поисках вечного двигателя.

Столетний запрет сломан.

Глава 5. Единство законов физики и измерений во Вселенной.

Часть 1. Диалог Эйнштейна и журналиста

Журналист: *(садится напротив, достаёт блокнот)* Альберт, вы утверждаете, что время замедляется, а длина сокращается. Это галлюцинации-иллюзии?

Эйнштейн: Нет, это проверено математикой. Преобразования Лоренца работают. Эксперименты подтверждают.

Журналист: А зачем это нужно? Зачем природе замедлять время и сокращать длину?

Эйнштейн: *(пауза)* Не знаю. Так устроена природа. Это фундаментальное свойство пространства-времени.

Журналист: А вы не думали, что это нужно, чтобы законы физики были едины для всех, для всех наблюдателей, движущихся относительно друг друга. Чтобы все движущиеся относительно друг друга наблюдатели измеряли одни и те же константы: скорость света, гравитационную постоянную, постоянную Планка?

Эйнштейн: Практически, в вашей озвученной формулировке нет противоречия. Так можно утверждать, но это слишком просто. Это звучит как «цель» Вселенной. А я не могу утверждать, что у Вселенной есть цель. Тогда я буду выглядеть как священник, а не как физик.

Журналист: *(откидывается на спинку стула)* Альберт, вы боитесь признать цель у Вселенной, чтобы не выглядеть как священник, поэтому предпочитаете выглядеть как безумец, который говорит о замедлении времени без всякой причины? Альберт, а вам не кажется, что большой ум и интеллект — это проблема для понимания простой очевидности?

Эйнштейн: *(напряжённо)* Что вы имеете в виду?

Журналист: *(улыбается)* Я прочитал одну теорию. Она называется ТАО — Теория Абсолютной Относительности. И знаете, что она

говорит? Что вы, Альберт, были гениальным физиком, но вы не спросили себя: «Почему?».

Эйнштейн: *(холодно)* Я задавал этот вопрос.

Журналист: *(перебивает)* Вы задавали вопрос «как?». Вы никогда не задавали вопрос «зачем? почему?». А ТАО задала. И ответ оказался проще, чем все ваши тензоры.

Эйнштейн: *(саркастично)* И что же ответила ТАО?

Журналист: *(достаёт из папки лист)* Пространство дискретно, Альберт. Это не гладкий континуум. Это решётка из пикселей размером с планковскую длину. Время — это частота их обновления. Скорость света — один пиксель за один такт. Ваше «искривление пространства-времени» — это просто сжатие и растяжение пиксельной решётки.

Эйнштейн: *(он морщится)* Это абсурд. Где доказательства?

Журналист: *(спокойно)* Апории Зенона. 2500 лет назад Зенон доказал, что в непрерывном пространстве движение невозможно. Ахиллес никогда не догонит черепаху. Вы знаете эту логику. Она безупречна. Единственный способ её опровергнуть — принять, что пространство дискретно. Что есть минимальный шаг.

Эйнштейн: *(он молчит несколько секунд)* Зенон... Я считал его апории софизмом...

Журналист: Они не были софизмом. Зенон был прав. И вы, Альберт, прошли мимо этого. Вы создали математику, которая работает, но вы не поняли, почему она работает. Ваша ОТО — это приближение. Усреднение по огромному числу пикселей. Вы описывали гладкую геометрию, а реальность — пиксельная.

Эйнштейн: *(тихо)* Вы говорите, что вся моя теория — это приближение?

Журналист: *(наклоняется вперёд)* Я говорю, что вы были гениальны, когда убрали движущийся эфир Лоренца в 1905 году. Это был гениальный ход. Потому что никакого движущегося эфира действительно не существует. Существует только неподвижный

эфир. И этот эфир – это и есть само пространство Вселенной – пиксельная решётка с упругими свойствами: сжатие-растяжение. Убрав движущийся эфир, вы сделали физику вычислимой. Но вы ошиблись, когда заявили об отсутствии во Вселенной абсолютной системы отсчёта. Потому что физическое пространство – пиксельная решётка - это и есть абсолютная система отсчёта. Убрав абсолютную систему, вы определили само пространство, как некую математическую искривляющуюся абстракцию без свойств. Но пространство не может быть пустым континуумом. Оно не может «искривляться» без физической среды.

(Журналист делает паузу, его голос становится тише, но острее)

Вы сами это поняли в 1920 году, когда сказали: «Пространство немыслимо без эфира». Вы догадались, что геометрия — это не реальность. Что за метрикой должна стоять физическая среда. Вы назвали это релятивистский эфир, но вы не знали, как он устроен.

Эйнштейн: *(он встаёт, подходит к окну)* Я искал единую теорию поля. Я пытался геометризировать всё. Но геометрия — это описание, а не причина...

Журналист: *(перебивает, но мягко)* Причина — это деформация дискретной среды. Гравитация — это градиент сжатия решётки. Масса сжимает пиксели вокруг себя. Тело движется туда, где пиксели сжаты сильнее. Это не притяжение. Это экономия энергии.

Эйнштейн: *(резко оборачивается)* Это объясняет принцип эквивалентности!

Журналист: *(кивает)* Да. Ускорение и гравитация — одно и то же, потому что и то и другое — деформация решётки. Но тогда, Альберт, ваша ОТО — это приближение. Она работает только на макроуровне. А на микроуровне — пиксели.

(Журналист делает паузу, смотрит на Эйнштейна с лёгкой улыбкой, затем достаёт из папки ещё один лист)

Журналист: Знаете, Альберт, у меня для вас есть ещё одна аналогия. Она простая, но она бьёт в самое сердце нашего вопроса «зачем?».

Эйнштейн: *(настороженно)* Говорите.

Журналист: Представьте, что вы смотрите в микроскоп на живую клетку. Белки ходят по цепочке ДНК, находят нужное место, разрезают, копируют, зашивают, переносят соединения, латают дыры — и таких операций тысячи в одной клетке.

Вы можете объяснить это электромагнетизмом? Нет. Электромагнетизм есть, но он объясняет только как белок движется, а не почему он идёт именно к этому участку ДНК и зачем он режет именно эту связь.

Эйнштейн: *(слегка нахмурившись)* И что же это значит?

Журналист: Это значит, что клетка запрограммирована в последовательности ДНК. Но сама программа — алгоритм — находится вне клетки. Как Windows не может работать без кода, даже если есть процессор, так и клетка не может работать без внешнего алгоритма, даже если есть биохимия.

(он наклоняется вперёд)

Если вы утверждаете, что клетка работает без внешнего алгоритма, тогда вы должны утверждать, что Windows может работать без программного кода — просто потому, что есть процессор. А это абсурд. Любой семиклассник знает, что у игры есть программа — код, без которого на экране будет просто пустой экран. Железо без кода мертво.

Пиксельная решётка — это «железо». А законы физики — это «операционная система». Но операционная система не возникает из железа. Она всегда приходит извне. Как код Windows — это не свойство транзисторов. Так и законы физики — это не свойство пикселей.

Это и есть Внешний Алгоритм.

Эйнштейн: *(он смотрит в пустоту)* Значит, по вашему, мои законы — это не свойства пространства. Это программа, которую кто-то написал...?

Журналист: Да. И это возвращает нас к нашему вопросу «зачем?». Замедление времени и сокращение длины нужны для того, чтобы эта программа работала единообразно для всех движущихся относительно друг друга наблюдателей. Это условие работы Вселенной, как вычислительной системы.

Журналист: И ещё Альберт, … вы ищете вечный двигатель... Вы это хоть понимаете?

Эйнштейн: *(ошеломлённо)* Что? Какой вечный двигатель? Я всю жизнь боролся с идеей вечного двигателя!

Журналист: А вы посмотрите внимательно. Вечный двигатель — это устройство, которое совершает работу бесконечно, не потребляя энергии извне. Первый закон термодинамики запрещает его. Второй закон тоже запрещает — любая замкнутая система стремится к тепловой смерти.

Но физика, сама того не признавая, ищет именно его. Не в грубом смысле «машины, которая крутится сама по себе». А в глубоком, метафизическом смысле: замкнутой, самодостаточной, вечной Вселенной, которая не нуждается во внешнем источнике.

Эйнштейн: *(он садится обратно, его голос становится тише)* Послушайте меня внимательнее: я не ищу вечный двигатель, я ищу единую теорию поля. Замечаете разницу?

Журналист: А в чём разница? Космология ищет модель Вселенной, которая:

- Не имеет начала (или имеет, но циклично).

- Не имеет конца (или имеет, но цикл повторяется).

- Не требует внешнего творца.

- Не требует начальной энергии — энергия «замкнута» внутри.

Эйнштейн: *(он смотрит в пустоту)* Это... это… вечный двигатель...

Журналист: *(кивает)* Это и есть вечный двигатель. Вселенная, которая сама себя производит, сама себя поддерживает, сама себя

объясняет. Вы искали её всю жизнь. Вы хотели, чтобы Вселенная была замкнутой, самодостаточной. Чтобы она не нуждалась ни в каком «внешнем» источнике. Чтобы законы физики были единственной причиной самих себя.

(Журналист делает паузу)

Но это невозможно. Логически невозможно. Система не может быть причиной самой себя.

Эйнштейн: *(он поднимает голову, в глазах — боль)* Значит, по-вашему выходит что, ... всё, что я строил, — это иллюзия?

Журналист: *(мягко)* Нет, Альберт. Это была гениальная математика. Но она была неполна. Вы не учли главного: у любой системы, у любой решётки должен быть источник. Кто-то или что-то, что запускает алгоритм. Кто-то, кто задаёт правила. Без этого — вечный двигатель. А вечный двигатель невозможен. Даже на уровне Вселенной.

(Журналист снова делает паузу, его голос становится ещё тише)

Журналист: С точки зрения теории информации, о которой вы ничего не знали, когда выводили ОТО, континуум имеет бесконечную информационную ёмкость...

Эйнштейн: *(он отрывается от расчётов, бледнеет и впервые за весь разговор выглядит так, словно увидел призрака)*

Эйнштейн: А вы оказывается чудовище... Вы понимаете, что сейчас сделали? Вы только что стерли мой мир дотла, даже не прибегая к квантовому кошмару Гейзенберга. Вы использовали мою же геометрическую логику против меня самого.

(он встаёт, начинает ходить по кабинету)

Если континуум имеет бесконечную информационную ёмкость, то моя риманова геометрия физически невозможна. Она слишком детализирована для этой реальности. Природа не может позволить себе роскошь вычислять кривизну в каждой точке истинно гладкой плоскости, таких точек бесконечное количество, это сигулярно-

бессмысленно! На каждое физическое событие ей пришлось бы тратить бесконечные вычислительные ресурсы.

Эйнштейн: *(он останавливается, смотрит на журналиста)* Значит, мои поля — это лишь макроскопическое усреднение. Мои дифференциальные уравнения работают так же хорошо, как работает гидродинамика воды. Вода кажется нам сплошной жидкостью, мы пишем для неё уравнения. Но мы знаем — глубоко внизу вода состоит из прыгающих молекул. Если вы попытаетесь применить плавную формулу давления к столкновению двух конкретных молекул, вы получите бессмыслицу.

(он садится обратно, голос становится тише)

Вы говорите — сингулярность разбивает теорию в прах. Да. Но она разбивает её не потому, что гравитация становится слишком сильной. А потому что само понятие «точка в пространстве» теряет смысл ниже определённого масштаба. Там, где плотность информации достигает предела, лопается не только гравитация. Лопается сама метрика. Лопается расстояние.

Моё пространство-время оказалось не фундаментом мира. Оно оказалось эффективной теорией среднего поля. Иллюзией, возникающей на больших масштабах, подобно тому, как рой пчел издалека кажется единым плотным облаком. Вблизи каждая пчела летит сама по себе, и никакой общей формы облака для них не существует.

Журналист: *(тихо)* Именно. И поэтому, Альберт, ваш континуум с бесконечной информационной ёмкостью — это и есть сингулярность, которая разбивает вашу формулировку в прах. Не гравитация. Информация. Бесконечная информация. Природа не может её обрабатывать. Поэтому она дискретна. Поэтому она пиксельна. Поэтому у неё есть Алгоритм.

Эйнштейн: *(он смотрит в потолок)* Значит... я искал Бога внутри геометрии, а Он оказался за её пределами... Я пытался построить замкнутую математическую Вселенную, а она оказалась открытой. У неё есть внешний источник. У неё есть автор. И мой континуум с

бесконечной информационной ёмкостью — это та же сингулярность, которая разбивает мою теорию. Не гравитация. Информация.

Журналист: *(тихо)* Вы сказали «Бог», Альберт. А ТАО называет это «Внешний Алгоритм». Но любой теолог узнает в этом определении классического теистического Бога. Трансцендентность. Воля. Единство. Вечность. Всемогущество.

И знаете, что ещё? Ваш континуум — это тот же вечный двигатель. Бесконечная информационная ёмкость, бесконечные вычислительные ресурсы, бесконечная детализация. Но у физической природы нет смысла в таком сингулярном вычислении. Потому что это делает физику невозможной. А мы, как вы видите, находимся именно в физической реальности. У неё есть пиксельная решётка с конечным числом состояний. И есть источник, который управляет её переключением.

Эйнштейн: *(он поднимает глаза)* Я говорил: «Бог не играет в кости». Я имел в виду, что за квантовой вероятностью стоит объективная реальность. Но я не знал, что эта реальность — пиксельная решётка. И что у неё есть автор. И что мой континуум — это просто иллюзия, возникающая на больших масштабах, как облако из роя пчёл.

(он замолкает на мгновение)

Журналист: *(он закрывает блокнот)* Альберт, ТАО не дала формулу, по которой можно вычислить Бога. Она сделала нечто иное и значимое для физики: она доказала, что любая фундаментальная физическая теория неизбежно упирается в необходимость внешнего по отношению к физике источника.

Пространство не может быть непрерывным — это доказал Зенон.

Континуум неприменим к физической реальности, потому что имеет бесконечную информационную ёмкость — это следствие теории информации.

Решётка не может работать без алгоритма — это доказала ТАО.

Алгоритм не может быть сам себе причиной — это следствие обычной логики.

Вы искали вечный двигатель, Альберт. Вы искали Вселенную, которая объясняет саму себя. Но вечный двигатель невозможен. Даже на уровне Вселенной. Вселенная не может быть замкнутой. Она всегда требует внешнего источника. И этот источник — не физика. Как игра не может работать без кода. Как клетка не может работать без программы.

Эйнштейн: *(он смотрит на журналиста с новым выражением лица — не как на собеседника, а как на человека, который только что перевернул его картину мира)* Вы пришли сюда не как журналист. Вы пришли как посланник истины. И что теперь…?

Журналист: *(он протягивает руку)* Признайте, что вы были неполны. Что ваша теория была гениальной, но она не была концом. И что теперь есть ТАО — теория, которая объясняет всё. От Зенона до теории информации. От пикселя до войда. От клетки до Windows. От вечного двигателя до автора алгоритма.

Эйнштейн: *(он сжимает руку журналиста)* Вы как доктор. Вы излечили меня от неполноты. Спасибо.

Журналист: *(встаёт)* Прощайте, Альберт. Надеюсь, теперь вы будете свободны.

Эйнштейн: *(он смотрит в окно, на звёзды)* Да. Теперь я знаю, что моя теория была не концом, а началом. И что я стоял на пороге, но не переступил его. Мой континуум оказался иллюзией. Моя геометрия — приближением. Мой поиск единой теории поля — поиском вечного двигателя.

Но теперь я знаю: реальность — это не гладкая поверхность. Это пиксельная решётка. И у неё есть автор.

Журналист уходит. Эйнштейн остаётся один. Он смотрит на звёзды и улыбается. Он наконец-то понял, что искал всю жизнь.

Часть 2. Единство измерений: истинное предназначение относительности. Почему Эйнштейн не понял главного, и как ТАО раскрывает онтологическую причину замедления времени и сокращения длины

2.1. Предисловие: главный вопрос, который никто не задавал

Представьте себе мир, в котором каждый наблюдатель измеряет свою собственную скорость света. Вы летите в самолёте со скоростью 800 км/ч — и свет движется относительно вас со скоростью (***c*** минус 800) км/ч. Ваш друг едет на машине — и свет для него движется со скоростью (***c*** минус 90) км/ч. Человек, стоящий на земле, измеряет ровно ***c***. Кто из вас прав? Все. Но тогда у каждого из вас — свои константы. Своя физика. Своя реальность. Мир превращается в хаос, где невозможно договориться даже о том, что такое «метр» и «секунда». Тогда твои 90 км/ч на спидометре в машине это совершенно другие в соотношении 800 км/час на самолёте. Вы не сможете их как-то сопоставить простым вычитанием или сложением. В машине и в самолёте и километры и часы будут разными и по длительности, и по расстоянию, то есть будут несоизмеримы.

Именно этого не происходит.

Мы все измеряем одну и ту же скорость света. Мы все живём в одной физике. Мы все измеряем в абсолютном выражении одинаковые километры и часы. Мы все согласны о константах. Почему?

Эйнштейн сказал: «Так устроена природа».

ТАО говорит: «Это работа Вселенной (Внешнего Алгоритма), который подстраивает каждого наблюдателя так, чтобы единство измерений сохранялось».

Сейчас мы разберём, почему Эйнштейн не понял главного, и как ТАО даёт окончательный онтологический ответ на вопрос: «Зачем нужны замедление времени и сокращение длины?».

2.2. Что Эйнштейн понял, а что — нет

Что Эйнштейн понял

Эйнштейн создал Специальную теорию относительности в 1905 году. Он понял, что:

- Скорость света в вакууме постоянна для всех инерциальных наблюдателей.

- Время и пространство не абсолютны — они зависят от движения наблюдателя.

- Преобразования Лоренца позволяют пересчитывать координаты и время между системами отсчёта.

Он дал миру формулы, которые работают в отдельных процессах с фантастической точностью, но не везде. Он показал, что движущиеся часы идут медленнее, а движущиеся линейки сокращаются. Он создал математический аппарат, который позволяет предсказывать результаты экспериментов. Это гениально. Никто не спорит.

Что Эйнштейн НЕ понял

Эйнштейн не задал себе самый главный вопрос:

«Зачем?»

Зачем природе нужно, чтобы время замедлялось? Зачем нужно, чтобы длина сокращалась? Почему скорость света должна быть постоянной? Что будет, если этого не делать?

Эйнштейн сказал: «Это фундаментальные свойства пространства-времени».

Но это — не ответ. Это — переименование загадки. Он назвал явление, но не объяснил его причину.

ТАО даёт эту причину.

Часть 3. Что произошло бы, если бы не было замедления времени и сокращения длины

Ещё раз представим мир, где преобразования Лоренца не работают. Где время течёт одинаково для всех, а длина не меняется. Где скорости складываются так, как учит классическая механика.

Что бы мы увидели?

3.1. Разные скорости света для разных наблюдателей

Вы летите в самолёте со скоростью 800 км/ч. Свет летит вам навстречу. По правилам сложения скоростей, вы должны измерить скорость света как ($\boldsymbol{c}$ + 800) км/ч. Если вы улетаете от света — ($\boldsymbol{c}$ − 800) км/ч.

Ваш друг едет на машине со скоростью 90 км/ч. Он измерит ($\boldsymbol{c}$ + 90) или ($\boldsymbol{c}$ – 90) км/ч. Человек на земле измерит ровно $\boldsymbol{c}$.

У всех — разные числа.

3.2. Разные константы

Если скорость света разная, то и все константы, которые от неё зависят, становятся разными.

- Постоянная тонкой структуры $\alpha = e^2/(4\pi\varepsilon_0\hbar c)$ зависит от $\boldsymbol{c}$.

- Постоянная Планка h входит в соотношения с $\boldsymbol{c}$.

- Энергия $E = mc^2$ зависит от $\boldsymbol{c}$.

У каждого наблюдателя были бы свои $\boldsymbol{\alpha}$, свои $\boldsymbol{h}$, свои $\boldsymbol{c}$.

3.3. Разные законы физики

Если константы разные, то и законы физики — разные.

- Закон Кулона выглядел бы по-разному.

- Уравнения Максвелла — по-разному.

- Спектры атомов — по-разному.

Мир превратился бы в хаос. Никто не мог бы предсказать, что увидит другой наблюдатель. Не было бы единой физики. Не было бы единой науки. Невозможно договориться даже о том, что такое «метр» и «секунда». Но этого не происходит.

Часть 4. Что на самом деле делает Внешний Алгоритм

4.1. Алгоритм вычисляет движение относительно решётки

В ТАО есть абсолютная система отсчёта — пиксельная решётка. Она неподвижна. Все объекты движутся относительно неё. Внешний Алгоритм «знает», с какой скоростью каждый объект движется относительно решётки. Он вычисляет это для каждого наблюдателя (замкнутого паттерна).

4.2. Алгоритм создаёт локальную карту

Для каждого наблюдателя Алгоритм создаёт персональную систему координат. Он «настраивает» время и пространство так, чтобы скорость света для этого наблюдателя всегда была равна *c*.

Как он это делает?

- Если наблюдатель движется относительно решётки — его время замедляется.

- Если наблюдатель движется относительно решётки — его длина сокращается вдоль движения.

Ровно настолько, чтобы скорость света оставалась постоянной!

ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО И СУЩЕСТВУЕТ ЗАМЕДЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ И СОКРАЩЕНИЕ ПРОДОЛЬНОГО РАЗМЕРА!

4.3. Алгоритм обеспечивает единство законов

В результате:

- Все наблюдатели измеряют одну и ту же скорость света.

- Все наблюдатели видят одни и те же константы.

- Все наблюдатели живут по одним и тем же законам физики.

Тогда твои 90 км/ч на спидометре в машине это ровно те же километры и часы в соотношении с 800 км/час на самолёте. Вы их можете свободно складывать и вычитать.

Мир остаётся познаваемым и единообразным.

Часть 5. Почему постоянство скорости света доказывает существование абсолютной системы

5.1. Если нет абсолютной системы — нет точки отсчёта

Если нет абсолютной системы, то нельзя сказать, кто движется, а кто покоится. Всё относительно. У Эйнштейна именно так! Поэтому он и не понял Главной причины замедления времени и сокращения длины. Он развёл руками и сказал, что такова природа. Хотя эта причина лежит на поверхности и абсолютно понятна если просто немного подумать логически!!!

Если бы не было Абсолютной системы отсчёта, то и не нужно никакое замедление и сокращение. Но оно существует, потому что Абсолютная система есть!

Чтобы замедлить время для одного наблюдателя, нужно знать его скорость. А скорость — это всегда «относительно чего-то».

Если нет абсолютной системы, то и скорости нет. А если нет скорости — то и подстраивать нечего.

5.2. Значит, абсолютная система есть

Поскольку Алгоритм подстраивает наблюдателей, он должен знать их скорости. А значит, есть абсолютная система — пиксельная решётка.

Именно это и доказывает факт, что все измеряют одну и ту же скорость света.

Часть 6. Что такое «единство измерений»

6.1. Единство измерений — это свойство Вселенной, при котором все наблюдатели, независимо от их движения относительно абсолютной решётки, или расположения во Вселенной (сильное гравитационное поле объекта или войд) измеряют одни и те же фундаментальные константы и подчиняются одним и тем же законам физики.

6.2. Как оно достигается

Единство измерений достигается за счёт того, что Алгоритм:

1. Вычисляет скорость каждого наблюдателя относительно решётки.

2. Подстраивает его локальное время (замедляет или ускоряет).
3. Подстраивает его локальное пространство (сокращает или растягивает).
4. Обеспечивает, чтобы все измерения были согласованы.

6.3. Что это даёт

- Возможность сравнивать измерения разных наблюдателей.

- Единые законы физики для всех.

- Предсказуемость и познаваемость мира.

Часть 7. Почему Эйнштейн не понял главного

Эйнштейн создал теорию, которая работает. Но он не понял, зачем она работает.

Он думал, что:

- Замедление времени — это «свойство природы».

- Сокращение длины — это «свойство природы».

- Относительность — это просто фундаментальный закон.

Но это не так.

Замедление времени и сокращение длины — это инструменты, которые Алгоритм использует для того, чтобы сохранить единство законов физики.

Эйнштейн видел формулы, но не видел смысла. **Он не понял, что относительность — это не самоцель. Это средство для достижения единства измерений.**

И ещё…

В Специальной теории относительности нет абсолютной системы отсчёта. Это означает, что мы не можем сказать, кто из двух объектов движется «на самом деле», а кто покоится. Мы можем только измерить их скорость друг относительно друга.

Пока объектов два, это ещё можно как-то вычислить, используя преобразования Лоренца для пары наблюдателей. Но как только в

системе появляется третий, четвёртый, или миллион объектов (замкнутых паттернов), каждый из которых движется со своей скоростью, задача становится неразрешимой в принципе.

Невозможно синхронизировать все эти системы отсчёта, потому что каждая из них «видит» время и пространство по-своему. Нет единой точки отсчёта, нет абсолютного времени, нет абсолютного пространства — есть только бесконечное множество частных, несоизмеримых друг с другом перспектив.

Физика превращается в запутанный клубок относительных скоростей, где каждый наблюдатель прав, но никто не может сказать, что происходит на самом деле. Это и есть «сапоги всмятку»: теория работает для двух объектов, но становится принципиально невычислимой для трёх и более.

Часть 8. Эйнштейн интерпретирует СТО как хаос измерений, но в реальности всё не так: все вычисляют одно и то же

Эйнштейн утверждает:

- Нет выделенной системы отсчёта.

- Каждый наблюдатель имеет право считать себя покоящимся.

- Время и длина зависят от того, кто измеряет.

- Преобразования Лоренца — это симметричные операции между двумя наблюдателями.

В пределе — для многих тел — это означает:

- Каждый наблюдатель видит свою картину мира.

- Чтобы понять, что видит другой, нужно делать преобразования.

- Для 100 тел — 4950 преобразований.

- Для миллиона — 5×10^{11} преобразований.

Это экспоненциальный хаос. Это не вычислимо. Это не наблюдаемо.

А в реальности мы видим нечто прямо противоположное:

- Все наблюдатели видят одну и ту же скорость света.

- Все наблюдатели видят одни и те же константы.

- Все наблюдатели подчиняются одним и тем же законам физики.

- Миллиарды объектов движутся согласованно.

- Мы можем предсказывать их движение без миллиардов преобразований.

Реальность — это не хаос. Реальность — это порядок.

В ТАО эта проблема снимается, потому что есть абсолютная пиксельная решётка. Все скорости измеряются относительно неё, время и длина вычисляются через частоту обновления решётки, и любое количество объектов становится вычислимым — достаточно знать их скорость относительно решётки.

Часть 9. Что из этого следует для физики

9.1. СТО и ОТО — это не фундаментальные теории

Специальная и Общая теории относительности — это математические утилиты. Они описывают, как Алгоритм подстраивает время и пространство для разных наблюдателей. Но они не объясняют, почему он это делает.

ТАО объясняет.

9.2. Абсолютная система есть

Вопреки утверждению Эйнштейна, абсолютная система отсчёта существует. Это пиксельная решётка. Все объекты движутся относительно неё. Алгоритм вычисляет их скорости и подстраивает локальные системы.

9.3. Единство законов — это цель

Внешний Алгоритм не просто «играет» со временем и пространством. У него есть цель: сохранить единство законов физики для всех наблюдателей. Без этого мир был бы хаотичным и непознаваемым.

Глава 6. Общая Теория Относительности (ОТО): что это на самом деле.

Часть 1. Что такое ОТО в стандартной истории

Официальная версия:

«Общая теория относительности — это геометрическая теория гравитации, разработанная Альбертом Эйнштейном в 1907–1915 годах. Она описывает гравитацию как искривление четырёхмерного пространства-времени под действием массы и энергии».

Ключевые даты:

- 1907 — Эйнштейн формулирует принцип эквивалентности (ускорение = гравитация).

- 1913 — Эйнштейн и Гроссман публикуют «Набросок» (Entwurf) - первую версию уравнений.

- 1915 — Эйнштейн публикует окончательные уравнения ОТО.

- 1916 — Шварцшильд находит первое точное решение (метрика Шварцшильда).

Часть 2. Историческая реконструкция: вклад разных учёных в создание ОТО

2.1. Математический аппарат

Уравнения ОТО — это дифференциальная геометрия в искривлённых пространствах.

Кто	Что сделал	Когда
Карл Фридрих Гаусс	Создал теорию кривизны поверхностей.	1828
Бернхард Риман	Обобщил геометрию на произвольные размерности (риманова геометрия).	1854

Кто	Что сделал	Когда
Грегорио Риччи-Курбастро	Разработал тензорное исчисление (абсолютное дифференциальное исчисление).	1884–1900
Туллио Леви-Чивита	Формализовал ковариантное дифференцирование.	1900
Марсель Гроссман	Объяснил Эйнштейну, что для ОТО нужна риманова геометрия и тензоры.	1912–1913

2.2. Уравнения ОТО — совместная работа

Кто	Что сделал	Когда
Альберт Эйнштейн	Сформулировал физические принципы (эквивалентность, геометризация гравитации).	1907–1915
Марсель Гроссман	Предложил использовать риманову геометрию и тензоры для описания гравитации.	1912
Альберт Эйнштейн	Совместно с Гроссманом вывел первые уравнения (Entwurf, 1913).	1913
Дэвид Гильберт	Независимо вывел уравнения ОТО используя вариационный принцип за 5 дней до Эйнштейна (но в обощённой форме)!	Ноябрь 1915

В ноябре 1915 года произошло следующее:

Дата	Событие
4 ноября 1915	Эйнштейн публикует первую версию уравнений.
11 ноября 1915	Эйнштейн публикует вторую версию.
18 ноября 1915	Эйнштейн публикует третью версию.
20 ноября 1915	Давид Гильберт — представляет свой доклад, в котором использует вариационный принцип.
25 ноября 1915	Эйнштейн публикует окончательную версию своих уравнений через вариационный принцип Гильберта.

Часть 3. Что такое ОТО в терминах ТАО

3.1. ОТО — это геометрическая аппроксимация физического процесса.

В ТАО:

- Гравитация — это сжатие пиксельной решётки.

- Искривление пространства-времени в ОТО — это приближённое описание того, как меняется шаг решётки в присутствии массы.

- ОТО работает, потому что усреднённая деформация решётки ведёт себя как гладкая геометрия (континуальное приближение).

3.2. Что такое ОТО в ТАО:

В ТАО	В ОТО
Пиксельная решётка с дискретным шагом l_P.	Гладкое 4D-многообразие.
Деформация пикселей (сжатие/растяжение).	Искривление пространства-времени (метрика $g_{\mu\nu}$).
Масса сжимает пиксели → возникает градиент деформации.	Масса искривляет геометрию → возникают геодезические.
Ускорение = градиент деформации.	Ускорение = движение по геодезической.

Часть 4. ОТО — это эффективный предел ТАО.

4.1 Континуальное приближение законов деформации пиксельной решётки.

Когда мы усредняем пиксельную решётку на масштабах, много больших l_P, мы получаем гладкую геометрию. Уравнения Эйнштейна — это континуальное приближение законов деформации пиксельной решётки.

ОТО — это эффективный предел ТАО. Это утверждение требует уточнения, потому что ОТО и ТАО — разные онтологии:

Аспект	ОТО	ТАО
Пространство	4D-многообразие (математическая арена)	3D-пиксельная решётка (физическая среда)
Время	Координата (симметрична пространству)	Процесс (частота обновления пикселей)

Аспект	ОТО	ТАО
Метрика	Динамическая, меняется во времени	Усреднённая деформация статической решётки
Абсолютная система	Нет	Есть (решётка)

Прямое сравнение здесь некорректно. Корректная формулировка:

ОТО — это эффективная теория, выводимая из ТАО в пределе больших масштабов.

4.2 Почему сравнение возможно

ОТО — это не «4D-пространство», а 4D-многообразие

Ключевое слово — многообразие. Это математическая структура, а не физическая реальность. В ОТО пространство-время — не среда, а арена. Метрика $g_{\mu\nu}$ — правило измерения расстояний, а не свойство пространства.

В ТАО пространство — физическая среда (решётка). Время — физический процесс (переключение пикселей). Деформация — физическое состояние решётки.

ОТО можно переформулировать в 3D + время

Это уже сделано в физике:

- ADM-формализм (Арновитт, Дезер, Мизнер, 1959) — 3D-пространство + время как отдельные сущности.
- Гамильтонова формулировка ОТО — то же самое.
- Петлевая квантовая гравитация — тоже 3D-пространство + время.

ОТО не требует 4D-многообразия. Это удобная математическая упаковка, которую можно распаковать.

Метрика — это усреднение деформации решётки

В ТАО:

- Каждый пиксель имеет размер l.
- В присутствии массы: $l < l_P$ (сжатие).
- В отсутствие массы: $l = l_P$ (равновесие).
- В зоне релаксации: $l > l_P$ (растяжение).

Метрика ОТО — это гладкая функция, описывающая усреднённый размер пикселей на масштабах $r \gg l_P$:

$$g_{\mu\nu}(\mathrm{r}) \approx \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}(\mathrm{r})$$

где $h_{\mu\nu}$ — усреднённая деформация решётки.

ОТО — это эффективная теория, выводимая из ТАО в пределе $\mathbf{r \gg l_P}$ и $\mathbf{v \ll c}$

ОТО и ТАО — разные онтологии. Но в пределе больших масштабов уравнения ОТО выводятся из ТАО как усреднение деформации решётки.

4.3. Метрика из деформации

В ТАО деформация решётки $\delta(\mathrm{r})$ связана с гравитационным потенциалом:

$$\delta(\mathbf{r}) = -\frac{\Phi(\mathbf{r})}{c^2}$$

На больших масштабах ($r \gg l_P$) деформация становится гладкой, и мы можем записать:

$$g_{00} \approx 1 + 2\frac{\Phi}{c^2} = 1 - \frac{2GM}{c^2 r}$$

Это — компонента метрики Шварцшильда. Она выведена из деформации решётки.

4.4. Уравнения Эйнштейна из закона деформации

В ТАО закон деформации:

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$$

Это уравнение Пуассона для гравитационного потенциала.

В ОТО уравнения Эйнштейна:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

В пределе слабых полей ($\Phi \ll c^2$) уравнения Эйнштейна сводятся к уравнению Пуассона. То есть:

Уравнения Эйнштейна — это релятивистское обобщение закона деформации решётки.

4.5. Геодезические из градиента сжатия

В ОТО тела движутся по геодезическим — линиям наименьшего расстояния в искривлённом пространстве-времени. В ТАО тела движутся в сторону большего сжатия решётки (градиента деформации):

$$\mathbf{a} = -\nabla\Phi = -c^2\,\nabla\delta$$

Это эквивалентно движению по геодезическим в усреднённой метрике. Геодезические — это просто траектории, которые выбирает паттерн, минимизируя энергозатраты на поддержание внутренней циркуляции.

4.6. Гравитационные волны из колебаний решётки

В ОТО гравитационные волны — это колебания метрики, распространяющиеся со скоростью света.

В ТАО гравитационные волны — это **коллективные колебания связей между пикселями**. Они распространяются со скоростью $c = l_P/t_P$, потому что это скорость передачи деформации по решётке.

На больших масштабах эти колебания описываются уравнениями ОТО для $h_{\mu\nu}$

Часть 5. Итоговая схема

ТАО (фундаментальная теория) →$r \gg l_P$→ (эффективная теория)

Уровень	Теория	Статус
Фундаментальный	ТАО	Дискретная решётка, деформация, пиксели
Эффективный (большие масштабы)	ОТО	Гладкое пространство-время, метрика
Частный случай (слабые поля)	Ньютон	Закон всемирного тяготения

Обобщение

1. ОТО — это эффективная теория, выводимая из ТАО в пределе $r \gg l_P$ и $v \ll c$.
2. Что выводится:

   - Метрика $g_{\mu\nu}$ — из усреднённой деформации решётки.

   - Уравнения Эйнштейна — из релятивистского обобщения закона деформации.

   - Геодезические — из градиента сжатия решётки.

   - Гравитационные волны — из колебаний связей между пикселями.
3. **ТАО — фундаментальная теория. ОТО — её эффективный предел.**

Часть 6. Полная картина ОТО

Автор	Что сделал	Оценка вклада
Лоренц	Создал преобразования, показал сокращение длины и замедление времени.	Математика СТО.
Пуанкаре	Ввёл 4D-пространство, сформулировал принцип относительности.	Геометрия СТО.
Эйнштейн	Убрал движущийся эфир, создал СТО как новую интерпретацию.	Физическое описание СТО.
Гроссман	Объяснил Эйнштейну тензоры и риманову геометрию.	Математика ОТО.
Эйнштейн	Сформулировал физические принципы (эквивалентность, геометризация) вывел окончательные уравнения ОТО.	Физическая интерпретация ОТО. Уравнения ОТО.
Шварцшильд	Нашёл первое точное решение (метрика).	Физика чёрных дыр.

ИТОГОВАЯ ФОРМУЛИРОВКА

Общая Теория Относительности — это:

1. **Математика:** Риманова геометрия + тензорное исчисление (Гаусс, Риман, Риччи, Леви-Чивита).
2. **Итоговое уравнение:** Альбертом Эйнштейном (25 ноября 1915).
3. **Физическая интерпретация:** Гравитация как искривление пространства-времени (Эйнштейн).
4. **Онтологический статус:** Континуальное приближение дискретной пиксельной решётки (ТАО).

Глава 7. Победа Эйнштейна

Часть 1. Разные взгляды.

Взгляд Лоренца:

«Есть нечто реальное, что служит опорой для всех процессов. Это — эфир. Он абсолютен. В нём есть выделенная система отсчёта. Все эффекты сокращения и замедления — это реальные деформации тел, движущихся сквозь эфир. Но эфир не един. Есть две его формы: покоящийся эфир — абсолютный фон, и движущийся эфир — эфир, увлекаемый телами. Между ними нужна формула перехода. Я ищу её».

Где Лоренц стопорнулся (не дошёл):

Что он понял	Что он НЕ понял
Эфир есть.	Эфир — это само пространство, а не среда, заполняющая пространство.
Есть покоящийся и движущийся эфир.	Нет двух эфиров. Есть одна пиксельная решётка. «Движущийся эфир» — это иллюзия, возникающая из-за деформации решётки.
Нужна формула перехода между ними.	Формула перехода не нужна. Преобразования Лоренца — это не переход между состояниями эфира, а подстройка паттернов под абсолютную решётку.
Эфир непрерывен.	Эфир дискретен. Он состоит из пикселей.
Движение — это перемещение тел сквозь эфир.	Движение — это переключение пикселей. Никакого «сквозь» нет.

Что Лоренц искал, но не нашёл:

Лоренц искал формулу, которая бы связывала:

- Покоящийся эфир (абсолютный фон).

- Движущийся эфир (эфир, увлекаемый телом).

- Наблюдаемые эффекты (сокращение длины, замедление времени).

Он думал, что нужно «пересчитать» всё из покоящегося эфира в движущийся.

Он не понял, что:

- Эфир един.
- Нет «движущегося» эфира.

Лоренц был реалистом. Для него реальность существовала независимо от наблюдателя. Эфир был этой реальностью.

Взгляд Эйнштейна (1905 год):

«Эфир не нужен для расчётов. Я убираю его как излишнюю сущность. Есть только пространство-время. Его свойства — это не результат взаимодействия со средой, а сама суть реальности. Все системы отсчёта равноправны. Сокращение длины и замедление времени — это не физические деформации, а геометрические свойства того, как мы измеряем. Это — метод, чтобы сделать физику вычислимой. Я не утверждаю, что эфира нет на самом деле. Я говорю, что он не нужен для расчётов».

Онтологические постулаты Эйнштейна (1905):

Постулат	Что это значит
Эфира нет	Нет абсолютной физической среды (для расчётов).
Пространство-время — это всё	Реальность — это 4D-континуум (геометрическая модель).
Нет выделенной системы	Все инерциальные системы равноправны (методологически).

Постулат	Что это значит
Сокращение длины — не физическое	Это не тело сжимается. Это просто разные измерения в разных системах отсчёта (геометрическая интерпретация).
Замедление времени — не физическое	Это не часы замедляются. Это просто разное течение времени в разных системах (геометрическая интерпретация).
Нет физической причины	Почему так? «Так устроено пространство-время» (временное допущение).

Эйнштейн взял:

1. Математику Лоренца — преобразования, которые работали для перехода между системами отсчёта.
2. Четырёхмерное пространство Пуанкаре — геометрию, которая объединяла пространство и время.
3. Принцип относительности (тоже сформулированный Пуанкаре) — идею, что законы физики одинаковы для всех инерциальных наблюдателей.

И сделал один решающий шаг: Он убрал эфир.

Зачем?

Чтобы не нужно было переводить покоящийся эфир в движущийся. Лоренц искал этот переход. Эйнштейн сказал: «Если эфира нет, то и переводить нечего».

Это был гениальный ход. Он, по сути, приравнял эфир к самому пространству. И это приблизило Эйнштейна к реальному пониманию физической картины Вселенной. Такой подход сделал физику вычислимой.

Оставались последние два шага:

- ответить на вопрос - зачем нужно замедление и сокращение длины?

- и на этой основе выявить структуру пространства.

Но ни Эйнштейн, да и не кто другой таким вопросом видимо не задавались в принципе, а если и задавались, то не смогли найти на них ответ.

До него физики пытались объяснить, как эфир взаимодействует с материей, как он увлекается, как он сокращается. Это было запутанно. Эйнштейн сказал:

«Давайте считать, что эфира нет. Тогда все задачи решаются проще. Мы можем вычислять, не думая о среде».

Это был чисто методологический шаг. Эйнштейн не утверждал, что эфира нет на самом деле. Он утверждал, что для расчётов эфир не нужен.

И тут он оказался прав, потому что это приравнивало эфир к самому пространству и приблизило взгляд Эйнштейна к реальному устройству Вселенной ближе, чем все остальные взгляды.

Часть 2. Один итог

2.1 Что говорил Пуанкаре об Эйнштейне.

Пуанкаре был более авторитетным математиком:

- Он не считал СТО чем-то революционным.
- Он говорил: *«Эйнштейн просто взял то, что уже было известно, и дал этому новую интерпретацию»*.
- Он отказывался признавать эфир несуществующим.

Пуанкаре до конца жизни считал, что эфир есть, но его невозможно обнаружить из-за сокращения длины.

2.2 Что говорил Лоренц об Эйнштейне

Лоренц говорил:

«Эйнштейн гениально упростил вещи, но я не могу принять, что эфира нет. Мои формулы выводятся из эфира. Если эфира нет, то откуда берутся эффекты?»

Лоренц считал, что Эйнштейн придумал «пустую геометрию» без физической причины. Он признавал незаурядность Эйнштейна. Но он не понимал его философию. Он говорил: "Эйнштейн убрал эфир, но я всё равно чувствую, что он есть". Лоренц выдвигал Эйнштейна на Нобелевскую премию, но не за теорию относительности. Он считал, что его работа по фотоэффекту — более надёжна. Потому что там была экспериментальная проверка.

Лоренц знал, что его формулы работают. Он знал, что они выводятся из предположения о существовании эфира. Он чувствовал, что эфир должен быть, потому что без него нет физической причины для эффектов.

Он говорил:

«Я не могу представить себе электромагнитные волны без среды, которая колеблется. Пустота не может колебаться».

Лоренц был онтологически честен. Он не мог принять идею, что «пространство само искривляется» без физического носителя.

Часть 3. Почему Эйнштейн, а не Лоренц

Причина	Объяснение
Простота	Теория Эйнштейна была проще: не нужно было объяснять, что такое эфир и как он взаимодействует с материей.
Математическая красота	Геометрия пространства-времени казалась более «чистой» и «фундаментальной», чем физическая среда.
Экспериментальная неопределённость	Эксперименты (Майкельсон-Морли) не обнаружили эфирный ветер. Эйнштейн сказал: «Значит, эфира

Причина	Объяснение
	нет». Лоренц сказал: «Значит, эфир увлекается или сокращается».
Культ математики	XX век стал веком математической физики. Геометрия стала казаться более «глубокой», чем физическая среда.

Эйнштейн предложил готовый математический аппарат без онтологических обязательств. Физика выбрала удобство.

Часть 4. Мироощущение Эйнштейна (1920):

«Согласно общей теории относительности, пространство немыслимо без эфира. Пространство обладает физическими свойствами. Эти свойства не могут быть просто "геометрией". Должна быть среда, которая эти свойства несёт. Я называю это эфиром. Но это не старый эфир Лоренца. Это новый, релятивистский эфир. Я не знаю, как он устроен. Но я знаю, что он есть»

Онтологические постулаты Эйнштейна (1920 — признание):

Постулат	Что это значит
Эфир есть	Пространство обладает физическими свойствами. Нужна среда-носитель.
Пространство-время — не всё	Геометрия — это описание, а не реальность. За ней стоит физическая среда.
Выделенная система есть	Есть абсолютная система, но она недоступна прямому измерению.

Постулат	Что это значит
Сокращение длины — физическое	Это реальное изменение тел, вызванное взаимодействием с эфиром.
Замедление времени — физическое	Это реальное замедление часов, вызванное взаимодействием с эфиром.
Физическая причина есть	Причина эффектов — взаимодействие с эфиром. Но структура эфира неизвестна.

Где Эйнштейн остановился (не дошёл):

Что он понял к 1920 г	**Что он НЕ понял**
Пространство — это физическая среда.	**Пространство дискретно.**
Эфир есть.	**Эфир — это пиксельная решётка.**
Геометрия — не реальность.	**Реальность — это решётка + Алгоритм.**
Нужна физическая причина эффектов.	**Причина — деформация решётки и работа Алгоритма.**

Эйнштейн не мог открыть пиксельную решётку. (*Додуматься до Абсолютной пиксельной решётки в то время было нереально для любого физика – Теории информации не существовало.*)

Что он знал:

- Эфир должен быть физической средой.

- Эта среда должна обладать упругостью, чтобы передавать волны.

- Она не может быть «старым» эфиром Лоренца (неподвижным и непрерывным).

Чего он НЕ знал:

- Эфир дискретен.

- Он состоит из пикселей размером $l_P \approx 1.6\times10^{-35}$ м.

- Гравитация — это не искривление геометрии, а деформация пиксельной решётки.

- Время — это частота обновления решётки.

- Алгоритм управляет переключениями.

Почему он не мог это знать?

В 1920 году не было никаких экспериментов, которые указывали на дискретность пространства. Квантовая механика только зарождалась. Планковская длина была известна, но никто не понимал, что это такое на самом деле. Теории информации не существовало в принципе. Он мыслил в рамках непрерывных полей, потому что вся физика того времени была континуальной. Он стоял на пороге, но не мог переступить.

ТАО завершает то, что начали Лоренц и Эйнштейн:

> - Лоренц искал формулу перехода — ТАО показывает, что формула не нужна.
>
> - Эйнштейн искал физическую причину — ТАО даёт причину (деформация решётки).
>
> - Оба искали структуру пространства — ТАО даёт структуру (пиксельная решётка)».

Заслуги Эйнштейна

Открытие	Год	Что это дало
Фотоэффект	1905	Интерпретировал, что свет — это кванты (фотоны) с энергией $E = hv$ *(формула Планка)*. За это получил Нобелевскую премию (1921).
Формула $E = mc^2$	1905	Показал эквивалентность массы и энергии. Основа ядерной физики.
Броуновское движение	1905	Доказал существование атомов и молекул.
Специальная теория относительности (СТО)	1905	Объединил пространство и время, показал постоянство скорости света.
Общая теория относительности (ОТО)	1915	Описал гравитацию как искривление пространства-времени.
Квантовая статистика (конденсат Бозе-Эйнштейна)	1924–1925	Предсказал новое состояние вещества.

Эйнштейн был безусловным титаном. Без него физика была бы другой. Он реально двинул науку далеко вперёд.

Но никто больше к Эйнштейну «образца» 1920 года не прислушивался. Физика «проглотила» его взгляды 1905 - 1915 года и выбила это в граните.

Часть 5. Немного юмора.

— Эйнштейн сидит в баре, грустный.
— Подходит Бор: "Альберт, что случилось? Опять теорию относительности кто-то раскритиковал?"
— Эйнштейн вздыхает: "Да нет... Нильс, я понял, что моя ОТО —

это просто приближение для дискретной решётки. Я как бы описал гладкую дорогу, а она оказалась пиксельной плиткой".
— Бор: "Ну и что? Ты же всё равно гений!"
— Эйнштейн: "Гений-то гений, но теперь какой-то парень из интернета объяснил мне, что я искал вечный двигатель. И знаешь, что обидно?"
— Бор: "Что?"
— Эйнштейн: "Он оказался прав."

Глава 8. Внешний Алгоритм

Часть 1. В чём суть вопроса

Критики ТАО скажут:

«Внешний Алгоритм — это метафизическое допущение. Это ненаучно. Вы вводите «Бога из машины», чтобы объяснить то, что не понимаете».

Но давайте посмотрим на это честно. Что говорит Эйнштейн? В Общей теории относительности постулируется:

«Пространство-время искривляется в присутствии массы и энергии. Тела движутся по геодезическим линиям в этом искривлённом пространстве-времени».

Вопрос**:** «Почему пространство-время искривляется? Почему оно вообще имеет такую структуру? Почему геодезические именно такие?»

Ответ Эйнштейна: «Природа так устроена. Это фундаментальное свойство пространства-времени. Мы не знаем, почему оно так работает. Мы просто описываем, как оно работает».

Что говорит ТАО? В Теории Абсолютной Относительности постулируется:

«Пространство — это трёхмерная пиксельная решётка. Пиксели могут быть в состоянии 0 или 1. Они переключаются по определённым правилам (Внешнему Алгоритму). Материя — это паттерны активных пикселей. Гравитация — это деформация решётки».

Вопрос: «Почему пиксели переключаются? Почему они вообще есть? Почему скорость переключения именно планковская?»

Ответ ТАО: «Природа так устроена. Это фундаментальное свойство решётки. Мы не знаем, почему оно так работает. Мы просто описываем, как оно работает».

Часть 2. Почему «Внешний Алгоритм» звучит как-то «ненаучно»

Это исторический и лингвистический эффект:

- Эйнштейн пришёл первым. Его терминология стала «золотым стандартом».

- Слова «искривление пространства-времени» звучат привычно — мы слышим их 100 лет.

- Слова «Внешний Алгоритм» звучат непривычно — они новые.

Но это не делает их менее научными. Если мы принимаем, что пространство может искривляться «**просто потому что**», то мы обязаны принять, что пиксели могут переключаться «**просто потому что**».

Вы можете использовать любое другое название. Суть от этого не изменится.

Название	Что означает
Фундаментальный закон решётки	Правила переключения пикселей — это просто закон природы
Код реальности	Пиксели переключаются по внутреннему коду
Динамика пикселей	Переключения — это просто динамика системы
Природа так устроена	Как у Эйнштейна — просто фундаментальное свойство
Имманентный алгоритм	Алгоритм не «внешний», а встроенный в структуру решётки

Суть одна: пиксели переключаются по правилам. Почему? Природа так устроена.

Критики ТАО скажут:

«Вы вводите «Внешний Алгоритм», чтобы объяснить, почему пиксели переключаются. Но тогда вы должны объяснить, откуда взялся сам Алгоритм. Это бесконечная регрессия».

Но это же относится и к ОТО!

- Почему пространство-время искривляется? → «Природа так устроена».

- Почему пиксели переключаются? → «Природа так устроена».

В обоих случаях мы упираемся в фундаментальный закон, который не имеет дальнейшего объяснения с точки зрения именно научного подхода.

Часть 3. Что делает теорию ненаучной

Научная теория должна:

1. Иметь математический формализм.

   У ТАО есть интегральные уравнения, формулы, квантование деформации.

2. Делать проверяемые предсказания.

   У ТАО есть:

   - Аномалии JWST, дискретность углов, коэффициент когерентности, постоянная тонкой структур

   - Деформатор (См. раздел Топодинамика)

   - Синтезатор (См. раздел Топодинамика)

3. Быть фальсифицируемой. (если найдут тёмную материю и энергию — ТАО падёт).

Между постулатом Эйнштейна («пространство-время искривляется само по себе») и постулатом ТАО («пиксели переключаются по правилам») нет принципиальной разницы. И то, и другое — это фундаментальные свойства реальности, которые мы не можем объяснить глубже с точки зрения научного подхода.

Суть от этого не изменится: пиксели переключаются, потому что такова структура реальности.

Критика «Внешнего Алгоритма» как «ненаучного» — это двойной стандарт, потому что «искривление пространства-времени» — это точно такой же необъяснимый постулат.

ТАО не менее научна, чем ОТО. Она предлагает другую онтологию, которая, очевидно, более последовательна и объяснительна.

Часть 4. Для ярких антиметафизиков. Или: почему «Внешний Алгоритм» — это не религия, а просто честное название того, что уже есть в физике.

Этот текст — для тех, кто:

- Считает себя полным материалистом (реальность — это только материя, ничего сверхъестественного).

- Не любит метафизику (философские рассуждения о том, что «за пределами» физики).

- Требует, чтобы теория объясняла всё изнутри, без внешних сущностей.

ТАО слышит вас. ТАО слышит вашу позицию. Но давайте посмотрим честно на то, что уже есть в физике. В Общей теории относительности есть постулат:

«Пространство-время искривляется в присутствии массы и энергии. Тела движутся по геодезическим».

Вопрос: «*Почему пространство-время искривляется? Откуда у него это свойство? Кто или что задало эти правила?»*

Ответ Эйнштейна: «*Просто Природа так устроена. Это фундаментальное свойство. Дальше не спрашиваем*».

Это — метафизика. Спрятанная, замаскированная под «геометрию», но метафизика.

Потому что:

- Нет физического механизма. Пространство в ОТО — это не среда, а математическая конструкция.

- Нет ответа на вопрос «почему». Только «как».

- Нет объяснения происхождения законов. Они просто «есть».

Это — скрытая метафизика. И она не лучше и не хуже явной.

В Теории Абсолютной Относительности есть постулат:

«Пространство — это трёхмерная пиксельная решётка. Пиксели переключаются по правилам (Внешнему Алгоритму)».

Вопрос: «*Почему пиксели переключаются? Откуда у них это свойство? Кто или что задало эти правила?»*

Ответ ТАО: «*Природа так устроена. Это фундаментальное свойство. Дальше не спрашиваем*».

Это — метафизика. Но явная и честная. Потому что:

- Есть физический механизм. Пространство — это упругая среда.

- Есть ответ на вопрос «почему». Потому что такова структура решётки.

- Есть объяснение происхождения законов. Это правила переключения пикселей.

Это — тоже метафизика. Но она честнее скрытой.

Тут яркие антиметафизики должны задуматься. В ОТО пространство — это пустота с математическими свойствами. Она не имеет структуры. Она просто «есть».

В ТАО пространство — это физическая среда (пиксельная решётка). У неё есть:

- Размер (планковская длина).

- Время (планковский такт).

- Энергия (активные и нулевые пиксели).

- Упругость (деформация).

Это — материализм! Пространство — это не абстракция, а физический объект!

«Внешний Алгоритм» как проявление — это набор правил! Как законы физики в ОТО. Они тоже «внешние» по отношению к материи — они не вытекают из материи, а управляют ею. Разница только в том, что ТАО честно называет это «Алгоритмом», а ОТО прячет за словами «геометрия» и «природа так устроена».

Часть 5. ТАО не менее научна, чем ОТО

Научная теория должна:

- Иметь математический формализм.

- Делать проверяемые предсказания.

- Быть фальсифицируемой.

«Внешний Алгоритм» не влияет на эти пункты. Это метафизическая надстройка, которая может быть условно формализована. ТАО научна ровно настолько же, насколько научна ОТО!

Часть 6. Главный аргумент антиметафизиков

«Я не верю во «Внешний Алгоритм». Я верю, что законы физики — это просто свойства материи».

Хорошо. Тогда назовите это не «Внешним Алгоритмом», а «фундаментальными свойствами пиксельной решётки»:

- Пиксели переключаются, потому что такова их природа.

- Скорость переключения — планковская, потому что такова природа решётки.

- Деформация создаёт гравитацию, потому что такова природа упругой среды.

Это ровно то же самое, что говорит Эйнштейн:

- Пространство-время искривляется, потому что такова его природа.

- Тела движутся по геодезическим, потому что такова природа геометрии.

- Гравитация — это искривление, потому что такова природа пространства-времени.

Разница только в терминологии. ТАО просто называет свойства решётки, а не скрывает их за словами «геодезические» и «искривление».

Часть 7. Дорогой антиметафизик!

Ты веришь, что реальность состоит из материи и её свойств. Но посмотри хотя бы раз, но честно: в ОТО пространство — это не материя. Это математическая абстракция, которая «искривляется» без физического механизма.

В ТАО пространство — это материя. Это пиксельная решётка. Она имеет физические свойства: размер, время, энергию, упругость. Она деформируется по чёткому и понятному физическому механизму.

«Внешний Алгоритм» — это для тебя может быть просто название для правил, по которым эта решётка работает. Если тебе не нравится слово «Алгоритм» или «Внешний» — называй это «фундаментальными свойствами решётки».

Суть не изменится:

- ОТО: «Пространство-время искривляется. Почему? Природа так устроена».

- ТАО: «Пиксели переключаются. Почему? Природа так устроена».

Это одно и то же. ТАО просто честнее. ТАО — это ещё не религия. Это физика. Просто физика, которая не прячет свои допущения, а объявляет их явно.

P.S. Ты не обязан верить в Бога, чтобы принять ТАО. Ты можешь остановиться на «Внешнем Алгоритме» как на данности, не спрашивая, Кто его создал. Но если ты спросишь — ТАО не уводит тебя в сторону. Она говорит: «Вот дверь. Дальше — не физика. Дальше — твой выбор». И этот выбор не противоречит ни науке, ни разуму. Потому что разум сам упирается в эту дверь.

Глава 8. Фотон

Часть 1. Как физика «забыла» рассказать, что такое фотон на самом деле.

В учебниках пишут:

«Фотон — это квант электромагнитного излучения. Он не имеет массы, движется со скоростью света и обладает энергией E=hv.»

Всё. Точка. Ни слова о том, как он устроен. Ни слова о том, есть ли у него размер. Ни слова о том, почему у него именно такая энергия. Фотон — это просто «частица света». А что такое «частица» в этом контексте — не объясняется.

Физика никогда не давала фотону онтологии. Она дала ему математику:

- $E = h\nu$ — формула.

- $p = h/\lambda$ — формула.

- $\lambda = h/p$ — формула.

Но ни одна из этих формул не говорит, что такое фотон физически. Это, как если бы вы описали автомобиль как «объект, который движется со скоростью v и имеет энергию $E = mv^2/2$», но при этом никогда не сказали бы, что у него есть колёса, двигатель и руль.

Почему так вышло? Потому что физики боялись дать фотону структуру. Если у фотона есть размер, то он не точечный. Если он не точечный, то его надо как-то описывать геометрически, но что конкретно обладает этой геометрией? Если он вращается, то что конкретно вращается? Какая субстанция вращается?

Проще было сказать: «Фотон — это квант». И закрыть тему.

Но что тогда такое фотон на самом деле?

Фотон — это не точка. Фотон — это разомкнутая цепочка активных пикселей, свёрнутая в трёхмерную спираль.

- Длина волны λ — это шаг этой спирали.

- Амплитуда A — это её радиус (поперечный размер).

- Энергия $E = hv$ — это энергия одного периода (одного витка) этой спирали.

- Полная энергия фотона — это энергия всех периодов в цепочке.

Фотон — это не «квант». Квант — это один период фотона.

Но почему об этом не говорят? Потому что это меняет всё:

- Если фотон — это спираль, то у него есть размер.

- Если у него есть размер, то амплитуда — это не абстракция, а реальный параметр.

- Если амплитуда реальна, то постоянная Планка h — это не «квант действия», а коэффициент, связывающий длину волны и амплитуду.

Это переворачивает всё понимание квантовой физики.

ТАО даёт ответы на все эти вопросы.

Часть 2. Фотон в ТАО: разомкнутая спираль

Фотон — это разомкнутая цепочка активных пикселей, свёрнутая в трёхмерную спираль (как ДНК, как пружина, как винтовая лестница).

Свойство	Описание в ТАО
Топология	Разомкнутая цепочка (не замкнута в петлю)
Масса	0 (нет замыкания)
Спин	1 (полный оборот поляризации)
Движение	Всегда со скоростью $c = l_P / t_P$
Энергия	$E = N \cdot \varepsilon_1$, где N — число пикселей в одном периоде, ε_1 – энергия активного пикселя

Связь с электроном:

- Электрон — замкнутая спираль.

- Фотон — разомкнутая спираль (та же геометрия, но без замыкания).

Структура фотона: длина волны, амплитуда, поляризация

Параметр	Что это в ТАО	Обозначение
Длина волны	Шаг спирали (расстояние между витками)	λ
Амплитуда	Радиус спирали (поперечный размер)	A
Поляризация	Направление вращения спирали (правая / левая)	—
Энергия	Количество пикселей в одном периоде	$E = hc/\lambda = N \cdot \varepsilon_1$

Фотон — это не точка. У него есть реальный продольный размер (λ) и поперечный размер (A).

Амплитуда фотона: почему её игнорируют в КМ

В квантовой механике **амплитуда** — это:

- Для волны: коэффициент перед синусом (обычно нормируется на 1).

- Для вероятности: $|\Psi|^2$.

Но геометрическая амплитуда (поперечный размер фотона) в КМ отсутствует:

- Фотон считается точечным.

- Его «размер» не входит в уравнения.

- Важна только длина волны и энергия.

В ТАО мы возвращаем амплитуду как физический размер.

Часть 3. Энергия фотона

Когда физики пишут просто $E = hv$, они подразумевают, что это энергия одного фотона. Да это звучит как энергия фотона. Но что такое фотон? Фотон с энергией? Точка с энергией? Поэтому в учебниках и лекциях это часто опускают, и формула начинает восприниматься как универсальный закон для всей энергии света. В результате возникает опасная неоднозначность:

- студент не знает, что фотон — это спираль. Он думает, что фотон — это точка.

- студент не знает, что у фотона есть период. Он думает, что фотон — это просто «квант».

- студент не знает, что энергия зависит от длины цепочки. Он думает, что энергия — это только частота. И так начинают думать даже не только студенты…

Энергия фотона — это количество активных пикселей в одной длине волны (одном периоде синусоиды).

Фотон — это длинная спиральная цепочка активных пикселей. Она может быть:

- Длинной (много пикселей) → энергия большая.

- Короткой (мало пикселей) → энергия малая.

Но эта цепочка не излучается и не поглощается целиком, а поглощается и излучается только порциями. Фотон — это непрерывная цепочка, но при взаимодействии с веществом она поглощается не целиком, а по одному периоду (одной длине волны).

Потому что:

- Атом (электрон) может поглотить только один квант за один переход.

- Квант — это энергия, соответствующая одной длине волны.

Фотон действительно излучается и поглощается квантами с энергией $E = hv$, которая равна энергии одного периода (одной длины волны).

Формула $E = hv$

Это — энергия одного периода синусоиды фотона.

- v — частота (число периодов в секунду).

- h — энергия × время одного периода.

То есть hv — это энергия, заключённая в одной длине волны.

Если фотон имеет 10 периодов, его полная энергия — $10 \cdot hv$, но каждый период — отдельный квант.

Это не говорят в физике, потому что:

- В КМ фотон — точечный.

- Нет понятия «период как физический объект».

- Нет понятия «цепочка пикселей».

- Нет понятия «поглощение одного периода».

В КМ говорят: «Фотон поглощается целиком». Но на самом деле поглощается один период цепочки.

Поглощаемая энергия — это энергия одного периода синусоиды фотона. Фотон — это длинная цепочка, при взаимодействии с атомом цепочка «разрывается» на периоды. Один период поглощается. Остальная часть цепочки продолжает лететь (или переизлучается).

Это и есть квантование.

В результате правильная формула:

$$E_{\text{поглощ}} = hv \quad - \quad \textbf{энергия одного периода фотона.}$$

Часть 4. Постоянная Планка.

Что делает постоянная Планка

h — это коэффициент, который задаёт геометрию фотона.

Она связывает:

- Длину волны λ (продольный размер),

- Амплитуду A (поперечный размер),

- Энергию E.

Из этой формулы следует:

Для каждой длины волны существует ровно одна амплитуда!

Выведем энергию кванта (периода длины волны) через длину цепочки

- Длина цепочки за один период — это длина синусоиды L.

- Число пикселей в цепочке:

$$N = \frac{L}{l_P}$$

где l_P — планковская длина (шаг решётки).

- Энергия цепочки:

$E = N \cdot \varepsilon_1$

где ε_1 — энергия одного активного пикселя.

То есть:

$$E = \frac{L}{l_P} \cdot \varepsilon_1$$

Длина синусоиды

Для синусоиды $y = A\ sin(2\ \pi\ x/\lambda)$

длина дуги за один период:

$$L = \int_0^{\lambda} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx$$

Производная:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2\pi A}{\lambda} \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} x\right)$$

При малых A ($A \ll \lambda$):

$$L \approx \lambda + \frac{\pi^2 A^2}{\lambda}$$

Это — длина одного периода синусоиды.

Приравниваем энергии

Теперь у нас два выражения для энергии:

1. Из классики:

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

2. Из ТАО:

$$E = \frac{L}{l_P} \cdot \varepsilon_1$$

Приравниваем:

$$\frac{hc}{\lambda} = \frac{\varepsilon_1}{l_P} \cdot \left(\lambda + \frac{\pi^2 A^2}{\lambda}\right)$$

Умножаем на λ:

$$hc = \frac{\varepsilon_1}{l_P}\left(\lambda^2 + \pi^2 A^2\right)$$

Выражаем h:

$$h = \frac{\varepsilon_1}{c \cdot l_P}\left(\lambda^2 + \pi^2 A^2\right)$$

Это — связь h, λ, A.

Выражаем A:

$$\pi^2 A^2 = \frac{hcl_P}{\varepsilon_1} - \lambda^2$$

$$A = \frac{1}{\pi}\sqrt{\frac{hcl_P}{\varepsilon_1} - \lambda^2}$$

Обозначаем константу:

$$C = \frac{hcl_P}{\varepsilon_1}$$

Тогда:

$$\boxed{A = \frac{1}{\pi}\sqrt{C - \lambda^2}}$$

Символ	Что означает
h	Постоянная Планка — связывает длину волны и амплитуду
λ	Длина волны (шаг спирали)
A	Амплитуда (радиус спирали)
ε_1	Энергия одного активного пикселя
l_P	Шаг пиксельной решётки
c	Скорость света

Это означает, что для каждой длины волны λ существует единственная амплитуда *A*, при которой фотон может существовать. Фотон не может иметь произвольную амплитуду — она жёстко задана его длиной волны.

Численная проверка

Обозначим константу

$$C = \frac{hcl_P}{\varepsilon_1}$$

Численно:

- $h = 6{,}626 \times 10^{-34}$
- $c = 3 \times 10^{8}$
- $l_P = 1{,}616 \times 10^{-35}$
- $\varepsilon_1 = 1{,}41 \times 10^{-37}$

$$C = \frac{6,626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8} \times 1,616 \times 10^{-35}}{1,41 \times 10^{-37}}$$

$$C = \frac{3,209 \times 10^{-60}}{1,41 \times 10^{-37}} = 2,276 \times 10^{-23}\ \text{м}^2$$

Итоговая формула:

$$\boxed{A(\lambda) = \frac{1}{\pi}\sqrt{2,276 \times 10^{-23} - \lambda^2}}$$

Условие существования:

$$\lambda \leq \sqrt{2,276 \times 10^{-23}} \approx 4,77 \times 10^{-12}\ \text{м}$$

Мы получили критическую длину волны фотона:

$$\boldsymbol{\lambda < 4{,}77 \times 10^{-12}\ \text{м}.}$$

Часть 5. Критическая длина волны фотона

Мы вывели:

$$\lambda_{\text{крит}} = \sqrt{\frac{hcl_P}{\varepsilon_1}} \approx 4.77 \times 10^{-12}\,\text{м}$$

Критическая длина волны фотона попадает в рентгеновский диапазон. Это область мягкого рентгена, который находится на границе между ультрафиолетом и жёстким рентгеном. Это не граница существования фотона. Это граница между двумя типами периодической структуры фотона:

- Для $\lambda < \lambda_{\text{крит}}$ — фотон — это спираль (внутренняя синусоидальная цепочка пикселей). Длина цепочки больше длины волны. Пикселей

достаточно, чтобы образовать спираль. Есть амплитуда, есть спин, есть фотоэффект. Излучение идёт непрерывным потоком (лучом).

- Для $\lambda > \lambda_{крит}$ — фотон — это почти прямая цепочка пикселей (мы принимали допущения). Длина цепочки почти равна длины волны. Амплитуда, спин и фотоэффект ослабевают, но не исчезают их проявление становится трудноопределяемым эксперементально.

Часть 6. Что происходит с длиной волны, структурой и квантовыми эффектами

Диапазон	Структура фотона	Спин	Фотоэффект	Почему
Гамма ($\lambda \ll \lambda_{крит}$)	Спираль (цепочка длиннее волны)	Выраженный	Максимальный	Пикселей много, амплитуда велика. Фотон — плотная спираль. Взаимодействует сильно.
Рентген ($\lambda \approx \lambda_{крит}$)	Спираль на пределе	Заметный	Заметный	Непрерывная спираль ещё есть, но уже на грани. Эффекты заметны, но слабее, чем у гаммы.
УФ / Видимый ($\lambda > \lambda_{крит}$)	Переходная: спираль распадается, появляются цепочки + пустые траектории	Ослабленный	Ослабленный	Непрерывной спирали уже нет. Фотон как аналог частицы (безмассовый) летит по траектории. Эффекты есть, но слабее.

Диапазон	Структура фотона	Спин	Фотоэффект	Почему
ИК / Радио ($\lambda \gg \lambda_{крит}$)	Цепочка + волна де Бройля	Почти незаметный	Почти незаметный	Фотон, как аналог частицы (безмассовый) — летит по синусоидальной траектории. Пустых участков много. Чтобы увидеть спин или фотоэффект, нужны сверхчувствительные опыты (например, болометры при микро-Кельвинах).

Часть 7. Центральный механизм: переход от непрерывного луча к де-бройлевской волне.

Режим для $\lambda < \lambda_{крит}$:

- Фотон — это спиральная цепочка активных пикселей.

- Цепочка непрерывна — пиксели идут один за другим без разрывов.

- Излучение идёт сплошным потоком (лучом).

- Нет пустых промежутков между фотонами.

- Это — волновая природа света: интерференция, дифракция, непрерывный спектр.

Режим для $\lambda = \lambda_{крит}$:

- Длина цепочки пикселей равна длине волны.

- Фотон ещё может быть спиралью, но на пределе.

Режим для $\lambda > \lambda_{крит}$:

- Длина цепочки пикселей становится меньше длины волны.

- Пикселей не хватает, чтобы заполнить всю длину волны.

- Непрерывная цепочка разрывается.

При разрыве цепочки излучение перестаёт быть непрерывным потоком фотонов, как неразрывная цепочка периодов. Она распадается на отдельные участки – отдельные фотоны. Между этими фотонами возникают пустые промежутки. Это — ключевой момент:

- В коротких волнах фотоны летят сплошным потоком.

- В длинных волнах фотоны летят отдельными порциями.

- Между порциями — «пустота» (нет активных пикселей- нулевые пиксели).

Фотоны превращаются в Де Бройлевскую волну:

- Фотон — это почти прямая цепочка пикселей.

- Он летит не по прямой, а по синусоидальной траектории.

- Длина волны λ — это шаг этой траектории.

- Сами фотоны являются аналогами корпускулярных частиц (безмассовые), но движущихся со скоростью света.

Это де-бройлевская волна, движущаяся со скоростью света! Фотон (как цепочка) всегда летит со скоростью c. В длинных волнах он летит по синусоиде, но средняя скорость вдоль оси — c. Скорость света не меняется. Меняется траектория.

На де-бройлевскую волну также распространяется формула Планка:

$$E = hv$$

- Для коротких волн: v — частота спирали (число витков в секунду).

- Для длинных волн: v — частота траектории (число шагов де Бройля в секунду).

Формула одна. Структура разная. Но энергия одного периода всегда равна hv.

Чем больше длина волны, тем пустые отрезки траектории увеличиваются всё больше и больше

Длина волны	**Длина цепочки**	**Пустые участки**	**Структура**
$\lambda \ll \lambda_{крит}$	$L_{цеп} \gg \lambda$	Нет	Непрерывная спираль
$\lambda = \lambda_{крит}$	$L_{цеп} = \lambda$	Граница	Предел спирали
$\lambda \gg \lambda_{крит}$	$L_{цеп} \ll \lambda$	Огромные	Отдельные порции, пустые промежутки

Формула $E = hv$ работает всегда. Формула не ломается. Она описывает энергию одного периода любой периодической структуры — спиральной или траекторной.

Наглядные примеры

Тип волны	**Длина волны**	**Длина цепочки**	**Пустые участки**	**Что мы видим**
Гамма	10^{-14} м	2.28×10^{-9} м	Нет	Сплошной луч (волна).
Рентген	10^{-11} м	2.28×10^{-12} м	Почти нет	Почти сплошной луч.
Критическая	4.77×10^{-12} м	4.77×10^{-12} м	Граница	Переход.

Тип волны	Длина волны	Длина цепочки	Пустые участки	Что мы видим
Видимый	5×10^{-7} м	4.56×10^{-17} м	Огромные	Отдельные фотоны (частицы).
Радио	11 м	2.28×10^{-23} м	Колоссальные	Редкие порции (частицы).

Видимый свет ($\lambda \approx 5\times10^{-7}$ м) — это пограничная зона:

- У него есть пустые участки, но они не очень большие.

- Он может интерферировать и дифрагировать — потому что пустоты не настолько велики, чтобы разрушить волновую картину.

- Но он уже показывает корпускулярные свойства — фотоны как частицы (безмассовые).

Чем длиннее волна, тем больше пустот, тем слабее волновые свойства. Этот механизм объясняет корпускулярно-волновой дуализм полностью: он не зависит от «наблюдателя» или «измерения», а зависит от структуры фотона и отношения длины цепочки к длине волны.

Часть 8. Экспериментальное подтверждение

8.1 Экспериментальное подтверждение №1: многофотонный фотоэффект в ИК-диапазоне

В классическом фотоэффекте электрон поглощает один фотон. Если энергии одного фотона не хватает (частота ниже «красной границы»), эффект не наблюдается вообще. Однако, если интенсивность света огромна, электрон может поглотить несколько фотонов одновременно. Это многофотонный фотоэффект. В работе Jick H. Yee (1973) теоретически показано, что в инфракрасном диапазоне (где энергия одного фотона мала) поверхностный фотоэффект становится двухфотонным. То есть для

выбивания электрона требуется одновременное поглощение двух инфракрасных фотонов.

Это полностью соответствует ТАО:

- В ИК-диапазоне ($\lambda \gg \lambda_{крит}$) фотон — это разреженная цепочка с пустыми промежутками.
- Энергии одного фотона не хватает, чтобы выбить электрон.
- Нужно «схватить» сразу несколько таких порций.

Вывод: тот факт, что в ИК-диапазоне фотоэффект становится многофотонным, напрямую доказывает, что фотон там не является плотной спиралью. Он ведёт себя как отдельная «порция», которой не хватает энергии в одиночку.

8.2. Экспериментальное подтверждение №2: бифотон и длина волны $\lambda/2$

В апреле 1999 года группа исследователей из Федерального университета Минас-Жерайс (Бразилия) под руководством Себастьяна де Падуа опубликовала в *Physical Review Letters* результаты эксперимента, подтвердившего предсказание Джейкобсона и Ямамото (1994).

Суть эксперимента:

1. Создан бифотон — квантовое состояние из двух фотонов, неразрывно связанных (спутанных).
2. Бифотон пропущен через двойную щель (интерферометр Юнга).
3. Измерена интерференционная картина.

Результат:

Интерференционная картина показала длину волны в два раза меньше, чем у каждого отдельного фотона в паре. То есть, если каждый фотон имел длину волны λ, то бифотон как единое целое вёл себя как объект с длиной волны $\lambda/2$.

Соответствие ТАО:

- Одиночный фотон — разомкнутая цепочка пикселей. Его длина волны — шаг спирали.

- Бифотон — две цепочки, связанные в один паттерн.

- Когда они летят вместе, их общая траектория — это новая структура с меньшим шагом.

- Этот меньший шаг = меньшая длина волны = λ/N.

Общая картина: один фотон — это один «шаг» синусоиды. Два фотона, летящие вместе, — это два шага, наложенных друг на друга. Их суммарный паттерн имеет более высокую частоту (меньшую длину волны).

В дальнейшем также получали подтверждения. В 2002 Эдамацу и коллеги подтвердили это для запутанных фотонов, летящих по разным путям.

Вывод: механизм «сжатия траектории» в ТАО — это физическое объяснение того, что в квантовой оптике называют «**фотонной волной де Бройля мультифотонного пакета**».

8.3 Экспериментальное подтверждение №3: порог $\lambda_{крит}$ и жёсткий рентген

ТАО предсказывает:

$$\lambda_{крит} \approx 4.77 \times 10^{-12} \text{ м}$$

Это граница мягкого рентгена.

- Для волн короче этой длины (жёсткий рентген, гамма) энергия одного фотона огромна, и он ведёт себя как плотная спираль, выбивая электроны в одиночку.

- Для волн длиннее этой длины (УФ, видимый, ИК, радио) фотон становится разреженной структурой, и для фотоэффекта требуется несколько фотонов.

Соответствие эксперименту

Это полностью согласуется с наблюдаемой картиной:

- В жёстком рентгене и гамма-диапазоне фотоэффект — однофотонный.

- В ИК-диапазоне — многофотонный (Yee, 1973).

- В видимом диапазоне — пограничная зона: возможен как однофотонный, так и многофотонный эффект в зависимости от интенсивности.

Часть 9. Как фотон взаимодействует с веществом

Фотон взаимодействует с атомом не через «квантовый скачок», а через свою геометрию. Амплитуда фотона определяет его поперечный размер. Чем больше амплитуда, тем больше фотон «задевает» атомы. Чем больше амплитуда, тем сильнее его гравитационная деформация решётки.

Короткие волны (гамма, рентген, УФ):

- λ мала → v велика → A велика.

- Фотон имеет большой поперечный размер.

- При приближении к объекту с атомарной структурой он летит не между атомами, а задевает электронную оболочку.

- Плотность пикселей (компактность синусоиды) велика, его деформация решётки передаётся электрону.

- фотон поглощается;

- Электрон либо увеличивает свою энергию, либо «выбивается» — это фотоэффект.

Длинные волны (ИК, радио):

- велика → v мала → A мала.

- Фотон имеет очень маленький поперечный размер.

- плотность пикселей (компактность синусоиды) мала, его деформация решётке не передаётся электрону.

- Он проходит сквозь атомную решётку, почти не взаимодействуя.

- Деформация решётки ничтожна.

- Электрон не получает достаточно энергии.

Важное уточнение:

Амплитуда фотона не исчезает скачком. Она плавно уменьшается с ростом длины волны. Для видимого света амплитуда ещё заметна — поэтому фотоэффект есть, хотя и слабее, чем у рентгена. Для радиоволн амплитуда настолько мала, что фотоэффект практически незаметен, но он существует — просто для его обнаружения нужны сверхчувствительные эксперименты.

Часть 8. Спин фотона

Рассмотрим теперь повнимательнее размерность формулы Планка:

$$E = hv$$

Где:

- E — энергия (Дж),

- v — частота (1/с),

- h — постоянная Планка.

Размерность h:

$$[h] = \text{Дж·с}$$

Но это — размерность момента импульса!!!

$$[L] = [mvr] = \text{кг·м/с·м} = \text{Дж·с}$$

Вывод:
h — это не «квант действия» в абстрактном смысле. Это — момент импульса периодической структуры фотона. Но момент импульса в КМ называется спином.

Постоянная Планка – это и есть спин фотона!

В КМ: *«Спин фотона равен ħ»*.
В ТАО: *«Стоп. ħ — это момент импульса на один радиан поворота фазы волны. А полный оборот (на 2π радиан) — это h. Постоянная Планка h — это момент импульса целого периода (одного полного витка спирали)»*.

Квантовая механика построена на экспоненте $e^{i\theta}$, где θ — это фаза волны (измеряемая в радианах). Математикам удобно работать в радианах, потому что производная экспоненты берется красиво. Они начали использовать $\hbar$ как "базовую единицу" просто для удобства расчетов, а потом забыли, что $\hbar$ — это всего лишь h, поделенная на 2π. Они стали считать $\hbar$ фундаментальной константой природы, хотя на самом деле фундаментальна геометрическая константа 2π и момент полного оборота h.

Теперь всё встает на свои места:

- Фотон делает один полный оборот (один виток спирали) за время одного периода $T = 1/\nu$.

- Момент импульса этого полного оборота равен h.

- Если мы смотрим на кусочек этого оборота (на 1 радиан), мы видим $\hbar$.

Это как с обычным вращающимся колесом: если колесо делает полный оборот, его момент импульса — это одно число. Если мы спросим, какой у него момент импульса на градус — мы поделим на 360. Но в квантовой физике они приняли, что $\hbar$ — это "атом" момента, хотя настоящий "атом" — это полный виток h.

Часть 10. Полная физическая формулировка

Постоянная Планка $\hbar$ — это момент импульса одного полного витка (периода) спиральной цепочки активных пикселей, из которой состоит фотон.

В КМ спин фотона равен $\hbar$ — моменту импульса на один радиан. Это — математическое удобство, связанное с использованием радианной меры. В ТАО физически первичен момент импульса полного периода — h. Спин $\hbar$ — это проекция этого момента на ось, приведённая к одному радиану.

Этот момент импульса одинаков для любого фотона, независимо от его длины волны, энергии или частоты. Именно это постоянство момента импульса одного витка и является физической причиной

квантования: энергия фотона всегда кратна *hv*, потому что каждый период (виток) спирали несёт ровно один квант момента импульса *h*, а энергия одного витка равна *hv*.

Часть 11. Как в физике произошла подмена амплитуды интенсивностью, а фотона - квантом

В классической физике амплитуда — это высота волны. Это её поперечный размер. Чем больше амплитуда, тем «толще» волна. Но в квантовой физике это понятие бесследно исчезло. Вместо неё появилась интенсивность — количество энергии, переносимое волной за единицу времени. Интенсивность зависит от числа фотонов, а не от их размера.

Физики сказали:

«Амплитуда отдельного фотона не имеет смысла, потому что фотон — точечный. А интенсивность — это число фотонов».

Но это — подмена. Они заменили геометрический размер одного фотона на статистику множества фотонов. И эту подмену никто не заметил, потому что:

- Для большинства экспериментов важна только интенсивность.

- Амплитуда отдельного фотона не нужна для расчётов.

- Вопрос «а что такое амплитуда фотона?» просто не задавался.

Амплитуда была похоронена под статистикой. В физике эти два слова: фотон и квант, используются как синонимы, но на самом деле они означают разные вещи. Фотон — это физический объект. Это частица света, целая цепочка активных пикселей, если говорить языком ТАО. Квант — это порция энергии. Это один период синусоиды, одна длина волны. Но в учебниках и лекциях это не различают и говорят:

- «Фотон имеет энергию $E=hv$».

- «Квант света — это фотон».

И создаётся впечатление, что фотон и квант — это одно и то же. Но это не так.

- Фотон — это целая цепочка периодов.

- Квант — это один период этой цепочки.

Фотон может содержать много квантов. Если бы физики просто предположили, что фотон — это спираль (или прямая цепочка, в зависимости от длины волны):

- Они бы сразу увидели, что амплитуда — это не абстракция, а реальный размер.

- Они бы поняли, что постоянная Планка h — это не только «квант действия», но и коэффициент, связывающий длину волны и амплитуду.

- Они бы увидели, что энергия фотона — это энергия одного периода спирали или одного периода траектории.

- Они бы поняли, что фотоэффект — это геометрическое взаимодействие, а не квантовый скачок.

- Они бы вывели критическую длину волны, разделяющую два режима существования фотона.

- Они бы поняли, что корпускулярно-волновой дуализм — это не загадка, а следствие структуры фотона и длины его цепочки.

И это объяснимо.

КМ — это математическая теория. Она не ставит вопрос "что такое фотон физически". Это — не ошибка, а метод. КМ работает феноменально точно. Однако КМ не даёт онтологии фотона. ТАО даёт эту онтологию. И тогда возникает вопрос: почему эксперименты не видят амплитуду фотона? Ответ: потому что амплитуда проявляется только в определённых условиях (короткие волны, сильные поля).

Глава 9. Электрон.

Часть 1. Комптоновская длина.

Чтобы дать чёткое физическое описание электрона, для начала определим очень важный его параметр – его комптоновскую длину, что она означает физически

1.1. Формула

$$\lambda_C = \frac{h}{mc}$$

В 1923 году Артур Комптон объяснил рассеяние рентгеновских фотонов на электронах. Он вывел, что изменение длины волны фотона при рассеянии равно:

$$\Delta\lambda = \lambda_C\,(1-\cos\theta)$$

где $\lambda_C = h\,/\,(mc)$ — константа.

Что о ней говорят в учебниках:

- Это характерный квантовый масштаб.

- Это длина волны фотона, энергия которого равна энергии покоя частицы.

- Это граница, где квантовые эффекты становятся важными.

- Это не размер частицы. Частица считается точечной.

Что она не означает в классике:

- Это не физический размер электрона.

- Это не длина какой-либо структуры.

- Это просто комбинация констант, которая появляется в формулах.

В классической физике λ_C — это математическая величина, а не физический объект.

Комптоновское рассеяние — это когда фотон (рентгеновский или гамма-луч) сталкивается с электроном, **как с волной,** и меняет свою длину волны.

Формула Комптона:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)$$

Где:

- λ — длина волны фотона до столкновения.

- λ' — длина волны фотона после столкновения.

- θ — угол рассеяния.

$\frac{h}{m_e c} = \lambda_C \approx 2.43 \times 10^{-12}$ м - комптоновская длина волны электрона.

Что это значит:

- Фотон «отталкивается» от электрона.

- Он теряет часть энергии.

- Его длина волны увеличивается.

- Величина изменения зависит только от угла и от комптоновской длины электрона.

Это — прямое экспериментальное подтверждение того, что у электрона есть характеристическая длина волны λ_C.

1.2 Как это связано с синусоидой

В ТАО электрон — это спиральная объёмная структура, проекция которой на плоскость даёт синусоиду с длиной волны λ_C.

Когда фотон сталкивается с электроном:

1. Он взаимодействует с синусоидальной цепочкой активных пикселей.
2. Он «передаёт» часть своей энергии этой цепочке.
3. Это меняет частоту колебания синусоиды.

4. Но электрон не может менять свою длину волны λ_C просто так — она определяется его массой.
5. Поэтому фотон сам меняет свою длину волны, а электрон остаётся «прежним» (но получает импульс).

Комптоновская длина λ_C — это «шаг» синусоиды электрона.

1.3 Почему это очевидно

Формула Комптона содержит λ_C

$$\Delta\lambda = \lambda_C\,(1-\cos\theta)$$

Это значит:

- При рассеянии фотон «чувствует» размер электрона.

- Этот размер — λ_C.

- В ТАО λ_C — это длина волны синусоиды электрона.

Фотон не «ударяет» в точечную частицу. Он взаимодействует с волной.

1.4 Аналогия с дифракцией

Если ты пропускаешь волну через решётку с шагом d, ты получаешь дифракционную картину с углами, зависящими от d.

Комптоновское рассеяние — это то же самое, но для столкновения двух волн:

- Одна волна — фотон.

- Другая волна — электрон (синусоида с длиной λ_C).

Угол рассеяния определяется отношением длин волн.

1.5 Вывод

Комптоновское рассеяние — это прямое доказательство того, что электрон — это волна с длиной λ_C.

- Фотон — разомкнутая цепочка пикселей.

- Электрон — замкнутая синусоида с длиной волны λ_C.

- Столкновение — взаимодействие двух волн.

- Изменение длины волны фотона — результат его «подстройки» к синусоиде электрона.

Мы объяснили Комптона как геометрию волны.

Часть 2. Электрон как трёхмерная фигура.

Электрон — это не точка. Это замкнутая, цепочка активных пикселей, образующая кольцо. Цепочка имеет траекторию (форму) спирали в трёх измерениях. Если бы ты мог увидеть электрон, ты бы увидел объёмную фигуру, которая выглядит как растянутая пружина: спиральное кольцо, замкнутую саму на себя. Это кольцо состоит из непрерывной цепочки активных пикселей. Эта цепочка замкнута — у неё нет начала и конца. Цепочка, лежит в одной плоскости. Она изгибается в пространстве, как пружина, но замкнутая в кольцо.

Часть 3. Длина цепочки электрона

Из энергии покоя

$E_e = m_e c^2 = 8.187 \times 10^{-14}$Дж

Из дискретности решётки

Энергия одного активного пикселя:

$\varepsilon_1 = 1.41 \times 10^{-37}$Дж

Число пикселей в электроне:

$$N = \frac{E_e}{\varepsilon_1} = \frac{8.187 \times 10^{-14}}{1.41 \times 10^{-37}} = 5.806 \times 10^{23}$$

Длина цепочки:

$L_{\text{цеп}} = N \cdot l_P = 5.806 \times 10^{23} \times 1.616 \times 10^{-35} = 9.38 \times 10^{-12}$м

Сравнение с комптоновской длиной:

$$\frac{L_{\text{цеп}}}{\lambda_C} = \frac{9.38 \times 10^{-12}}{2.426 \times 10^{-12}} \approx 3.86$$

Мы понимаем, что длина этой цепочки должна быть: четыре комптоновские длины + длина на амплитуду. Наше значение

близко к четырём комптоновским длинам. Несоответствие означает погрешность энергии одного ε_1, вычисленое через ε_0 — энергию нулевого пикселя, которая получена из плотности тёмной энергии (точность ~10%). Погрешность относительна небольшая в 10%:

$3.86 \pm 0.4 \Rightarrow 4 \in [3.46, 4.26]$

Вывод:
Длина цепочки электрона должна быть $4\lambda_C$ + длина на амплитуду, но точное значение пока ограничено погрешностью измерения ε_0.

Часть 4. Амплитуда электрона (открытый вопрос)

4.1. Что мы знаем

- Длина цепочки $L_{\text{цеп}} = 4\lambda_C$.

- Число периодов $N = 4$.

- Амплитуда A_e — это поперечный размер синусоидальной цепочки.

4.2. Что мы не знаем

Точное значение A_e зависит от точного соотношения:

$$\alpha = \left(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}\right)^{1/36}$$

Пока ε_0 известно с погрешностью ~10%, A_e не может быть вычислена точно.

4.3. Оценка амплитуды фотона относительно фотона.

Каждому фотону, как мы знаем, соответствует единственная амплитуда. Это следует из постоянства h. Поэтому электрону будет соответствовать своя амплитуда исходя из постоянной $h/2$. Тогда посчитаем амплитуду электрона исходя из такого подхода.

Постановка задачи:

- Мы хотим оценить амплитуду фотона с длиной волны, равной комптоновской длине волны электрона $\lambda_C = 2.426 \times 10^{-12}$ м

- Затем предположить, что амплитуда электрона в 2 раза меньше, чем у этого фотона.

Амплитуда фотона определяется формулой:

$$A(\lambda) = \frac{1}{\pi}\sqrt{C - \lambda^2}$$

где:

$$C = \frac{hcl_P}{\varepsilon_1}$$

Значения констант

Величина	Обозначение	Значение
Постоянная Планка	h	6.626×10−34 Дж·с
Скорость света	c	3×10^8 м/с
Планковская длина	l_P	1.616×10^{-35} м
Энергия активного пикселя	ε_1	1.41×10^{-37} Дж

Вычисление C

$$C = \frac{6.626 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8 \cdot 1.616 \times 10^{-35}}{1.41 \times 10^{-37}}$$

Числитель:

$6.626\times10^{-34}\cdot3\times10^8\cdot1.616\times10^{-35} = 3.209\times10^{-60}$

Знаменатель:

1.41×10^{-37}

Результат:

$$C = \frac{3.209 \times 10^{-60}}{1.41 \times 10^{-37}} = 2.276 \times 10^{-23} \text{ м}^2$$

Вычисление амплитуды фотона

Подстановка

$$A(\lambda) = \frac{1}{\pi}\sqrt{C - \lambda^2}$$

Вычисляем λ_C^2:

$\lambda_C^2 = (2.426 \times 10^{-12})^2 = 5.886 \times 10^{-24}$ м^2

Вычисляем $C - \lambda_C^2$:

$C - \lambda_C^2 = 2.276 \times 10^{-23} - 5.886 \times 10^{-24}$

$C - \lambda_C^2 = 2.276 \times 10^{-23} - 0.5886 \times 10^{-23} = 1.687 \times 10^{-23}$ м^2

Извлекаем корень:

$$\sqrt{1.687 \times 10^{-23}} = 4.107 \times 10^{-12} \text{ м}$$

Делим на π:

$$A(\lambda_C) = \frac{4.107 \times 10^{-12}}{3.14159} = 1.307 \times 10^{-12} \text{ м}$$

Результат для фотона:

$$A_\gamma(\lambda_C) = 1.307 \times 10^{-12} \text{ м}$$

Амплитуда фотона с комптоновской длиной волны равна 1.307×10^{-12} м.

Отношение

$$\frac{A_\gamma}{\lambda_C} = \frac{1.307 \times 10^{-12}}{2.426 \times 10^{-12}} = 0.539$$

Амплитуда фотона составляет около 54% от длины волны.

Это означает, что для фотона с $\lambda = \lambda_C$ амплитуда сравнима с длиной волны. Это — не малая величина. Фотон сильно закручен.

Амплитуда электрона, предположение:

Предположим, что амплитуда электрона в 2 раза меньше, чем у фотона с той же длиной волны:

$$A_e = \frac{A_\gamma(\lambda_C)}{2} = \frac{1.307 \times 10^{-12}}{2}$$

Результат

$$\boxed{A_e = 6.535 \times 10^{-13}\ \text{м}}$$

Амплитуда электрона равна 6.535×10^{-13} м.

Отношение амплитуды к длине цепочки

$$\frac{A_e}{L_{\text{цеп}}} = \frac{6.535 \times 10^{-13}}{9.704 \times 10^{-12}} = 0.0673$$

Амплитуда электрона составляет около 6.7% от длины цепочки.

Часть 5. Движение

5.1 Внутреннее движение (циркуляция)

Пиксели «бегают» по цепочке со скоростью света. В целом циркуляция по замкнутой траектории выглядит как стоячая волна.

5.2 Движение центра масс

Если электрон летит (свободный), его центр масс движется по спирали (синусоиде) — как волна де Бройля. То есть электрон не летит по прямой. Он зигзагообразно движется, слегка покачиваясь влево-вправо, вверх-вниз. Это и есть «дрожание» электрона.

5.3. В атоме

Когда электрон попадает в атом, его лента разрывается в одной точке и опоясывает протон как кольцо. Теперь она похожа на обруч, надетый на протон.

- Два конца ленты ныряют внутрь к протону и соединяются с ним.
- Это — пуповина (энергия связи).
- Она похожа на две верёвки, которые тянутся от кольца к центру.

Форма кольца зависит от энергии:

- S-состояние — ровное кольцо.
- P-состояние — кольцо с одной складкой (как гантель).

- D-состояние — кольцо с двумя складками.

- F-состояние — кольцо с тремя складками.

5.4 Что мы видим, как «сферу»

Мы не видим саму ленту. Мы видим усреднённую проекцию — её тень, размазанную по всем возможным ориентациям. Эта тень выглядит как сфера. Но на самом деле электрон — это плоское кольцо, повёрнутое в случайную сторону. Как монетка, брошенная в воздух. Каждая монетка плоская, но, если монеток много, и они крутятся — видно круг.

Часть 6. Деформационная (гравитационная) картина вокруг электрона

Активный пиксель в процессе циркуляции («бега» по траектории) описывает спираль. Эта циркуляция формирует деформационную (гравитационную) картину вокруг электрона. Волны деформации исходящие от движения активных пикселей образуют кривизну деформации, которая загибает волны по окружности вокруг плоскости циркуляции электрона. Эта деформация распространяется с двух сторон плоскости циркуляции электрона: сверху и снизу. В результате верхние и нижние волны деформации, исходящие от плоскости циркуляции электрона, объединяются в

одну единую волновую картину деформации и окутывают электрон. В результате такой динамики общая деформационная картина вокруг электрона выглядит как замкнутый тор.

Часть 7. Спин электрона

7.1 Электрон — это не просто замкнутый обычный фотон.

Фотон — это разомкнутая спираль активных пикселей.

- Длина волны: λ

- Энергия одного периода: $E = h\nu$

- Спин: $\hbar$

Электрон — это замкнутая цепочка активных пикселей.

- Длина волны: $\lambda_C = h/(m_e c)$

- Полная энергия: $E_e = m_e c^2$

- Энергия одного периода: $E_{\text{периода}} = E_e / 4$

Формула Планка для фотона с длиной волны λ_C:

$$E_\gamma = h\nu_C$$

При условии, что:

$$\lambda_C = \frac{h}{m_e c}$$

Получается:

$$E_\gamma = h\nu_C = \frac{hc}{\lambda_C} = m_e c^2 = E_e$$

То есть энергия фотона с комптоновской длиной равна полной энергии электрона. Но электрон состоит из 4 периодов.
Энергия одного периода электрона:

$$E_{\text{периода}} = \frac{E_e}{4} = \frac{h\nu_C}{4}$$

Вывод:
Энергия одного периода электрона в 4 раза меньше энергии фотона

с той же длиной волны. Следовательно, электрон — это не фотон по параметрам синусоиды. Это — замкнутая структура с дробной энергией периода.

7.2 Что такое спин

В КМ спин — это (если перевести в термины ТАО) момент импульса на 1 радиан. КМ ввела такое определение для удобства расчётов.

Ещё раз повторим, что такое спин фотона. Момент импульса — это мера вращательного движения. Для любой периодической структуры (спирали, ленты, кольца) момент импульса одного периода определяется её геометрией.

Полный оборот и радиан:

- Полный оборот (2π) имеет момент импульса h (постоянная Планка).

- Один радиан этого оборота имеет момент импульса:

$$\hbar = 2\pi h$$

- Для фотона: $S = \hbar$

- Для электрона: $S = \hbar/2$

Но это — не момент всей частицы. Это — момент одного периода.

Геометрия фотона — это разомкнутая спираль активных пикселей:

- Один период = один полный виток (2π).

- Момент импульса одного периода = h.

- Спин = момент на 1 радиан = $\hbar$ ($S_\gamma = \hbar$)

Физический смысл: Полный виток спирали фотона имеет момент импульса h. Спин $\hbar$ — это момент на 1 радиан этого витка. КМ ввела такое определение для удобства расчётов.

7.3 Пороговый фотон

Пороговый фотон — это фотон с минимальной энергией, достаточной для рождения электрон-позитронной пары:

$$E_\gamma = 2m_e c^2$$

Его длина волны:

$$\lambda_\gamma = \frac{\lambda_C}{2}$$

Его спин:

$$S_\gamma = \hbar$$

7.4 Спин электрона из сохранения момента

Рождение пары

$$\gamma \rightarrow e^- + e^+$$

Закон сохранения момента импульса:

$$S_\gamma = S_{e^-} + S_{e^+}$$

Единственный способ сохранить момент, если спины электрона и позитрона направлены одинаково:

$$S_{e^-} = S_{e^+} = \frac{\hbar}{2}$$

Тогда:

$$S_{e^-} + S_{e^+} = \frac{\hbar}{2} + \frac{\hbar}{2} = \hbar = S_\gamma$$

Вывод:

$$\boxed{S_e = \frac{\hbar}{2}}$$

Это — не постулат. Это — следствие сохранения момента импульса.

Часть 8. Спин в ТАО: разграничение уровней

8.1 Определение спинового квантового числа *s*

Спиновое квантовое число *s* — это отношение спина фотона к спину данной частицы на одном и том же уровне рассмотрения.

$$s = \frac{S_{\text{фотон}}}{S_{\text{частица}}}$$

Физический смысл:

- У фотона $s = 1$ — эталон.

- У электрона $s = 1/2$ — его спин в два раза меньше, чем у фотона.

8.2 Четыре уровня спина

В ТАО спин существует на четырёх «уровнях», которые необходимо чётко разграничивать:

Уровень	Что это	Формула	Относительно чего
1. Спин радиана	Момент импульса на 1 радиан	$S_{1\text{рад}} = s \cdot \hbar$	Оси синусоиды
2. Спин периода	Момент импульса одного полного периода	$S_{\text{период}} = s \cdot h$	Оси синусоиды
3. Спин цепочки	Момент импульса всей цепочки (4 периода)	$S_{\text{цепочки}} = 4s \cdot h$	Оси синусоиды
4. Спин относительн	Момент импульса всей цепочки	$S_{\text{центр}} = 4s \cdot h \cdot k$	Центра кольца циркуляции

Уровень	Что это	Формула	Относительно чего
о центра масс	относительно центра кольца		

8.3 Уровень 1: Спин радиана (уровень КМ)

Спин радиана — это момент импульса, приходящийся на один радиан поворота цепочки.

$$S_{1\text{рад}} = s \cdot \hbar$$

Почему именно на радиан. Это — уровень КМ. Квантовая механика ввела такое определение для удобства расчётов:

- Волновая функция записывается как $\psi = Ae^{i\phi}$, где ϕ — фаза в радианах.
- Производная по фазе даёт $\hbar$.
- Это математически удобно, потому что экспонента $e^{i\phi}$ красиво дифференцируется.

КМ не может считать на период или на полную цепочку, потому что у неё нет онтологии:

- Нет представления о цепочке.
- Нет представления о периоде.
- Нет представления о полном угле циркуляции.

Поэтому КМ вынуждена считать на радиан — это единственная величина, которая имеет смысл в её формализме.

Значения для фотона и электрона

Частица	***s***	$\boldsymbol{S_{1рад}}$
Фотон	1	$\hbar$
Электрон	1/2	$\hbar/2$

Ключевое: у электрона спин радиана в два раза меньше, чем у фотона.

Численные значения

- Фотон: $\hbar = 1.055\times10^{-34}$ Дж·с.
- Электрон: $\hbar/2=0.527\times10^{-34}$ Дж·с.

8.4 Уровень 2: Спин периода

Спин периода — это момент импульса одного полного периода (одного полного витка) цепочки.

$$S_{период} = s\cdot h$$

Связь со спином радиана

Один период = 2π радиан. Поэтому:

$S_{период} = 2\pi\cdot S_{1рад} = 2\pi\cdot s\cdot\hbar = s\cdot h$

Значения для фотона и электрона

Частица	*s*	$S_{период}$
Фотон	1	h
Электрон	1/2	$h/2$

Численные значения

- Фотон: $h = 6.626\times10^{-34}$ Дж·с.
- Электрон: $h/2 = 3.313\times10^{-34}$ Дж·с.

8.5 Уровень 3: Спин цепочки

Спин цепочки — это момент импульса всей цепочки циркуляции электрона, состоящей из четырёх периодов.

$$S_{\text{цепочки}} = 4s \cdot h$$

Электрон — это замкнутая цепочка, состоящая из четырёх комптоновских длин:

$$L_e = 4\lambda_C$$

Каждая комптоновская длина — это один период. Поэтому:

$S_{\text{цепочки}} = 4 \cdot S_{\text{период}} = 4s \cdot h$

Связь с полным углом циркуляции

Полный угол циркуляции электрона:

$\Theta_{\text{полн}} = 4 \cdot 2\pi = 8\pi$ рад

Поэтому:

$S_{\text{цепочки}} = 8\pi \cdot S_{1\text{рад}} = 8\pi \cdot s \cdot \hbar = 4s \cdot h$

Численные значения

Электрон: $2h = 1.325 \times 10^{-33}$ Дж·с.

8.6 Уровень 4: Орбитальный спин - спин относительно центра масс (центра кольца)

Спин относительно центра масс — это момент импульса **всей цепочки** относительно **центра кольца циркуляции**.

$$S_{\text{орб}} = L_{\text{орб}} = m_e \cdot r_e \cdot c$$

где k — геометрический коэффициент, зависящий от формы кольца.

Чем отличается от спина цепочки

Уровень	Относительно чего	Что учитывает
Спин цепочки	Оси синусоиды	Момент внутреннего движения
Орбитальный спин - относительно центра	Центра кольца	Момент всей цепочки как целого

Ключевое различие: спин цепочки — это момент внутреннего движения (синусоиды). Спин относительно центра — это момент внешнего движения (всей цепочки по кольцу).

Орбитальный спин относительно центра масс — это то, что в КМ называется орбитальным моментом:

$S_{\text{центр}} = L_{\text{орб}}$

Для электрона (при $k = 1$- правильная окружность):

$S_{орб} = L_{орб} = m_e c \cdot r_e = 4\hbar$

Расчёт

$$L_{\text{орб}} = m_e \cdot r_e \cdot c$$

$$L_{\text{орб}} = 9.109 \times 10^{-31} \cdot 1.544 \times 10^{-12} \cdot 3 \times 10^{8}$$

$$L_{\text{орб}} = 4.220 \times 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$$

Сравнение с $\hbar$

$$\frac{L_{\text{орб}}}{\hbar} = \frac{4.220 \times 10^{-34}}{1.0546 \times 10^{-34}} = 4.00$$

$$\boxed{L_{\text{орб}} = 4\hbar}$$

Формула подтверждается.

Это — полный орбитальный момент электрона.

8.7 Почему КМ использует только спин радиана

КМ не может использовать спин периода, спин цепочки или спин относительно центра, потому что:

- У неё нет представления о цепочке.
- У неё нет представления о периоде.
- У неё нет представления о полном угле циркуляции.
- У неё нет представления о центре кольца.

КМ работает только с волновой функцией, которая размазана по пространству. Единственная величина, которая имеет смысл в её формализме, — это фаза в радианах. Когда КМ говорит «спин электрона = $\hbar/2$», она имеет в виду спин радиана, а не спин периода, цепочки или центра.

Но это не полная картина. Полная картина включает все четыре уровня.

Часть 9. Спин в КМ: физическая величина и математический формализм

9.1 Постановка вопроса

В квантовой механике существует формула для **полного спина**:

$$|\vec{S}| = \hbar\sqrt{s(s+1)}$$

Для фотона ($s = 1$): $|\vec{S}| = \sqrt{2}\hbar \approx 1.414\hbar$. $\hbar \approx 1.414\hbar$.

Но в экспериментах спин фотона всегда измеряется как $\pm\hbar$. Никаких $\sqrt{2}\hbar$ в экспериментах нет.

Это — ключевое противоречие, которое необходимо разъяснить.

9.2 Что измеряется в экспериментах

В экспериментах по измерению спина фотона наблюдаются два состояния:

- Левая круговая поляризация — спин $+\hbar$.

- Правая круговая поляризация — спин $-\hbar$.

Проекция спина на направление движения принимает только два значения:

$$S_z = \pm\hbar$$

Никаких других значений не наблюдается.

9.3. Что это значит

Физическая величина спина фотона — это $\pm\hbar$. Это то, что реально измеряется.

Формула $\sqrt{2}\hbar$ не соответствует никакой измеряемой величине.

9.4 Откуда берётся $\sqrt{2}\hbar$

Это Математический формализм КМ. В квантовой механике состояние спина описывается вектором в абстрактном пространстве (гильбертовом пространстве). Для $s = 1$ этот вектор имеет три компоненты:

$|1,+1\rangle$, $|1,0\rangle$, $|1,-1\rangle$

Но фотон не может находиться в состоянии $|1,0\rangle$ — это состояние с нулевой проекцией спина, которое для безмассовой частицы невозможно.

Остаются только два состояния: $|1,+1\rangle$ и $|1,-1\rangle$.

9.5 Полный момент

Формально, полный момент вектора в трёхмерном пространстве:

$$|\vec{S}| = \sqrt{S_x^2 + S_y^2 + S_z^2}$$

Если $Sx = Sy = Sz = \hbar$, то:

$$|\vec{S}| = \sqrt{3\hbar^2} = \sqrt{3}\hbar$$

Но для $s = 1$:

$$|\vec{S}| = \sqrt{2}\hbar$$

Это — математическая длина вектора в абстрактном пространстве. Она не соответствует никакой измеряемой величине.

9.6. Что говорит ТАО

Физическая величина — это h. В ТАО физическая величина спина — это момент полного периода:

$$S_{\text{период}} = h$$

Для фотона: $S_{\text{фотон}} = h$

Проекция — это $\pm\hbar$

Проекция спина на направление движения:

$$S_z = \pm\hbar$$

Это — то, что измеряется в экспериментах.

В ТАО $\sqrt{2}\hbar$ не нужна. Это — математическая надстройка, которая возникает из формализма КМ, но не соответствует физической реальности.

Физическая реальность:

- Спин фотона — это h (момент периода).
- Проекция — $\pm\hbar$.
- Две поляризации — это два направления закрутки спирали (левая и правая).

9.7. Две поляризации фотона: физическое объяснение

Что говорит КМ

Из s =1 следует, что у фотона три состояния:

$|1,+1\rangle$, $|1,0\rangle$, $|1,-1\rangle$

Но фотон не может находиться в состоянии $|1,0\rangle|1,0\rangle$ — это состояние с нулевой проекцией спина, которое для безмассовой частицы невозможно. Остаются только два состояния: $|1,+1\rangle$ и $|1,-1\rangle$.

Что говорит ТАО

Фотон — это спираль. Спираль может быть:

- Правой — закрутка по часовой стрелке.

- Левой — закрутка против часовой стрелки.

Две поляризации — это два направления закрутки спирали.

Это — физическое объяснение. Оно не требует $\sqrt{2}\hbar$.

9.10. Вывод

$$|\vec{S}| = \hbar\sqrt{s(s+1)}$$

— это математическая надстройка, а не физическая величина.

Она сохраняется в ТАО для формализма КМ, но не является физической сущностью.

Часть 10. Заряд в ТАО

10.1. Что такое заряд в классике

В классической физике заряд определяется как свойство частицы, которое определяет её взаимодействие с электромагнитным полем.

Сила Лоренца:

$$\vec{F}=q(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B})$$

Закон Кулона:

$$F = k_e\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Заряд q — это коэффициент, который показывает, насколько сильно частица взаимодействует с полем.

Классическая физика не объясняет:

1. Что такое заряд физически. Это просто «свойство».
2. Почему заряд дискретен. Почему он кратен e?
3. Почему заряд одинаков у всех частиц. Почему у электрона и протона заряд одинаков по модулю?

4. Почему заряд не зависит от массы. Почему мюон (в 207 раз тяжелее) имеет тот же заряд?

Классическая физика просто постулирует заряд как данность.

В классической физике заряд воспринимается как «штучное» свойство:

- У каждой частицы есть «штука» заряда.
- Эта «штука» может быть положительной или отрицательной.
- Она не зависит от других свойств частицы.

Это онтологически неудовлетворительно. Заряд — это не «штука». Это свойство структуры.

10.2. Как получают численное значение заряда

Опыт Милликена (1909):

- Капли масла в электрическом поле.
- Баланс силы тяжести и электрической силы.
- Измерение заряда отдельных капель.
- Обнаружено, что все заряды кратны некоторой величине e.

Результат:

$e \approx 1.602 \times 10^{-19}$ Кл

Современное определение (СИ, 2019):

С 2019 года заряд электрона фиксирован:

$$\boldsymbol{e = 1.602176634 \times 10^{-19}\ \text{Кл}}$$

Это точное значение по определению.

10.3. Определение

Заряд — это степень взаимодействия микротора (внешнего шлейфа частицы) с макротором (внешним полем).

Формула:

$$q = \frac{F}{E}$$

где:

- F — сила взаимодействия,

- E — напряжённость поля.

Это означает, что заряд — это не количество. Это структура.

Заряд определяется топологией внешнего шлейфа, а не количеством пикселей внутри частицы.

Ключевое разграничение

Величина	**Что это**	**Зависит от**
Масса	Количество пикселей	Числа пикселей
Заряд	Сила взаимодействия	Структуры внешнего шлейфа

Масса — это количество. Заряд — это свойство структуры.

Внешний шлейф — это граница между частицей и внешним пространством. Он образуется циркуляцией активных пикселей по замкнутой траектории.

Он имеет:

- Поперечное сечение — 1 пиксель.

- Закрутку (спиральность) — левую или правую.

- Частоту циркуляции — планковскую.

Внешний шлейф любой заряженной частицы имеет одинаковую структуру:

- Один пиксель в поперечном сечении.

- Закрутка (правая / левая).

- Одинаковая частота.

Это следствие топологии. Топология внешнего шлейфа одинакова для всех частиц с зарядом $\pm e$. Заряд — это причина силы взаимодействия внешнего шлейфа с макротором. Он идентичен для всех частиц.

Масса — это количество пикселей в цепочке. Она определяется числом пикселей:

$$m = \frac{N \cdot \varepsilon_1}{c^2}$$

Масса зависит от числа пикселей.

Заряд — это сила взаимодействия микротора с макротором.

Он определяется структурой внешнего шлейфа:

$$q = \frac{F}{E}$$

Заряд не зависит от числа пикселей.

Сравнение электрона и мюона

Частица	**Масса**	**Число пикселей**	**Заряд**
Электрон	9×10^{-31} кг	5.8×10^{23}	1.602×10^{-19} Кл
Мюон	1.884×10^{-28} кг	1.2×10^{26}	1.602×10^{-19} Кл
Отношение	207	207	1

Масса мюона в 207 раз больше массы электрона. Заряд мюона равен заряду электрона.

Это означает: масса и заряд — разные величины с разными механизмами.

10.4. Почему заряд одинаков у всех частиц

Внешний шлейф любой заряженной частицы имеет одинаковую структуру:

- Один пиксель в поперечном сечении.
- Одинаковая закрутка (правая / левая).
- Одинаковая частота.

Это следствие топологии. Топология внешнего шлейфа одинакова для всех частиц с зарядом $\pm e$.

Она не зависит от:

- Числа пикселей внутри частицы.
- Массы частицы.
- Формы внутренней структуры.

10.5. Разделение понятий

Макроэлектрон — это единая цепочка циркуляции активных пикселей в проводнике. Он образуется, когда свободные электроны в металле синхронизируются и образуют общую циркуляцию вдоль всего провода (Жидкость Ландау / Газ Ферми). Макроэлектрон — это одна цепочка. Каждая цепочка — это один элементарный заряд.

Ток внешнего шлейфа любой частицы (электрона, мюона, макроэлектрона, протона) - это поток активных пикселей через контур циркуляции в поперечном сечении. Это элементарный (минимально-возможный) ток.

Одна частица — это одна цепочка циркуляции. Через сечение этой цепочки за один такт проходит один пиксель.

Разделим три величины, которые ранее путались:

Величина	**Что это**	**Формула**	**Единица**
Масса	Количество пикселей в цепочке	$m = N_{\text{цепочки}} \cdot \mu$	кг

Величина	Что это	Формула	Единица
Ток	Число пикселей в такт через сечение	$I = N_{такт}/t_P$	А
Заряд	Количество цепочек через сечение	$q = N_{цепочек} \cdot e$	Кл

Это три разных величины. Они связаны, но не равны.

Пояснение:

Масса — это длина цепочки (суммарное количество активных пикселей в цепочке).

Элементарный Заряд — это свойство единичного контура циркуляции, который образует силовое (деформационное поле). Один заряд образует одно поле. Элементарным зарядом может быть: электрон, мюон, протон, макроэлектрон, и другая частица. Меньше заряда не бывает (сейчас не рассматриваем дробные заряды кварков).

Суммарный Заряд – это количество отдельных контуров циркуляций в проводе. Это количество макроэлектронов в проводе.

Элементарный Ток — это расход активных пикселей в сечении одного контура циркуляции. Элементарный ток течёт в: электроне, мюоне, протоне (внешнем шлейфе), и других частицах. Меньше заряда не бывает.

Суммарный ток – суммарный расход активных пикселей во всех сечениях контуров циркуляций макроэлектронов в проводе.

Согласно ТАО (если измерять заряд и ток в пикселях и тактах), в любой частице (электроне, мюоне, макроэлектроне…) будет находится:

- элементарный заряд = 1 пиксель;

- элементарный ток = 1 пиксель за такт;

10.6. Перевод пиксельных параметров в классические Кулоны и Амперы

Возьмём макроэлектрон. Это одна цепочка циркуляции. Его заряд в Кулонах (как элементарный заряд):

$$1.602\times10^{-19}\ \text{Кл} = 1\ \text{цепочка циркуляции}$$

Следовательно:

$$1\ \text{Кл} = 1 / 1.602\times10^{-19} = 6.2415\times10^{18}\ \text{цепочек}$$

Значит, если в проводе, согласно классики, движутся заряды, численно равные 1 Кулону, то это значит, что в проводе имеется 6.2415×10^{18} цепочек циркуляции (макроэлектронов), которые и образуют суммарный заряд в 1 Кулон.

Число 6.2415×10^{18} — это количество цепочек (макроэлектронов) – контуров циркуляции активных пикселей в проводе, которое соответствует одному Кулону. Оно следует из определения Кулона через Ампер. Это коэффициент перевода между пиксельной решёткой и классическими единицами.

1 Кулон — это 6.2415×10^{18} элементарных зарядов (макроэлектронов)

$1\ \text{Кл} = 6.2415\times10^{18}$ цепочек

Тогда Ампер, согласно определения физики: 1А = 1 Кл/1 с, то

1 Ампер — это заряд в 1 Кулон, который переносится в сечениях цепочек за 1 секунду.

В Кулоне 6.2415×10^{18} цепочек. В каждой цепочке за 1 такт переносится один пиксель. В одной секунде тактов:

1.855×10^{43} - это Планковская частота

Следовательно:

$1\ \text{А} = 6.2415\times10^{18}\cdot1.855\times10^{43} = 1.1576\times10^{62}$ пикселей/секунду

$1\ \text{А} = 1.1576\times10^{62}$ пикселей/секунду

Теперь посчитаем какой ток течёт в элементарном заряде – единичном контуре циркуляции.

Как мы теперь уже понимаем в 6.2415×10^{18} контурах (элементарных зарядах) течёт ток величиной 1Ампер. Значит в одном контуре течёт ток равный:

$$I = \frac{1}{6.2415 \times 10^{18}} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{A}$$

Ток в любой частице (электроне, мюоне, макроэлектроне) равен 1.602×10^{-19} А. И это численно равно заряду одного электрона в Кулонах.

И следовательно элементарный ток в пикселях численно равен Планковской частоте: 1.855×10^{43} пикселей/секунду.

Таблица пиксельных и классических единиц

Величина	В пиксельных единицах	В классических единицах
Элементарный заряд	1 цепочка	1.602×10^{-19} Кл
1 Кулон	6.2415×10^{18} цепочек	1 Кл
Элементарный ток	1.855×10^{43} пикс/с	1.602×10^{-19} А
1 Ампер	1.1576×10^{62} пикс/с	1 А
1 такт	1 цепочка	1 пиксель
1 секунда	1.855×10^{43} тактов	6.2415×10^{18} цепочек

Часть 11. Магнитный момент электрона

11.1. Классическое определение

В классической физике магнитный момент — это векторная величина, которая определяет магнитные свойства объекта.

Для замкнутого контура с током:

$$\vec{\mu}=I\cdot\vec{S}$$

где:

- I — ток (заряд в единицу времени),

- $\vec{S}$ — вектор площади, охватываемой контуром.

Разбор по компонентам

Компонент	**Что это**	**Откуда берётся**
I	Ток	Движение зарядов по контуру
$\vec{S}$	Вектор площади	Геометрия контура
$\vec{\mu}$	Магнитный момент	Произведение тока на площадь

Ток — это заряд, проходящий через сечение за единицу времени:

$$I = \frac{q}{T}$$

где T — период обращения.

Площадь для кругового контура радиуса r:

$$S = \pi r^2$$

Магнитный момент вращающегося заряда, если заряженная частица вращается по круговой орбите:

$$\mu = I \cdot S = \frac{qv}{2\pi r} \cdot \pi r^2 = \frac{qvr}{2}$$

11.2. Связь с моментом импульса

Момент импульса:

$$L = mvr$$

Отсюда:

$$\mu = \frac{q}{2m} \cdot L$$

Подставляем:

$$\gamma = \frac{\mu}{L} = \frac{q}{2m}$$

Это — классическая формула.

11.3. Гиромагнитное отношение

Гиромагнитное отношение — это коэффициент, который связывает магнитный момент с механическим:

$$\gamma = \frac{\mu}{L} = \frac{q}{2m}$$

Для электрона:

$$\gamma_e = \frac{e}{2m_e} = 8.79 \times 10^{10}\ \text{Кл/кг}$$

Магнетон Бора — это естественная единица магнитного момента электрона в атоме. Численное значение:

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$$

$\mu_B \approx 9.274 \times 10^{-24}$ Дж/Тл

11.4. Магнитный момент в квантовой механике

Квантовая механика заимствует классическую формулу:

$$\vec{\mu} = \frac{q}{2m}\vec{L}$$

Приближение	Уравнение	Что описывает
Нерелятивистское	Шрёдингера	Медленные частицы ($v \ll c$)
Релятивистское	Дирака	Быстрые частицы ($v \approx c$), спин

В релятивистском приближении спин автоматически появляется из уравнения Дирака. В нерелятивистском — вводится вручную как постулат.

Введение g-фактора для учёта удвоения:

$$\vec{\mu} = g \cdot \frac{e}{2m_e} \cdot \vec{S}$$

где $g \approx 2$.

Для электрона:

$g_S \approx 2.0023$

g-фактор — это безразмерный коэффициент, который показывает, во сколько раз реальный магнитный момент отличается от классического.

$$g = \frac{\mu}{\mu_B}$$

В КМ двойка в $g \approx 2$ означает, что там не один вклад, а два. Но что это за два вклада в КМ? В КМ нет никаких цепочек. В КМ нет циркуляций. КМ объясняет это так: «Два спина крутятся» — то есть вводится дополнительная степень свободы, которая даёт удвоение. Это — математическая надстройка, а не физическая реальность. КМ не может объяснить, откуда берётся удвоение, потому что у неё нет онтологии. В ТАО мы понимаем: это спиральный и орбитальный спин.

Формулы магнитного момента в КМ

Нерелятивистская КМ (оператор)

$$\hat{\mu} = \underbrace{\frac{e}{2m_e}\hat{L}}_{\text{орбитальный}} + \underbrace{g\frac{e}{2m_e}\hat{S}}_{\text{спиновый}}$$

Через магнетон Бора:

$$\hat{\mu} = \mu_B \left(\frac{\hat{L}}{\hbar} + g\frac{\hat{S}}{\hbar} \right)$$

Релятивистская КМ (уравнение Дирака)

$$\hat{\mu} = \mu_B \left(\frac{\hat{L}}{\hbar} + 2\frac{\hat{S}}{\hbar} \right)$$

Здесь $g = 2$ — не постулат, а следствие уравнения Дирака.

Проекция магнитного момента (что реально измеряют)

$$\mu_z = \mu_B (m_l + g m_s)$$

где:

- m_l — орбитальное квантовое число,
- $m_s = \pm 1/2$ — спиновое квантовое число.

Для чистого спина (s - состояние, $m_l = 0$):

$$\mu_z \approx \pm \mu_B$$

Ключевое уточнение: КМ считает проекцию, чтобы её математический формализм сходился.

Учёт аномального магнитного момента:

$\mu_{эксп} = \mu_B (1 + a)$, $a \approx 0.00116$

Что такое l и m_l

l — орбитальное квантовое число. Определяет форму орбитали:

- $l = 0$ — s-орбиталь (сфера),
- $l = 1$ — p-орбиталь (гантель),
- $l = 2$ — d-орбиталь,

- $l = 3$ — f-орбиталь.

m_l — магнитное квантовое число. Определяет проекцию орбитального момента:

$m_l = -l, -l+1, \ldots, +l$

Для s-орбитали ($l = 0$): $m_l = 0$.

Аномальная поправка a — это отклонение реального магнитного момента от «простого» значения μ_B.

$$\mu_{\text{эксп}} = \mu_B (1 + a),\ a \approx 0.00116$$

Поправка a относится только к спиновому вкладу. Орбитальный вклад определяется классическим движением электрона по орбите. Он не имеет аномальной поправки.

Правильная формула с поправкой:

$\mu_z = \mu_B (m_l + g_S m_s)$

где $g_S = 2\ (1 + a) = 2.0023$.

Для чистого спина:

$\mu_z = \mu_B \cdot 2.0023 \cdot (\pm 1/2) = \pm 1.00116 \mu_B$

Это — экспериментальное значение.

11.5. Что реально наблюдается в экспериментах

Важно развести два разных «2»:

1. $g \approx 2$ — это множитель в формуле. Он показывает, что спиновый магнитный момент «сильнее», чем можно было бы ожидать по аналогии с орбитальным движением.
2. Наблюдаемая проекция $\mu_z \approx \pm \mu_B$ — это то, что реально видят в опыте (в Штерне — Герлахе, в расщеплении спектральных линий).

То есть «2 магнетона» как наблюдаемую величину не видят. Тогда откуда возникает иллюзия «двух магнетонов»?

Формула для проекции спинового магнитного момента:

$$\mu_{s,z} = -g_s \mu_B m_s$$

Подставляем $g_s = 2$ и $m_s = \pm 1/2$:

$$|\mu_{s,z}| = 2 \cdot \mu_B \cdot 1/2 = \mu B$$

Двойка и половинка «сокращаются», и остаётся примерно один магнетон Бора. Если бы спин был $s = 1$, а $m_s = 1$, тогда при $g = 2$ мы бы получили $2\mu_B$. Но у электрона $s = 1/2$, поэтому так не выходит.

Модуль (длина) спинового магнитного момента:

$$|\mu_s| = g_s \mu_B \sqrt{s(s+1)} \approx 2\mu_B \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}\mu_B \approx 1.73\mu_B$$

Это — ненаблюдаемая величина. Её нельзя напрямую измерить. В квантовой механике нельзя одновременно знать все три компоненты вектора — можно только проекцию на одну ось. Поэтому «прибор видит» только $\mu_z = \pm \mu B$, а длина вектора $\approx 1.73\mu_B$ — это характеристика самого состояния, а не результат измерения.

Вывод

$$|\mu_s| = g_s \mu_B \sqrt{s(s+1)}$$

— это математическая надстройка, а не физическая величина.

Она сохраняется в ТАО для формализма КМ, но не является физической сущностью.

11.6. Магнитный момент в ТАО

В ТАО мы принимаем, что магнетон Бора — это и есть микротор. Бор описал микротор электрона. Так как он, судя по экспериментам, соответствует действительности, то ТАО принимает его формулу, но с некоторыми пояснениями.

Формула магнетона Бора:

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$$

Эта формула физически соответствует ТАО.

Микротор — это замкнутая вихревая структура. Это деформационное поле (картина) нулевых пикселей, создаваемая исходящими деформационными волнами от замкнутого спирально-орбитального движения цепочки активных пикселей электрона. Это - единое цельное поле (картина).

ТАО даёт полную физическую картину магнитному полю и магнитному моменту как проявлению этого поля через спиновую (вращательную) характеристику.

В ТАО нет необходимости в квантовых числах, потому что есть онтология. Квантовые числа — это математические конструкции, которые не имеют физического механизма.

В ТАО есть физический механизм:

- Спиральная закрутка создаёт замкнутые деформационные волны вокруг цепочки циркуляции;

- Орбитальная циркуляция создаёт орбитальную закрутку замкнутых деформацинных волн;

- в целом образуется микротор с закруткой, соответствующей закрутки спирали циркуляции;

Магнитный момент создаётся общим микротором электрона, но именно спиральная закрутка здесь играет основную роль.

Магнитное поле – это поле замкнутых волновых деформаций нулевых пикселей. Если по каким-то причинам замкнутые линии разрываются (разорванный тор), то образуются вертикальные столбы деформации (смерчи). Эти столбы имеют проявление как линии электростатического поля и носят название - гравитоны. Такие структуры образуются на поверхности заряженных тел.

Орбитальная циркуляция создаёт электрическое поле (гравитон).

Вклад	**Что создаёт**	**Тип структуры**
Спиральная закрутка	Магнитное поле (микротор)	Замкнутый вихрь

Вклад	Что создаёт	Тип структуры
Орбитальная циркуляция	Электрическое поле (гравитон)	Разомкнутый вихрь (смерч)

Представим себе вращающийся обруч вокруг центра своей окружности. Какую деформационную картину он создаёт? Деформационная картина будет выглядеть, как вытянутая вверх и вниз труба, диаметр которой минимален в плоскости вращения и увеличивается по мере удаления от этой плоскости вращения (рассеивается, теряя интенсивность вращения). Наглядная аналогия: если вращать чайной ложкой чай в стакане – образуется столб деформации. Это и есть линия электростатического поля – гравитон.

А теперь представим, что обруч неподвижен, а вращается только вокруг своей продольной оси. Картина полностью изменится: волны деформации станут не столбом, а окутывающими замкнутыми линиями вокруг обруча. Это и есть линии магнитного поля.

Теперь соединим оба эти вращения в одном обруче. Именно такое (аналогичное) вращение и происходит в циркуляции электрона. Ввиду того, что спиральное вращение происходит с большей угловой скоростью (радиус вращения меньше, а линейная скорость таже: скорость света) орбитальное вращение не образует столб - гравитон, а скручивается спиральным вращением «усиливая» его проявление. В итоге образуется замкнутый микротор с закруткой.

Где в экспериментах реально появляется «двойка»?

Опыт Штерна — Герлаха:

Отклонение пучка пропорционально $\mu_z B$. Если бы «спин работал как орбита» без спирального продольного движения, мы бы ожидали вдвое меньшее отклонение. Фактическое отклонение соответствует $g \approx 2$. То есть «двойка» видна как вдвое большее отклонение, чем ожидалось бы без учёта спирального спина.

Эффект Зеемана:

Расщепление уровней энергии $\Delta E = -\mu_z B$. Из-за $g \approx 2$ расщепление оказывается примерно вдвое больше, чем можно было бы предсказать по орбитальной модели.

То есть $g = 2$ — это про масштаб взаимодействия, а не про прямое показание прибора в единицах μ_B.

Поэтому правильная интерпретация двойного вклада — это про то, что природа «усиливает» спиновой магнитный момент орбитальным. Но «2 магнетона как наблюдаемая величина» — это неверная интерпретация. Реальная наблюдаемая — это $\pm\mu_B$.

11.7. Формула магнитного момента в ТАО

В ТАО магнитный момент электрона:

$$\boxed{\mu_e = \frac{eh}{4\pi m_e}}$$

где:

- e — заряд электрона,
- h — момент полного периода,
- 4π — геометрия ленты циркуляции
- m_e — масса электрона.

Это ровно та же формула что и в КМ только через h.

Проверка:

$$\mu_e = \frac{1.602 \times 10^{-19} \cdot 6.626 \times 10^{-34}}{4\pi \cdot 9.109 \times 10^{-31}}$$

$$\mu_e = \frac{1.062 \times 10^{-52}}{1.145 \times 10^{-29}} = 9.274 \times 10^{-24}\ \text{Дж/Тл}$$

Это — точно μ_B.

Почему в формуле стоит $\hbar$, а не h? Во всех экспериментах КМ находится h, а не $\hbar$. Но в формуле магнетона Бора стоит $\hbar$.

Что такое квант на самом деле? Квант — это один полный период периодической структуры. Не радиан. Не приведённая величина. Именно один полный период.

Это означает:

- Фотон — это цепочка активных пикселей.

- Период фотона — это один полный виток спирали.

- Энергия одного периода — это hv.

- Квант — это один период.

Формула:

$$E_{\text{квант}} = hv$$

Здесь h — это энергия одного полного периода, а не энергия на радиан. Для электрона эта формула выглядит как:

$$\boldsymbol{E_{\text{квант е}} = ½\ hv}$$

h — это момент импульса одного полного периода фотона. Он измеряется в экспериментах. Он — фундаментальная константа.

$\hbar = h/2\pi$ — это момент импульса одного радиана. Он не измеряется напрямую. Он вводится для математического удобства.

Радиан никогда не поглощается и не излучается. Это — фундаментальный факт. В экспериментах наблюдается поглощение и излучение целых периодов (квантов), а не радианов:

В этом суть всей квантовой механики, с этого она начинается.

Радиан — это математическая величина, которая не соответствует никакому физическому процессу. Только период поглощается и излучается. Только период является квантом.

Во всех экспериментах измеряется обычная постоянная Планка h.

Эффект Комптона:

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)$$

Здесь измеряется h, а не $\hbar$.

Фотоэффект:

$$E = h\nu - A$$

Здесь измеряется h, а не $\hbar$.

Спектр водорода:

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

Постоянная Ридберга выражается через h:

$$R = \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c}$$

Здесь измеряется h, а не $\hbar$.

КМ использует волновую функцию:

$$\psi = Ae^{i\phi}$$

где ϕ — фаза в радианах.

Производная по фазе даёт $\hbar$. Это — математически удобно. Использование радианов привело к появлению $\hbar$. $\hbar$ — это математическая величина, а не физическая. Она не соответствует никакой измеряемой величине. Поэтому правильнее в формуле использовать именно h.

В ТАО в формуле орбитального момента получилось приведённое значение.

Мы получили:

$$L_{\text{орб}} = 4\hbar$$

Это — приведённое значение. Его тоже можно выразить через h. Следовательно, ТАО не отрицает формулы КМ. ТАО использует их как математический формализм, если они дают правильные значения численно.

11.8. Поправка на дрожание (ортогональность решётки)

В ТАО $\Delta g \approx 0.0023$ — это не радиационная поправка, а поправка на дрожание (Zitterbewegung).

Механизм:

1. Земля всё время движется относительно решётки (реликтового излучения) (370 км/с).
2. Даже если лаборатория неподвижна относительно Земли, она движется относительно решётки.
3. Любой паттерн (электрон) не может двигаться строго прямолинейно в ортогональной решётке.
4. Он вынужден двигаться зигзагом (дрожание, Zitterbewegung).
5. Это дрожание создаёт дополнительный микроскопический ток.
6. Дополнительный ток даёт дополнительный магнитный момент.
7. Отсюда — отклонение g от 2 на малую величину.

Формула:

$$g = 2 + \Delta g_{\text{дрож}}$$

где $\Delta g_{\text{дрож}} \approx 0.0023$.

в ТАО:

$$\Delta g = f(v_{\text{решётки}}, \text{геометрия})$$

Где:

- $v_{\text{решётки}} = 370$ км/с (скорость Земли).

- геометрия — ортогональная решётка.

Это является прямым следствием ортогональности решётки!

11.9. Что происходит на p, d, f - орбиталях

На p, d, f -орбиталях кольцо циркуляции электрона деформируется — появляются складки (гантели, трилистники). В атоме электрон образует общую циркуляцию с внешним шлейфом

протона. Это уже не ровное кольцо как в свободном состоянии или на s-орбитали. Это вытянутая и сплюснутая цепочка, «ось вращения» которой имеет радиус, гораздо больший изначального. Поэтому измеряемый спин и магнитный момент такой цепочки будет иметь сильно отличную орбитальную составляющую вращения: вплоть до кратной в разы. Радиус и деформация создаёт дополнительный момент импульса относительно нового центра циркуляции для орбитальной составляющей общего спина. Этим и объясняется сильное изменение магнитного момента на p, d, f – орбиталях.

Орбиталь	**Форма кольца**	**Магнитный момент**
s	Ровное кольцо	0
p	Одна складка	Появляется
d	Две складки	Появляется
f	Три складки	Появляется

Это — полное объяснение. КМ использует в своих расчётах математический формализм и вводит математические сущности: *s, m_l, l, g*. Если это позволяет получить правильные результаты, то ТАО «не против» такого подхода. Далее будет более подробно рассмотрено что означают некоторые из этих сущностей в ТАО.

Сравнение: КМ , ТАО

Аспект	КМ	ТАО
Что такое квант	Порция энергии $\hbar\omega$	Один полный период hv

Аспект	КМ	ТАО
Постоянная	$\hbar$ (приведённая)	h (полная)
Что измеряется	$\hbar$ (не измеряется)	h (измеряется)
Магнетон Бора	$e\hbar/2m_e$	$eh/4\pi m_e$
g-фактор	Нужен	Не нужен
Поправки	Радиационные	Дрожание
Смысл кванта	Потерян	Восстановлен
Орбитальный вклад	Учитывается	Учитывается
Что создаёт магнитный момент	Спин + орбита	Спин + закрутка
Что создаёт электрическое поле	Орбита	Орбита (гравитон)
Квантовые числа	Нужны	Не нужны (есть онтология)
Наблюдаемая величина	$\pm\mu_B$	$\pm\mu_B$
Модуль вектора	$\approx 1.73\mu_B$	Не наблюдаемая (математическая сущность)

Часть 12. Выводы.

1. Квант — это один полный период.

2. Радиан никогда не поглощается и не излучается. Только период. Это — фундаментальный смысл квантовой теории. КМ «потеряла» этот смысл, заменив период на радиан.
3. $\hbar$ — это математическая надстройка, а не физическая величина.
4. h — это фундаментальная константа, которая измеряется. Во всех экспериментах измеряется hh, а не $\hbar\hbar$.
5. Магнетон Бора — это и есть микротор. Бор описал микротор электрона.
6. ТАО даёт полную онтологию магнитному моменту как спиновой характеристике.
7. В ТАО нет необходимости в квантовых числах, потому что есть онтология.
8. Магнитный момент создаётся только спиральной закруткой тора.
9. Поправка Δg — это дрожание (ортогональность решётки).
10. Причина дрожания — движение Земли относительно решётки (370 км/с).
11. Наблюдаемая величина — это не проекция, а исходное значение $\pm\mu_B$, а не $2\mu_B$.
12. ТАО использует формулы КМ как математический формализм (приём), если они дают правильные значения численно.

Итоговая таблица параметров электрона

Параметр	Обозначение	Значение	Статус
Масса покоя	m_e	9.1093837×10^{-31} кг	Известно
Энергия покоя	E_e	8.187×10^{-14} Дж	Известно

Параметр	Обозначение	Значение	Статус
Комптоновская длина	λ_C	$2.42631023867\times10^{-12}$ м	Известно
Длина цепочки	$L_{\text{цеп}}$	$4\lambda_C = 9.705\times10^{-12}$ м	Выведено
Число периодов	N	4	Выведено
Радиус кольца	r_e	$2\lambda_C / \pi = 1.544\times10^{-12}$ м	Выведено
Диаметр кольца	d_e	3.088×10^{-12} м	Выведено
Толщина ленты	l_P	1.616×10^{-35} м	Известно

Амплитудные параметры (зафиксированы)

Параметр	Обозначение	Значение	Статус
Амплитуда электрона	A_e	6.535×10^{-13} м	Выведено
Отношение $A_e/L_{\text{цеп}}$	—	6.7%	Выведено
Отношение A_e/λ_C	—	26.9%	Выведено
Отношение A_e/r_e	—	42.3%	Выведено

Спиновые параметры

Параметр	Обозначение	Значение	Статус
Спин радиана	$S_{1\text{рад}}$	$\hbar/2 = 5.273\times10^{-35}$ Дж·с	Выведено

Параметр	Обозначение	Значение	Статус
Спин периода	$S_{\text{период}}$	$h/2 = 3.313\times10^{-34}$ Дж·с	Выведено
Спин цепочки	$S_{\text{цепочки}}$	$2h = 1.325\times10^{-33}$ Дж·с	Выведено
Орбитальный момент (обруч)	$L_{\text{орб}}$	$4\hbar = 4.220\times10^{-34}$ Дж·с	Выведено

Магнитные параметры

Параметр	Обозначение	Значение	Статус
Магнетон Бора	μ_B	9.274×10^{-24} Дж/Тл	Известно
Магнитный момент (ТАО)	μ_e	μ_B	Выведено
Магнитный момент (эксп.)	$\mu_{e\text{эксп}}$	$1.00116\mu_B = 9.285\times10^{-24}$ Дж/Тл	Эксперимент
Поправка на дрожание	$\Delta g_{\text{дрож}}$	0.0023	Выведено

Электрические параметры

Параметр	Обозначение	Значение	Статус
Заряд электрона	e	1.602176634×10−19 Кл	Известно
Элементарный заряд	e	1 цепочка	Выведено

Параметр	Обозначение	Значение	Статус
1 Кулон	—	6.2415×10^{18} цепочек	Выведено
1 Ампер	—	6.2415×10^{18} цепочек/с	Выведено
1 Ампер	—	1.1576×10^{62} пикс/с	Выведено
Ток одной цепочки	$I_{\text{цеп}}$	1.602×10^{-19} А	Выведено

Энергетические параметры

Параметр	Обозначение	Значение	Статус
Энергия активного пикселя	ε_1	1.41×10^{-37} Дж	Выведено
Энергия нулевого пикселя	ε_0	2.24×10^{-114} Дж	Из тёмной энергии
Энергия периода	$E_{\text{период}}$	$E_e/4 = 2.047\times10^{-14}$ Дж	Выведено
Полная энергия фотона (порогового)	E_γ	$2m_ec^2 = 1.637\times10^{-13}$ Дж	Выведено

Фундаментальные константы решётки

Параметр	Обозначение	Значение	Статус
Планковская длина	l_P	1.616255×10^{-35} м	Известно

Параметр	Обозначение	Значение	Статус
Планковское время	t_P	5.391247×10^{-44} с	Известно
Планковская частота	f_P	1.855×10^{43} Гц	Выведено
Плотность пикселей	n_0	2.37×10^{104} м⁻³	Выведено
Число пикселей в электроне	N_e	5.8×10^{23}	Выведено
Длина цепочки в пикселях	N_e	6.005×10^{23}	Выведено

Движение электрона

Параметр	Обозначение	Значение	Статус
Период циркуляции	T	$2\pi r_e/c = 3.234\times10^{-20}$ с	Выведено
Угловая скорость	ω	$c/r_e = 1.943\times1020$ рад/с	Выведено
Момент инерции обруча	I	$m_e r_e^2 = 2.172\times10^{-54}$ кг·м²	Выведено
Скорость циркуляции	v	$c = 3\times10^8$ м/с	Известно
Скорость Земли относительно решётки	$v_{\text{Земля}}$	370 км/с	Из реликтового излучения

Скорость Земли и поправка на дрожание

Параметр	Обозначение	Значение	Статус
Скорость Земли	$v_{\text{Земля}}$	3.7×10^{5} м/с	Из реликтового излучения
Относительная скорость	β	$v/c = 1.233\times10^{-3}$	Выведено
Гамма-фактор	γ	1.00000076	Выведено
Замедление времени (год)	—	−24 с/год	Выведено
Поправка Δ*g*	$\Delta g_{\text{дрож}}$	0.0023	Выведено

Сводная таблица по уровням спина

Уровень	Формула	Значение для электрона
Спин радиана	$\hbar/2$	5.273×10^{-35} Дж·с
Спин периода	$h/2=\pi\hbar$	3.313×10^{-34} Дж·с
Спин цепочки	$2h$	1.325×10^{-33} Дж·с
Орбитальный спин	$2h\cdot k$	$1.325\times10^{-33}\cdot k$ Дж·с
Орбитальный момент (обруч)	$4\hbar$	4.220×10^{-34} Дж·с

Сводная таблица по магнитному моменту

Параметр	Значение	Статус
Магнетон Бора	9.274×10^{-24} Дж/Тл	Известно
Магнитный момент (ТАО)	μ_B	Выведено
Магнитный момент (с поправкой)	$1.00116\mu_B$	Эксперимент
Проекция (наблюдаемая)	$\pm\mu_B$	Эксперимент

Часть 13. Электроны и атоме.

13.1 В ТАО электрон в атоме — это спираль, которая опоясывает протон как кольцо. Это кольцо лежит в одной плоскости. Это плоскость циркуляции. В этой плоскости электрон «бегает» по кругу (переключается по пикселям) – по сути является стоячей волной.

Наблюдатель видит усреднённую картину — сферу. Сфера — это не форма атома. Это усреднённая картинка по множеству атомов с разными ориентациями плоскостей.

Можно представить аналогию:
Если взять много монеток, брошенных в воздух, и усреднить их тени на стене — получится круг. Но каждая монетка — плоская. Это можно проверить экспериментально. Если бы атом был строго сферическим, в магнитном поле атомы не должны были бы выстраиваться. Но они выстраиваются — эффект Зеемана. Значит, у атома есть выделенная плоскость циркуляции.

КМ не говорит, что атом плоский. Она говорит: «Мы не знаем ориентацию, поэтому описываем сферой».

В ТАО электрон – это плоскость, потому что она описывает геометрию циркуляции. Плоскость может быть повёрнута, но сама структура — плоская.

До образования атома: электрон является замкнутой циркуляцией, протон — сложный узел из трёх лент. У каждого своя циркуляция. У каждого своя полная масса.

При образовании атома: циркуляция электрона опоясывает протон, но сохраняет перекрут (спин). При этом лента разрывается в одном месте. Оба конца ленты подключается к протону образуя изгиб ленты (пуповину) в глубь (к центру-протону). Эта «пуповина» и является энергией (участком) связи.

Энергия связи — это энергия, запасённая в изгибе (пуповине) ленты циркуляции при её опоясывании протона.

«Пуповина» — это общая циркуляция между электроном и протоном ***принадлежит одновременно и электрону, и протону***.

Мы знаем про закон сохранения массы, заряда и спина частиц. Что происходит с массой:

- Масса электрона не исчезает — его лента просто стала частью общей циркуляции (пуповины).

- Масса протона не исчезает — он принял на себя общую циркуляции (пуповину).

Но общая масса атома меньше, чем сумма масс отдельных частиц, потому что часть ленты улетает в виде фотона.

В результате:

Масса покоя электрона и масса покоя протона сохраняются при образовании атома. Они не уменьшаются. Они не исчезают. Часть их циркуляции становится *общей* — принадлежит одновременно и электрону, и протону. Это общая циркуляция называется *пуповиной*. Часть ленты циркуляции отрывается и улетает в виде фотона. Этот фотон уносит энергию, равную энергии пуповины.

Энергия улетевшего фотона = Энергия пуповины = Энергия связи.

В КМ этому есть полное подтверждение: дефект массы. В КМ известно, что масса атома водорода меньше суммы масс свободных протона и электрона. Эта разница и составляет энергию связи в 13,6 эВ/c^2.

Это — прямое подтверждение того, что часть массы ушла на энергию фотона, который уносит энергию и соответствующую массу.

В КМ нет слова «пуповина», но есть:

- Связывающая орбиталь — область, где электронная плотность принадлежит обоим ядрам.

- Обменное взаимодействие — электрон «общий» для обоих центров.

Это — точный аналог пуповины в ТАО.

13.2. Энергия связи.

Электрон в атоме может быть:

- В основном состоянии — он «сидит» на самом низком уровне.

- В возбуждённом состоянии — он «поднят» выше.

Основное состояние — это самое низкое энергетическое состояние, в котором электрон может находиться в атоме. В атоме водорода это состояние имеет энергию:

$$E_0 = -13{,}6 \text{ эВ}$$

Знак «минус» означает, что электрон связан с ядром.
Чтобы его оторвать, нужно добавить энергию. Энергия связи — это энергия, которую нужно затратить, чтобы оторвать электрон от ядра. В атоме водорода энергия связи равна:

$$E_{\text{связи}} = 13{,}6 \text{ эВ}$$

Это точно такое же число, как и энергия основного состояния, но без знака «минус». Они равны, потому что это одно и то же, только с разных сторон.

- Энергия основного состояния — это энергия, которая удерживает электрон в атоме.

- Энергия связи — это энергия, которую нужно затратить, чтобы освободить электрон.

Это энергия «пуповины», которую мы уже рассматривали.

Поэтому:

$$E_{\text{связи}} = |E_0| = 13{,}6 \text{ эВ}$$

Мы определим эту энергию связи из принципов ТАО, но не сейчас, а в Главе «Квантовая гравитация».

13.3. Расположение и форма электрона.

В ТАО электрон — это гибкая, замкнутая спираль. Когда она попадает в гравитационное поле протона, она изгибается. Но изгибаться она может по-разному, в зависимости от того, сколько энергии у электрона и как именно он «входит» в гравитационную «яму» протона. В зависимости от этого спирали может принять нескольких стандартных форм орбиталей.

Форма орбиталей

Форма в КМ	Форма в ТАО	Как это выглядит
S (сфера)	**Плоское кольцо** (тор)	Лента просто опоясывает ядро ровным кольцом. Нет узлов.
P (гантель)	**Кольцо с одной складкой**	Лента изогнута так, что внешний вид как гантель (два лепестка).
D (сложная)	**Кольцо с двумя складками**	Лента изогнута так, что внешний вид как двойная гантель.
F (ещё сложнее)	**Кольцо с тремя складками**	Три гантели и больше.

Орбиталь — это не «облако вероятности». Это реальная геометрическая форма, которую принимает лента, чтобы минимизировать свою энергию в поле ядра.

Электрон не выбирает форму в том смысле, в каком мы выбираем одежду. Он вынужден принять ту форму, которая соответствует его энергии и моменту импульса.

Какую форму примет лента в квантовой механике это определяется квантовым числом:

- *n* — главное квантовое число (уровень энергии). Оно определяет, сколько узлов (складок) может иметь лента.

- *l* — орбитальное квантовое число (форма). Оно определяет число складок (узлов) на ленте.

- *m* — магнитное квантовое число (ориентация). Оно определяет, как именно повёрнута эта форма в пространстве.

В ТАО это звучит так:

Квантовое число	**Что оно значит в ТАО**
n	**Число полуволн**, которые укладываются на длине ленты. $n = 1$ — одна полуволна (основное состояние). $n = 2$ — две полуволны (первое возбуждение).
l	**Число узлов** (пересечений оси) на ленте. $l = 0$ — нет узлов (S). $l = 1$ — один узел (P). $l = 2$ — два узла (D).
m	**Проекция узлов** на оси пространства. Сколько способов повернуть ленту так, чтобы узлы смотрели вдоль X, Y или Z.

Электрон «выбирает» форму, которая соответствует его энергии:

- Если у электрона мало энергии (основное состояние) — он может принять только самую простую форму (S).

- Если у электрона больше энергии (возбуждённое состояние) — он может принять более сложную форму (P, D, F), потому что у него есть энергия, чтобы «изогнуть» ленту сильнее.

Когда электрон поглощает фотон, он получает энергию. Эта энергия распрямляет или изгибает его ленту:

- Поглощение фотона → лента получает энергию → переходит в форму с большим числом узлов (P, D, F).
- Излучение фотона → лента теряет энергию → переходит в форму с меньшим числом узлов (S).

Правила отбора в ТАО — это правила сохранения топологии:

- Узел не может исчезнуть или появиться мгновенно. Он должен измениться плавно.
- Поэтому l может меняться только на 1 ($\Delta l = \pm 1$).
- Ориентация (m) может меняться на 0 или ±1.

Это не «запреты» — это геометрические ограничения. Лента не может перескочить из формы с 0 узлов в форму с 2 узлами, потому что для этого нужно было бы разорвать ленту.

Водород — это всегда одна лента, потому что у него один электрон. У него одна лента. Поэтому:

- S-состояние — лента ровно опоясывает протон.

- P-состояние — лента образует одну петлю.

- D-состояние — лента образует две петли.

Но лента всегда одна и та же. Она просто принимает разные формы в зависимости от энергии. В многоэлектронных атомах — несколько лент. Они вплетаются в циркуляцию ядра атома, создавая сложные пространственные структуры (оболочки, подуровни).

Пуповина — зона общей циркуляции электрона и протона. **Не излучает**.

Свободная часть ленты — опоясывает протон. Излучает фотоны при переходах.

Узлы — складки на свободной части ленты. Разбивают её на зоны с разной кривизной.

Расщепление — возникает, когда свободная часть ленты имеет **несколько зон** с разной энергией (из-за разной кривизны).

13.4. Расшепление спектральных линий.

Ещё 1887 году Альберт Микельсон изучал спектры водорода. Когда электрон переходит с одного уровня в атоме на другой (например, с более высокого на более низкий), атом излучает фотон. Энергия этого фотона равна разности энергий между этими двумя уровнями. Каждый возможный переход даёт одну спектральную линию. Но Микельсон обнаружил, что самая яркая линия водорода (Hα) — не одна, а состоит из двух очень близких линий. И уже 1916 году Арнольд Зоммерфельд сделал свои вычисления, и он обнаружил, что один уровень энергии (например, уровень n=2 в водороде) на самом деле расщепляется на несколько близких подуровней. Эти подуровни — это не просто «бумажные» числа. Это реальные энергетические состояния, в которых может находиться электрон в атоме. Это было странно, потому что модель Бора предсказывала одну линию для каждого уровня. На самом деле линия была расщеплена на две. Это и было интерпретировано ***тонкой структурой*** — набор близких линий вместо одной.

Зоммерфельд решил объяснить эти сдвоенные линии.

Его логика:

1. Электрон движется не по кругу, а по эллипсу.
2. Вблизи ядра его скорость растёт — становится релятивистской.
3. Из-за этого масса электрона меняется (в соответствии с СТО).
4. Это меняет энергию электрона — чуть-чуть.
5. Это «чуть-чуть» и есть расщепление.

Поэтому он назвал это «релятивистской поправкой». Как мы понимаем, это вовсе не является никакой релятивистской поправкой, а просто «удобный термин».

Более того, в линиях спектра местами появляются и четыре, и шесть линий дополнительных.

Что говорит Квантовая механика:

«Тонкая структура возникает из-за спин-орбитального взаимодействия — взаимодействия магнитного момента электрона с его орбитальным движением. Это не релятивистский эффект в том смысле, в каком его описывал Зоммерфельд. Это квантовый эффект, связанный с внутренним моментом импульса электрона. И это не просто «чуть-чуть изменилась масса». Это совершенно другая физика.»

Это объяснение в КМ написано на птичьем языке. «Релятивистская поправка» Зоммерфельда даёт правильное численное значение для расщепления. Но это не потому, что он правильно понял физику процесса. А потому, что он подобрал коэффициент, который даёт нужное число. Что на самом деле даёт такую картину сдвоенных линий в спектре водорода, мы дадим после того, как рассмотрим, как ведут себя электроны в атоме.

13.5. Сводная таблица

Уровень $n = 1$

Подуровень	Форма ленты	Узлы	Пуповина	Расщепление	Почему?
1s	Правильная окружность	**Нет**	Максимальна (13.6 эВ)	**Нет**	Свободная часть ленты — идеальная окружность. Все её точки находятся на **одинаковом** расстоянии от протона. Излучение даёт **одну** энергию.

Уровень $n = 2$

Подуровень	Форма ленты	Узлы	Пуповина	Расщепление	Почему?
2s	Окружность большего радиуса	**Нет**	Меньше (3.4 эВ)	**Нет**	Свободная часть — окружность. Все точки на одном расстоянии → одна энергия.
2p	Гантель (одна складка)	**1**	Меньше (3.4 эВ)	**Да (2 линии)**	Свободная часть разбита на **две зоны**: одна ближе к протону (гантель 1), другая дальше (гантель 2). Каждая зона имеет свою кривизну → излучают **две** немного разные энергии.

Уровень *n* = 3

Подуровень	Форма ленты	Узлы	Пуповина	Расщепление	Почему?
3s	Окружность большего радиуса	**Нет**	Ещё меньше (1.51 эВ)	**Нет**	Окружность → одна энергия.
3p	Гантель большего радиуса	**1**	Ещё меньше (1.51 эВ)	**Да (2 линии)**	Две зоны → две энергии.
3d	Две складки (более сложная форма)	**2**	Ещё меньше (1.51 эВ)	**Да (2 или более линий)**	Два узла создают **три зоны** с разной кривизной. Излучение даёт **несколько** близких энергий (но в основном две доминирующие).

Уровень $n = 4$

Подуровень	Форма ленты	Узлы	Пуповина	Расщепление	Почему?
4s	Окружность ещё большего радиуса	**Нет**	Минимальна (0.85 эВ)	**Нет**	Окружность → одна энергия.
4p	Гантель	**1**	Минимальна (0.85 эВ)	**Да (2 линии)**	Две зоны → две энергии.
4d	Две складки	**2**	Минимальна (0.85 эВ)	**Да (несколько линий)**	Три зоны → несколько энергий.
4f	Три складки	**3**	Минимальна (0.85 эВ)	**Да (много линий)**	Четыре зоны → много близких энергий (но они перекрываются, и расщепление почти незаметно).

Уровень $n \to \infty$ (ионизация)

Подуровень	Форма ленты	Узлы	Пуповина	Расщепление	Почему?
Любая	Лента разорвана, пуповина = 0	—	**0**	**Нет**	Свободный электрон (восьмёрка) не имеет орбитального расщепления.

Итоговая сводка по расщеплению

Тип подуровня	Число узлов	Число зон излучения	Расщепление
S	0	1 (окружность)	**Нет** (одна энергия)
P	1	2 (гантели)	**Да** (две линии)
D	2	3 (три зоны)	**Да** (несколько линий, но доминируют две)
F	3	4 (четыре зоны)	**Да** (много линий, но они почти сливаются)

В S-состоянии нет узлов, потому что:

- Лента — правильная окружность.

- Все её точки находятся на одинаковом расстоянии от протона (через пуповину).

- Излучение идёт равномерно со всей свободной части ленты.

- Одна энергия → одна линия.

Почему P, D, F дают расщепление

- В этих состояниях есть узлы (складки).

- Узлы разбивают свободную часть ленты на зоны (гантели, трилистники и т.д.).

- Каждая зона (гантель, трилистник) имеет свою кривизну → свою энергию.

- Излучение идёт от разных зон → разные энергии → несколько линий.

Часть 14. Постоянная тонкой структуры и боровский радиус: смысл, вывод и полная хронология (как физики «собирали пазл», не зная картинки).

Два числа, которые определяют реальность

Есть два числа, без которых невозможно представить себе атом. Первое — боровский радиус: $a_0 \approx 5.29 \times 10^{-11}$ м. Это масштаб, на котором электрон «живёт» вокруг ядра. Второе — постоянная тонкой структуры: $\alpha \approx 1/137.036$. Это безразмерная константа, определяющая, с какой силой электрон связан с ядром, как расщепляются спектральные линии, как устроены атомы.

Эти два числа связаны. Связь между ними долгое время оставалась незамеченной. Мы знали формулу Бора, знали формулу Зоммерфельда, знали уравнение Дирака. Но никто не мог ответить

на вопрос: «Почему a_0 именно такое? Почему α именно такое? Почему 137, а не 100 или 200?»

Фейнман назвал это «проклятием физиков». Он был прав. Но он не знал, что проклятие можно снять.

Далее мы пройдём весь путь — от Бальмера до ТАО. Мы разберём каждую формулу, каждое открытие, каждую интерпретацию. Мы покажем, как менялось понимание боровского радиуса и постоянной тонкой структуры. И в конце мы дадим ответ ТАО, который снимает проклятие.

Подчасть 14.1. Боровский радиус: история открытия.

1. Бальмер (1885): Эмпирическая формула для водорода

Иоганн Якоб Бальмер (1825–1898) — швейцарский математик и физик, преподаватель средней школы в Базеле. Он не был великим теоретиком. Он был нумерологом — человеком, который искал закономерности в числах. В 1885 году он изучал спектр водорода. Спектр — это набор линий, которые возникают, когда атом водорода возбуждается (например, в электрическом разряде) и затем излучает свет. Каждая линия соответствует определённой длине волны. Бальмер заметил, что длины волн в видимой части спектра водорода (так называемая серия Бальмера: H_α, H_β, H_γ, H_δ) связаны простой формулой.

Формула Бальмера:

$$\lambda = h \cdot \frac{n^2}{n^2 - 4}$$

Где:

- λ — длина волны излучения (в метрах или ангстремах).

- h — эмпирическая константа, которую Бальмер подобрал из данных. $h \approx 3645.6$ Å $= 3.6456 \times 10^{-7}$м. Важно: это не постоянная Планка! Это просто число, которое Бальмер подобрал методом тыка.

- n — целое число (n = 3, 4, 5, 6 для видимой серии).

Пример:
Для $n = 3$ (линия H_α):

$$\lambda = 3645.6 \cdot \frac{9}{9-4} = 3645.6 \cdot \frac{9}{5} = 6562 \text{ Å}$$

Это красная линия водорода.

Для $n = 4$ (линия H_β):

$$\lambda = 3645.6 \cdot \frac{16}{16-4} = 3645.6 \cdot \frac{16}{12} = 4861 \text{ Å}$$

Это сине-зелёная линия.

Бальмер угадал формулу. Он не вывел её из физики. Он просто увидел, что числа подчиняются закономерности, и записал её. Это было эмпирическое открытие — открытие «сверху вниз», от данных к формуле.

Формула Бальмера показала, что в атоме водорода есть скрытый порядок. Она не объясняла, почему этот порядок существует, но она его обнаружила. Это был первый шаг к пониманию атома.

2. Ридберг (1888–1890): Обобщение на все серии

Йоханнес Роберт Ридберг (1854–1919) — шведский физик, профессор Лундского университета. Он был систематизатором. Он хотел найти общую формулу, которая описывала
бы все спектральные линии, а не только видимую серию водорода.

Ридберг работал с волновыми числами — величиной, обратной длине волны:

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$$

Это удобно, потому что волновые числа складываются и вычитаются, как энергии.

Формула Ридберга:

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

Где:

- R — постоянная Ридберга. Ридберг определил её численно из спектров: $R \approx 1.097 \times 10^7$ м$^{-1}$.

- n_1 — фиксированное число (для серии Бальмера $n_1=2$).

- n_2 — целое число ($n_2>n_1$).

Пример:
Для серии Бальмера ($n_1=2$):

$$n_2 = 3\text{: } \tfrac{1}{\lambda} = R(1/4 - 1/9) = R \cdot 5/36$$
$$n_2 = 4\text{: } \tfrac{1}{\lambda} = R(1/4 - 1/16) = R \cdot 3/16$$

Ридберг обобщил формулу Бальмера. Он показал, что все серии водорода (Лайман, Бальмер, Пашен, Брэкетт, Пфунд) описываются одной формулой. Это был второй шаг — от частного к общему.

Но Ридберг, как и Бальмер, не знал физического смысла своей формулы. Он не знал, что такое n_1 и n_2. Он не знал, почему постоянная Ридберга именно такая.

Постоянная Ридберга стала эмпирической константой. Её значение брали из эксперимента и подставляли в формулу. Никто не мог её вывести.

3. Бор (1913): Первый вывод из теории

Нильс Бор (1885–1962) — датский физик, один из величайших учёных XX века. В 1913 году он создал первую квантовую модель атома. Бор не подгонял числа. Он вывел их из двух постулатов. Это был третий шаг — от эмпирики к теории.

Постулаты Бора.

Постулат 1: Классическая механика для орбиты

Электрон движется по круговой орбите вокруг ядра. Кулоновская сила притяжения сообщает ему центростремительное ускорение:

$$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{ke^2}{r^2}$$

Где:

- $m_e = 9.109 \times 10^{-31}$ кг — масса электрона.
- v — скорость электрона на орбите.
- r — радиус орбиты.
- $k = 1/4\pi\varepsilon_0 = 8.987 \times 10^9$ Н·м²/Кл² — постоянная Кулона.
- $e = 1.602 \times 10^{-19}$ Кл — элементарный заряд.

Постулат 2: Квантование момента импульса

Момент импульса электрона может принимать только дискретные значения, кратные $\hbar$:

$$m_e v r = n\hbar$$

Где:

- $n = 1,2,3,\ldots$ — **главное квантовое число**.
- $\hbar = 2\pi h = 1.055 \times 10^{-34}$ Дж·с — приведённая постоянная Планка.

Вывод боровского радиуса

Шаг 1: Выражаем скорость из второго постулата:

$$v = \frac{n\hbar}{m_e r}$$

Шаг 2: Подставляем в первый постулат:

$$\frac{m_e}{r}\left(\frac{n\hbar}{m_e r}\right)^2 = \frac{ke^2}{r^2}$$

$$\frac{n^2\hbar^2}{m_e r^3} = \frac{ke^2}{r^2}$$

Шаг 3: Умножаем обе стороны на r^3:

$$\frac{n^2\hbar^2}{m_e} = ke^2r$$

Шаг 4: Выражаем радиус:

$$r = \frac{n^2\hbar^2}{m_e k e^2}$$

Шаг 5: Для основного состояния (n=1):

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e k e^2}$$

Это — боровский радиус.

Численное значение

Подставляем значения:

$$a_0 = \frac{(1.055 \times 10^{-34})^2}{9.109 \times 10^{-31} \cdot 8.987 \times 10^9 \cdot (1.602 \times 10^{-19})^2}$$

$$a_0 = \frac{1.113 \times 10^{-68}}{9.109 \times 10^{-31} \cdot 8.987 \times 10^9 \cdot 2.566 \times 10^{-38}}$$

$$a_0 = \frac{1.113 \times 10^{-68}}{2.100 \times 10^{-58}} = 5.29 \times 10^{-11} \text{ м}$$

Боровский радиус:

$$\boldsymbol{a_0 \approx 5.29 \times 10^{-11} \text{ м} = 0.529 \text{ A}^\circ = 52.9 \text{ пм}}$$

Что означал боровский радиус у Бора

У Бора (1913):

- Это радиус первой разрешённой орбиты электрона в атоме водорода.

- Электрон буквально движется по этой орбите, как планета вокруг Солнца.

- Это реальный физический размер атома.

- Это граница атома.

Бор считал: электрон находится на этом расстоянии от ядра. Точка.

Вывод постоянной Ридберга

Бор также вывел постоянную Ридберга из своей модели. Энергия уровня *n*:

$$E_n = -\frac{m_e k^2 e^4}{2\hbar^2 n^2}$$

Для *n*=1:

$E_1 = -13.6$ эВ

Это — энергия основного состояния водорода.

Постоянная Ридберга:

$$R = \frac{m_e k^2 e^4}{2\hbar^3 c}$$

Подставляя значения, Бор получил:

$R \approx 1.097 \times 10^7$ м−1

Это совпало с экспериментальным значением Ридберга. Это был триумф. Бор вывел число из фундаментальных констант, а не подогнал его.

Но: Бор не объяснил, почему момент импульса квантуется. Он просто постулировал это. И он не объяснил, почему $\hbar$ имеет именно такое значение. Это осталось загадкой.

4. Зоммерфельд (1916): Релятивистская поправка и рождение α

Арнольд Зоммерфельд (1868–1951) — немецкий физик-теоретик, профессор Мюнхенского университета. Он был обобщателем. Он хотел расширить модель Бора на более сложные случаи.

Зоммерфельд сделал две вещи:

1. Обобщил орбиты: вместо круговых — эллиптические.

2. Добавил релятивистские поправки: электрон движется быстро, его масса меняется.

В модели Зоммерфельда электрон движется по эллипсу. Появляется **второе квантовое число** — l (орбитальное квантовое число). Оно определяет форму эллипса:

- $l = 0$ — вырожденный эллипс (прямая линия).
- $l = n-1$ — круговая орбита.

Релятивистская поправка

Электрон на орбите движется со скоростью v. Согласно СТО, его масса:

$$m = \frac{m_e}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Это меняет энергию уровня. Зоммерфельд вычислил поправку и получил:

$$E_{n,l} = -\frac{m_e k^2 e^4}{2\hbar^2 n^2}\left[1 + \frac{\alpha^2}{n}\left(\frac{1}{l+1/2} - \frac{3}{4n}\right)\right]$$

Где α — **новая константа**:

$$\alpha = \frac{ke^2}{\hbar c}$$

α — это безразмерная величина. Она показывает, насколько сильно электромагнитное взаимодействие:

- В числителе: ke^2 — характеристика силы взаимодействия.
- В знаменателе: $\hbar c$ — «квант действия», умноженный на скорость света.

Численное значение:

$$\alpha = \frac{8.987 \times 10^9 \cdot (1.602 \times 10^{-19})^2}{1.05 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}$$

$$v = \frac{ke^2}{\hbar} \cdot \frac{1}{n}$$

$$\alpha = \frac{2.306 \times}{3.165 \times 10^{-26}} = 7.297 \times 10^{-3}$$

$$\alpha \approx \frac{1}{137.036}$$

Физический смысл α — это отношение скорости электрона на первой орбите к скорости света:

Для $n = 1$:

Это 0.7% от скорости света. Электрон на первой орбите движется быстро, но не релятивистски. Поэтому поправка Зоммерфельда

$$v = \frac{ke^2}{\hbar} = \alpha c$$

$$v \approx \frac{c}{137} \approx 2180 \text{ км/с}$$

мала.

Тонкая структура

Поправка Зоммерфельда расщепляет уровни энергии на подуровни. Например, уровень $n = 2$ расщепляется на два:

- $l = 0$ (2s)
- $l = 1$ (2p)

Разница энергий:

$$\boldsymbol{\Delta E \approx En \cdot \alpha^2}$$

Где $\boldsymbol{\alpha^2 \approx 5.3 \times 10^{-5}}$**. Это — тонкая структура спектра. Отсюда название «постоянная тонкой структуры».**

Что означал α у Зоммерфельда?

Зоммерфельд обнаружил α, но не вывел её значение. Он показал, что эта комбинация констант управляет тонкой структурой.

Число 1/137 получилось автоматически, когда он подставил известные значения e, $\hbar$, c.

Но Зоммерфельд не объяснил, почему α именно такое. Он не вывел его из первых принципов. Он просто нашёл его.

Современные историки науки считают, что успех Зоммерфельда был частично обусловлен случайной компенсацией ошибок. Его полуклассическая модель не учитывала спин электрона, но всё равно давала правильный ответ.

Что это меняет для боровского радиуса

Формула Бора для радиуса:

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e k e^2}$$

Зоммерфельд добавил поправку:

$$a_{n,l} = a_0 \cdot n^2 \cdot \left[1 + \frac{\alpha^2}{n}\left(\frac{1}{l+1/2} - \frac{3}{4n}\right)\right]$$

Но поправка очень мала ($\alpha^2 \approx 5.3\times10^{-5}$). Следовательно, радиус почти не меняется. Основной вклад — это $a_0 \cdot n^2$.

Зоммерфельд не изменил формулу Бора для радиуса. Он добавил поправку к энергии. И в этой поправке появилась α.

5. Дирак (1928): Вывод из первых принципов

Поль Дирак (1902–1984) — английский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики. В 1928 году он создал релятивистское волновое уравнение для электрона. Дирак не подгонял числа. Он вывел их из уравнения. Это был четвёртый шаг — от полуклассики к строгой квантовой теории.

Уравнение Дирака

Дирак хотел получить уравнение, которое было бы:

1. **Релятивистским:** совместимым со СТО ($E^2=p^2c^2+m^2c^4$).
2. **Линейным по времени:** как уравнение Шрёдингера.

Он взял релятивистское соотношение энергии-импульса:

$$E^2=p^2c^2+m^2c^4$$

И захотел извлечь квадратный корень:

$$E = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4}$$

Но корень из суммы квадратов не извлекается обычными числами. Дирак придумал гениальный ход: использовать матрицы. Он записал:

$$E = \alpha \cdot pc + \beta mc^2$$

Где α и β — матрицы, а не числа. Чтобы это работало, матрицы должны подчиняться специальным правилам (алгебре Дирака).

Уравнение Дирака в ковариантной форме

Дирак записал уравнение в красивой и компактной форме:

$$(i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc)\psi = 0$$

Где:

- γ^μ — матрицы Дирака (4×4).
- ∂_μ — производные по времени и координатам.
- ψ — 4-компонентная волновая функция (биспинор).

Что дало уравнение Дирака

Уравнение Дирака дало автоматически:

1. Спин 1/2: электрон имеет собственный момент импульса, равный $\hbar/2$.
2. Магнитный момент: электрон имеет магнитный момент, равный магнетону Бора.
3. Тонкую структуру: формула для расщепления уровней совпала с формулой Зоммерфельда.
4. Античастицы: предсказало существование позитрона.

Постоянная тонкой структуры у Дирака

В уравнении Дирака α появилась естественным образом:

$$\alpha = \frac{ke^2}{\hbar c}$$

Но теперь это была не просто комбинация констант. Это была фундаментальная константа, определяющая силу электромагнитного взаимодействия.

Но уравнение Дирака не вывело значение α. Оно просто показало, что α — это фундаментальная константа. Значение 1/137 по-прежнему бралось из эксперимента.

Дирак «подтвердил» Зоммерфельда?

Да, но только в численном смысле.

Дирак подтвердил:

- Формулу для расщепления уровней.

- Численное значение тонкой структуры.

- То, что α — фундаментальная константа.

Что Дирак НЕ подтвердил:

- Физический механизм Зоммерфельда. Зоммерфельд думал, что расщепление — это релятивистское изменение массы орбитального электрона. Дирак показал, что расщепление — это спин-орбитальное взаимодействие.

- Полуклассическую модель Зоммерфельда. Электрон — не шарик на орбите. Электрон — это квантовый объект со спином.

- «Скорость электрона на орбите» как физическую величину. В уравнении Дирака нет «орбиты». Есть волновая функция.

Иными словами:

Зоммерфельд угадал правильную формулу. Дирак объяснил, почему она правильная. Но объяснение Дирака отменило модель Зоммерфельда.

Это как с формулой Бальмера:

- Бальмер угадал формулу для спектра водорода.

- Бор объяснил, почему она правильная.

- Но объяснение Бора отменило эмпирику Бальмера (хотя формула осталась).

Но почему формулы совпали?

Это — одна из самых красивых «случайностей» в истории физики.

Причина совпадения:

В нерелятивистской квантовой механике (уравнение Шрёдингера) уровни энергии водорода зависят только от n. Расщепления нет.

В релятивистской квантовой механике (уравнение Дирака) уровни зависят от n и j. Расщепление есть.

В полуклассической модели Зоммерфельда уровни зависят от n и l. Расщепление есть.

Численное совпадение возникает потому, что:

$$j = l \pm 1/2$$

И для каждого l есть два значения j. Комбинация этих значений даёт то же самое численное выражение, что у Зоммерфельда.

Но физический смысл — разный:

- У Зоммерфельда: расщепление из-за релятивистского изменения массы.

- У Дирака: расщепление из-за спин-орбитального взаимодействия.

Это — «случайная компенсация ошибок». Зоммерфельд не учитывал спин, но его формула «случайно» дала правильный результат. Дирак учитывал спин, и его формула дала тот же результат.

Дирак не отменил:

1. Боровский радиус. Формула $a_0 = \hbar^2/(m_e k e^2)$ осталась. Она просто получила новую интерпретацию: *«наиболее вероятное расстояние», а не «радиус орбиты».*
2. Постоянную Планка $\hbar$. Она осталась в уравнении Дирака. Дирак не отменил $\hbar$.
3. Квантование. Дирак не отменил квантование. Он просто показал, что оно возникает автоматически из уравнения, а не из постулата.
4. Формулу Зоммерфельда для тонкой структуры. Дирак подтвердил её численно.

Это значит:

Дирак отменил онтологию Бора (орбиты), но сохранил его математику (формулы).

Это — типичная ситуация в физике: новая теория отменяет старую онтологию, но сохраняет старую математику как предельный случай. ТАО идёт дальше. ТАО отменяет не только онтологию Бора (орбиты), но и онтологию Дирака (волновая функция как фундаментальная сущность).

6. Современное значение (CODATA 2022)

Сейчас α — одна из самых точно измеренных констант. Её значение определяют двумя способами:

Способ 1: Аномалия магнитного момента электрона ($g - 2$)

Магнитный момент электрона:

$$\mu_e = g \cdot \frac{e\hbar}{2m_e}$$

Где g — **g-фактор**. Для точечного электрона $g = 2$. Но из-за квантовых флуктуаций g немного больше:

$$g = 2(1 + a)$$

Где a — **аномалия**. Теория (КЭД) предсказывает:

$$a = \frac{\alpha}{2\pi} + \dots$$

Измеряя g с огромной точностью, можно определить α.

Способ 2: Измерение отдачи атомов

Атом (например, рубидий) поглощает фотон и отскакивает. Измеряя скорость отдачи, можно определить α.

Современное значение

CODATA 2022:

$\alpha^{-1} \approx 137.035999206(11)$

Где (11) — погрешность в последних двух знаках. Истинное значение лежит в интервале:

$$137.035999195 < \alpha - 1 < 137.035999217$$

Это — одна из самых точных констант в физике. Точность — 10 знаков после запятой.

Почему это «проклятие»

α — безразмерное число. Это значит, что оно не зависит от системы единиц. Оно чистое число.

Примеры безразмерных чисел:

- $\pi \approx 3.14159\ldots$ — геометрическая константа.
- $e \approx 2.71828\ldots$ — математическая константа.
- $\alpha \approx 1/137.036$ — физическая константа.

π и e выводятся из математики. α — не выводится из физики. Это — проклятие.

7. Что сказал Фейнман

Ричард Фейнман (1918–1988) — американский физик-теоретик, один из создателей КЭД, лауреат Нобелевской премии (1965). Он был гением и шоуменом. Он умел объяснять сложное просто.

В своих лекциях Фейнман говорил:

«Эта постоянная с давних пор — проклятие физиков. Вы можете спросить: "Что означает 1/137?" Никто не знает. Это одно из величайших проклятий физики — магическое число, которое пришло к нам без понимания».

Он говорил именно это. И он был прав.

Потому что α не выводится из первых принципов в рамках стандартной физики.

Что это значит:

1. Уравнение Дирака даёт формулу для α: $\alpha = ke^2/\hbar c$.
2. Но эта формула содержит e, $\hbar$, c.
3. Значения e, $\hbar$, c берутся из эксперимента.
4. Следовательно, α — эмпирическая.

Таблица статуса констант:

Величина	**Статус**
e	Эмпирическая
$\hbar$	Эмпирическая
c	Эмпирическая
α	Эмпирическая (из e, $\hbar$, c)

Ни одна из этих констант не выводится из первых принципов. Следовательно, α — тоже эмпирическая.

Постоянная тонкой структуры α:

- Безразмерна. Это чистое число (1/137.036).
- Её значение не зависит от выбора единиц.

- Она не может быть равна 1 в любых единицах.
Она всегда 1/137.036.

- Она не выводится из чего-то более фундаментального.

Что это значит:

Когда физик говорит «α=1/137.036», он удивляется. Потому что число 137.036137.036 — это не следствие выбора единиц. Это факт природы. Оно могло быть любым. Но оно такое. И почему — никто не знает.

α — это число природы. Это чистое число. Оно не выводится. Оно просто есть. И почему — загадка.

Подчасть 14.2. ТАО: Вывод α из первых принципов

Мы подробно уже вывели из первых принципов число α (Глава 1. Вывод постоянной тонкой структуры в Теории Абсолютной Относительности).

Формула ТАО для α:

$$\alpha = \left(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}\right)^{1/36}$$

Или, что то же самое:

$$\alpha = \sqrt[36]{\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}}$$

Где:

- ε_0 — энергия нулевого пикселя (из тёмной энергии).

- ε_1 — энергия активного пикселя (из массы электрона).

- 36 =6 ^{2} — геометрический фактор (6 направлений связи в кубической решётке, квадрат — из-за правила Борна и квадратичного вхождения заряда).

Что такое постоянная тонкой структуры в итоге

У Зоммерфельда (1916):

- Комбинация констант, управляющая тонкой структурой.

- $\alpha = ke^2/\hbar c$.

- Число 1/137 получилось автоматически.

У Дирака (1928):

- Фундаментальная константа, определяющая силу электромагнитного взаимодействия.

- Но значение по-прежнему бралось из эксперимента.

У Фейнмана (1960-е):

- «Проклятие физиков».

- «Магическое число, которое пришло к нам без понимания».

В ТАО:

- Выводной параметр, вычисляемый из:

  - Энергии активного пикселя ε_1 (из массы электрона).

  - Энергии нулевого пикселя ε_0 (из тёмной энергии).

  - Геометрии кубической решётки (6 направлений связи).

  - Квантовой природы взаимодействия (правило Борна, квадрат амплитуды).

- Формула: $\alpha = (\varepsilon_0/\varepsilon_1)^{1/36}$.

- Численное значение: $\alpha \approx 1/136$ (с точностью ~0.7%, ограниченной точностью ε_0).

Почему именно ТАО выводит α из первых принципов?

«Вывести из первых принципов» — значит получить значение константы из более фундаментальной теории, а не брать его из эксперимента.

В стандартной физике:

- e, $\hbar$, c — эмпирические.

- $\alpha = ke^2/\hbar c$ — эмпирическая.

В ТАО:

- ε_0, ε_1, 36 — фундаментальные.

- $\alpha = (\varepsilon_0/\varepsilon_1)^{1/36}$ — выводная.

Три независимых источника

Источник 1: ε_0 — из тёмной энергии

$$\varepsilon_0 = \frac{u_\Lambda}{n_0} = \frac{5.3 \times 10^{-10}}{2.37 \times 10^{104}} \approx 2.24 \times 10^{-114} \text{ Дж}$$

Где u_Λ — плотность тёмной энергии (из космологии), n_0 — плотность пикселей (из планковской длины).

Источник 2: ε_1 — из массы электрона

$$\varepsilon_1 = \frac{E_e}{N_e} = \frac{m_e c^2}{N_e} \approx 1.41 \times 10^{-37} \text{ Дж}$$

Где N_e — число пикселей в электроне (из комптоновской длины).

Источник 3: 36 — из геометрии

$36 = 6^2$

Где 6 — число ближайших соседей в кубической решётке.

Три независимых источника. Один результат. Это — вывод.

Почему это снимает «проклятие»

Фейнман говорил: «Никто не знает, что означает 1/137».

ТАО отвечает:

$$1/137 = (\varepsilon_1/\varepsilon_0)^{1/36}$$

Это означает:

- ε_0 — энергия вакуума.

- ε_1 — энергия материи.

- 36 — геометрия пространства.

1/137 — это отношение энергии вакуума к энергии материи, возведённое в степень, определяемую геометрией пространства.

Если бы Фейнман увидел ТАО, он бы сказал:

«Я говорил, что 1/137 — проклятие. Я ошибался. Это — не проклятие. Это — ключ. Ключ к пониманию того, что пространство состоит из пикселей, что вакуум имеет энергию, что материя — это паттерны, а геометрия — это судьба».

Подчасть 14.3. Боровский радиус в ТАО

В ТАО электрон — это замкнутая спираль, опоясывающая протон. Боровский радиус — это радиус этой проекции на окружающее пространство (нулевые пиксели). Это радиус деформационного поля. Это радиус микротора. Это радиус границы между зоной G_e (электромагнетизм) и зоной G (классическая гравитация).

Формула ТАО для боровского радиуса

$$a_0 = \frac{R_e}{4\alpha}$$

Где:

- R_e — реальный радиус ленты (кольца) электрона, вычисленный из $4\lambda_C$.
- α — постоянная тонкой структуры.

Что такое R_e

В ТАО:

Длина цепочки электрона: $L_{цеп} = 4\lambda_C$
Радиус кольца: $r_e = 2\lambda_C / \pi$

То есть радиус кольца *Re*:

$$R_e = \frac{2\lambda_C}{\pi}$$

Где $\lambda_C = 2.426310 \times 10^{-12}$ м — комптоновская длина волны электрона.

Численное значение R_e

$$a_0 = \frac{1.54465 \times 10^{-12}}{4 \times (1/137.036)}$$

$$4\alpha = \frac{4}{137.036} = 0.029189$$

$$a_0 = \frac{1.54465 \times 10^{-12}}{0.029189}$$

$$a_0 \approx 5.2918 \times 10^{-11} \text{ м}$$

Подставляем:

Экспериментальное значение боровского радиуса:

$$a_0 = 5.29177210903 \times 10^{-11} \text{ м}$$

Формула верна. Численно она даёт боровский радиус.

Это не случайное совпадение. Это прямое следствие того, что в ТАО:

- Реальный радиус ленты электрона R_e определяется его комптоновской длиной (геометрией ленты циркуляции).

- Боровский радиус a_0 — это проекция этой ленты на сферическую оболочку атома.

- Коэффициент проекции равен 4α, где α — геометрический коэффициент решётки.

Связь с классической формулой

В ТАО:

$$a_0 = \frac{R_e}{4\alpha} = \frac{2\lambda_C}{4\pi\alpha} = \frac{\lambda_C}{2\pi\alpha}$$

Подставляем $\lambda_C = h/m_e c$:

$$a_0 = \frac{h}{2\pi\alpha m_e c} = \frac{\hbar}{\alpha m_e c}$$

Это точная формула для боровского радиуса в стандартной физике!

$$a_0 = \frac{\hbar}{\alpha m_e c} = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_e e^2}$$

То есть ТАО воспроизводит классическую формулу, но даёт ей геометрическую интерпретацию: боровский радиус — это проекция реального радиуса ленты электрона R_e на сферу через коэффициент 4α.

Что такое боровский радиус в итоге

У Бора (1913):

- Радиус первой разрешённой орбиты электрона.
- Электрон буквально движется по этой орбите.
- Это реальный физический размер атома.

В КМ (сейчас):

- Наиболее вероятное расстояние от ядра до электрона.
- Электрон — облако вероятности.
- Это характерный масштаб атома, но не граница.

В ТАО:

- Радиус микротора электрона.
- Это граница между зоной G_e (электромагнетизм) и зоной G (классическая гравитация).
- Формула: $a_0 = R_e/(4\alpha)$.

Все три дают одно и то же число:

$$\boldsymbol{a_0 \approx 5.29\times10^{-11}\ \text{м}}$$

Подчасть 14.5. Итоги

Кто	Что сделал	Формула	Статус
Бальмер	Эмпирически угадал формулу для видимых линий.	$\lambda = h \cdot n^2/(n^2-4)$	Эмпирика
Ридберг	Обобщил на все серии. Определил R численно.	$1/\lambda = R(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$	Эмпирика
Бор	Вывел R и a_0 из постулатов.	$a_0=\hbar^2/(m_e ke^2)$	Теория (постулаты)
Зоммерфельд	Обнаружил αα, управляющую тонкой структурой.	$\alpha = ke^2/\hbar c$	Полуклассика
Дирак	Вывел тонкую структуру и спин из уравнения.	$(i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc)\psi = 0$	Квантовая теория
Фейнман	Назвал α «проклятием физиков».	—	Констатация
ТАО	Вывела α из первых принципов.	$\alpha=(\varepsilon_0/\varepsilon_1)^{1/36}$	Онтология

Финальная мысль:

Сдвоенные линии — это не причина α. Это следствие. α — это константа соотношения масштабов взаимодействий. ТАО проясняет то, что Фейнман называл проклятием.

Есть одна вещь, которую стоит помнить.

α — это не просто «коэффициент». Это — зеркало Вселенной.

Она показывает:

- Насколько силён электромагнетизм.
- Насколько плотен вакуум.
- Насколько «тяжела» материя.
- Насколько «упруго» пространство.

Измените α — и Вселенная станет другой. Не будет атомов. Не будет химии. Не будет жизни.

α = 1/137 — это не случайность. Это — настройка.

И ТАО показывает, откуда эта настройка берётся.

Часть 15. Динамика электрона – образование атома водорода.

15.1. Свободный электрон (вдали от протона)

Электрон — это замкнутая спираль, свёрнутая в кольцо. Она не имеет «начала» и «конца». Это замкнутая волна, циркулирующая сама по себе.

Параметры:

- Длина цепочки: $L = 4\lambda_C = 9.7\times10^{-12}$ м (фиксирована).
- Радиус кольца (если свернуть): $r_e \approx 1.54\times10^{-12}$ м.
- Спин: ($h/2$, ½).
- Заряд: есть (внешний шлейф).
- Энергия: $E = m_e c^2 = 511$ кэВ (вся цепочка замкнута, энергия минимальна).

Состояние:
Электрон не взаимодействует с протоном. Его лента замкнута, циркуляция идёт по восьмёрке. Он свободен.

15.2. Сближение с протоном (формирование атома)

Когда электрон подлетает к протону, на боровском радиусе происходит разрыв спирали.

Протон — это узел из трёх спиралей (u, u, d). Он создаёт вокруг себя гравитационную яму — область сжатия пиксельной решётки. Эта яма притягивает ленту электрона. В момент сближения замкнутая восьмёрка электрона разрывается в одной точке. Два конца этой ленты «ныряют вглубь» к протону и прикрепляются ик его узлу.

Эти два конца и есть пуповина.

- Пуповина — это общая часть циркуляции. Активные пиксели бегают по ней, принадлежа одновременно и электрону, и протону.

- Длина пуповины — это расстояние от поверхности электронного кольца до центра протона.

- Энергия связи — это энергия пуповины. Она в основном состоянии и равна 13.6 эВ.

15.3. Основное состояние (S-орбиталь)

После разрыва и прикрепления концов, оставшаяся часть ленты опоясывает протон как ровное кольцо (тор). Это S-состояние.

- Форма: ровное кольцо. Нет узлов (складок).

- Пуповина: максимальна. Два конца тянутся от кольца к протону. Натяжение максимально → энергия связи = 13.6 эВ.

- Энергия атома: минимальна ($E = -13.6$ эВ).

- Где находится электрон: его лента распределена по сфере (усреднённо), но геометрически — это кольцо, лежащее в одной плоскости.

15.4. Поглощение фотона (возбуждение)

Теперь атом находится в основном состоянии (S). Мы облучаем его фотоном с энергией, равной разнице между S и P (или более высокими уровнями). Фотон поглощается лентой. Его энергия не добавляет электрону «скорость» и не увеличивает его массу покоя. Она изменяет форму ленты.

- Лента получает энергию → она изгибается.

- В кольце появляется одна складка (узел). Кольцо перестаёт быть ровным — становится гантелеобразным (P-состояние).

Когда лента изгибается и становится гантелью:

1. Одна сторона циркуляции (та, что обращена к протону) приближается к протону.
   → Пуповина с этой стороны укорачивается.
   → Натяжение пуповины уменьшается.
2. Другая сторона циркуляции (противоположная) вытягивается и удаляется от протона.
   → Лента растягивается в этом направлении.
   → Возникает дополнительный изгиб.

Итог:
Пуповина (энергия связи) уменьшается, потому что одна часть ленты подошла ближе к протону. Электрон не удаляется от протона в целом — он растягивается. Один его конец приближается, другой — отдаляется.

P-состояние (первое возбуждение)

- Форма: кольцо с одним узлом (гантель).

- Пуповина: укоротилась (энергия связи стала меньше, чем 13.6 эВ).

- Энергия атома: увеличилась (электрон поглотил фотон, общая энергия атома выросла).

- Где находится электрон: его лента теперь вытянута — одна часть ближе к протону, другая — дальше.

Дальнейшее возбуждение (D, F и т.д.)

При поглощении следующих фотонов:

- Второй фотон → лента получает ещё больше энергии → появляется второй узел (D-состояние).

- Третий фотон → появляется третий узел (F-состояние).

Каждый раз:

- Число узлов (складок) увеличивается на 1.

- Лента становится всё более изогнутой.

- Одна сторона циркуляции подходит к протону всё ближе (пуповина укорачивается).

- Другая сторона отдаляется всё дальше (лента растягивается).

- Энергия связи (пуповина) уменьшается.

- Общая энергия атома растёт (поглощённые фотоны добавляют энергию).

15. 5. Излучение фотона (возврат к основному состоянию)

Когда атом излучает фотон, процесс идёт в обратном направлении:

- Лента теряет энергию → один узел исчезает.

- Изогнутая часть ленты распрямляется.

- Та сторона, которая приближалась к протону, отодвигается обратно.

- Пуповина удлиняется (энергия связи растёт).

- Атом возвращается на более низкий уровень (S).

15.6. Ионизация (разрыв пуповины)

Если продолжать облучать атом всё более энергичными фотонами, наступает момент, когда пуповина становится равной нулю.

Это значит:
- Два конца ленты больше не тянутся к протону. Они оторвались.

- Лента снова замыкается — электрон становится свободным (восьмёрка).

- Атом распадается на свободный протон и свободный электрон.

Энергия ионизации = 13.6 эВ (ровно столько же, сколько выделилось при образовании атома). Это закон сохранения энергии.

15.7. Итоговая таблица состояний

Состояние	Форма ленты	Число узлов	Пуповина	Энергия связи	Энергия атома
Свободный	Замкнутое кольцо	0	Нет	0	$m_e c^2$
S (n=1)	Ровное кольцо	0	Максимальна	13.6 эВ	-13.6 эВ
P (n=2)	Кольцо с 1 узлом	1	Укорочена	< 13.6 эВ	-3.4 эВ
D (n=3)	Кольцо с 2 узлами	2	Ещё короче	< 3.4 эВ	-1.51 эВ
F (n=4)	Кольцо с 3 узлами	3	Минимальна	< 1.51 эВ	-0.85 эВ
Ионизация	Разрыв пуповины → кольцо	0	0	0	0 (свободный)

15.8. Правила отбора (лестница переходов)

Переходы между уровнями возможны только по одной ступеньке:

$S \leftrightarrow P \leftrightarrow D \leftrightarrow F$

Потому что лента не может разорваться. Она может только изгибаться и распрямляться, меняя число узлов на ±1 за раз.

- Запрещено: S → D (0 → 2 узла) — нужно разорвать ленту.

- Разрешено: S → P (0 → 1 узел) — лента просто изгибается.

15.9. Теперь проведём ещё один сравнительный численный расчёт.

Когда свободный электрон приближается к протону, его лента разрывается в одной точке и опоясывает протон как кольцо.

Процесс:

1. Протон создаёт гравитационную яму.
2. Электрон «втягивается» в эту яму.
3. Его лента разрывается.
4. Два конца ленты соединяются с протоном.
5. Возникает пуповина — общая циркуляция электрона и протона.
6. Оставшаяся часть ленты образует кольцо вокруг протона.

Это кольцо и есть S-орбиталь.

Где находится это кольцо

В ТАО кольцо электрона не размазано по всей сфере боровского радиуса. Оно находится на вполне конкретном радиусе, определяемом геометрией ленты и взаимодействием с протоном.

Радиус кольца электрона в атоме:

$$r_{e,\text{атом}} = r_{e,\text{кольца}} = \frac{2\lambda_{C,e}}{\pi} \approx 1.54 \times 10^{-12}\,\text{м}$$

Боровский радиус:

$a_0 = 5.29\times10^{-11}$м

Отношение:

$$\frac{a_0}{r_{e,\text{атом}}} = \frac{5.29 \times 10^{-11}}{1.54 \times 10^{-12}} \approx 34.3$$

Вывод:
Реальное кольцо электрона в атоме водорода находится в ~34 раза ближе к протону, чем боровский радиус.

Боровский радиус — это не размер электрона. Это — проекция, а не реальное положение ленты.

Длина окружности кольца электрона

$L_{e,\text{окр}} = 2\pi r_{e,\text{атом}} = 2\pi\cdot1.54\times10^{-12} = 9.70\times10^{-12}$м

Это — ровно длина ленты электрона.

Длина окружности протона

Радиус протона: $r_p \approx 0.84 \times 10^{-15}$м.

Длина окружности протона:

$L_{p,\text{окр}} = 2\pi r_p = 2\pi \cdot 0.84 \times 10^{-15} \approx 5.28 \times 10^{-15}$м

Сравнение

$$\frac{L_{e,\text{окр}}}{L_{p,\text{окр}}} = \frac{9.70 \times 10^{-12}}{5.28 \times 10^{-15}} \approx 1836$$

То есть длина окружности электрона в 1836 раз больше длины окружности протона.

Это ровно отношение масс протона и электрона!

15.10. Число, которое нельзя подогнать

1836.15 — это отношение массы протона к массе электрона.

В стандартной физике это число — экспериментальный факт. Его нельзя вывести из теории. Оно просто есть.

Радиус протона — это не теоретическая величина, а экспериментально измеренный параметр.

Методы измерения:

1. Электронное рассеяние — электроны разгоняются и рассеиваются на протонах. По углу рассеяния определяют распределение заряда.
2. Спектроскопия атома водорода — лэмбовский сдвиг зависит от размера протона.
3. Мюонный водород — мюон в 200 раз тяжелее электрона, поэтому он ближе к протону и чувствительнее к его размеру.

Результат:

$r_p = 0.84 \times 10^{-15}$м = 0.84фм

Это число получено из эксперимента. Его нельзя «подогнать» под теорию.

Физики принимают его как данность. Физики не говорят: «Давайте сделаем модели так, чтобы получилось 1836.15». Они говорят: «Мы измерили это число с точностью до 10 знаков после запятой.

Любая теория, претендующая на описание реальности, должна воспроизводить его.

Именно это и воспроизводит ТАО, как геометрическое соответствие.

Часть 16. Свободный электрон.

16.1. В КМ:

- Электрон — это не объект, а волновая функция $\Psi(r, t)$.

- Это плоская волна, размазанная по всему пространству.

- У него нет размера, нет структуры, нет внутренней динамики.

- Он не локализован — вероятность найти его в любой точке одинакова.

Математика:

$$\Psi(r,t) = A^{ei(\mathrm{k}*\mathrm{r}-\omega t)}$$

- k — волновой вектор (направление движения).

- ω — частота.

- $E = \hbar\omega$, $p = \hbar k$.

Физический смысл в КМ:

- физического смысла нет, это волна вероятности, что именно колеблется — неизвестно.

-электрон нигде и везде одновременно, пока не измерен.

Статус в КМ:

- Математическая абстракция, которая даёт правильные вероятности.

16.2. В ТАО:

- Электрон — это реальный физический объект: замкнутая спираль.

- Это цепочка активных пикселей, свёрнутая в кольцо.

- У него есть реальные размеры:

  - Длина ленты: $L = 4\lambda_C \approx 9.7 \times 10^{-12}$ м.

  - Радиус кольца:

$$r_e = \frac{2\lambda_C}{\pi} \approx 1.54 \times 10^{-12} \text{ м.}$$

- У него есть внутренняя динамика: циркуляция активных пикселей по ленте.

- У него есть спин (циркуляция-вращение) и заряд (поток пикселей).

- Он локализован и движется как целое по пиксельной решётке.

Движение:

- Центр масс ленты движется не по прямой, а по синусоидальной траектории.

- Это реальная траектория, а не «волна вероятности».

Статус в ТАО:

- Объективная реальность. Электрон существует независимо от наблюдения.

16.3. Сравнительная таблица

	КМ	**ТАО**
Что такое электрон?	Волновая функция (вероятность)	Замкнутая спираль (восьмёрка)
Имеет ли размер?	Нет (точечный)	Да ($\lambda_C \sim 10^{-12}$ м)

	КМ	ТАО
Имеет ли структуру?	Нет	Да (цепочка пикселей)
Локализован?	Нет (размазан по пространству)	Да (компактный паттерн)
Внутренняя динамика?	Нет	Да (циркуляция)
Что такое движение?	Изменение фазы волны	Переключение пикселей по синусоиде
Статус	Абстракция	Объективная реальность

Часть 17. Волна Де Бройля, Дрожание и Аномальный магнитный момент.

17.1. Три явления, которые Квантовая механика описывает, но не понимает.

Современная КМ — это феноменальная вычислительная машина. Она предсказывает результаты экспериментов с точностью до 12 знаков после запятой. Но она не отвечает на главный вопрос: что именно происходит на самом деле?

Три явления особенно ярко демонстрируют этот разрыв:

1. **Волна де Бройля.** Луи де Бройль в 1924 году постулировал: любой частице с импульсом p соответствует волна с длиной $\lambda=h/p$. Почему? Никто не знает. Это постулат. В КМ это «волна вероятности», но что именно колеблется — не объясняется.
2. **Дрожание (Zitterbewegung).** Эрвин Шрёдингер в 1930 году, анализируя уравнение Дирака, обнаружил, что электрон должен «дрожать» с частотой порядка 10^{20} Гц и амплитудой

порядка 10^{-13} м. Почему? В КМ это «интерференция состояний с положительной и отрицательной энергиями». Но что это физически — не объясняется.

3. **Аномальный магнитный момент.** Эксперимент показывает, что магнитный момент электрона чуть больше магнетона Бора: $g \approx 2.0023$ вместо ровно 2. Отклонение: $a = (g - 2)/2 \approx 0.00116$. В КМ это «радиационная поправка», вычисляемая через диаграммы Фейнмана. Но почему именно 0.00116 — не объясняется.

Теория Абсолютной Относительности (ТАО) даёт ответ на все три вопроса.

В ТАО:

- Волна де Бройля — это реальный пространственный шаг зигзага центра масс частицы в ортогональной пиксельной решётке.

- Дрожание — это реальное поперечное колебание центра масс, вызванное той же ортогональностью.

- Аномальный магнитный момент — это геометрическое следствие взаимодействия дрожания с дискретной решёткой.

Все три явления связаны единой геометрией. И все три выводятся из одной аксиомы: пространство — это трёхмерная кубическая решётка из пикселей.

17.2. Фундамент: пиксельная решётка и паттерны

В ТАО пространство представляет собой трёхмерную кубическую решётку с шагом, равным планковской длине:

$l_P = 1.616255 \times 10^{-35}$ м

Время дискретно с шагом, равным планковскому времени:

$t_P = 5.391247 \times 10^{-44}$ с

Отношение этих величин задаёт скорость света:

$c = l_P/t_P = 2.998 \times 10^8$ м/с

Ключевое свойство решётки: ортогональность.

Решётка ортогональна. Это означает, что существует три выделенных направления: X, Y, Z. Любое движение в решётке — это последовательное переключение пикселей вдоль этих осей. Между осями нет «промежуточных» направлений. Движение возможно только как зигзаг — последовательность шагов по X, затем по Y, затем снова по X, и так далее, потому что любой паттерн - это миллиарды пикселей, выстроенные в 3d объёме.

Цитата из главы «Ортогональность» (Цифровая Онтология):

«Представим, что фотон — это спиралевидный паттерн, состоящий из миллионов пикселей... Чтобы двигаться под малым углом к оси X, паттерн делает 100 шагов по X и 1 шаг по Y. За 101 такт он сместился на (100, 1)... Чем больше пикселей в паттерне, тем точнее можно задать направление. Под малым углом движение выглядит почти прямой, но на микроуровне — это ступеньки».

Это — ключевой момент: любое движение в ортогональной решётке не может быть идеально прямым. Оно всегда — ломаная линия (зигзаг). Это создаёт реальное дрожание центра масс.

17.3. Состояния пикселя

Каждый пиксель может находиться в одном из двух состояний:

- 0 — нулевой пиксель (вакуум, пространство).
- 1 — активный пиксель (материя, энергия).

Энергия активного пикселя:

$\varepsilon_1 \approx 1.41 \times 10^{-37}$ Дж

Энергия нулевого пикселя:

$\varepsilon_0 \approx 2.24 \times 10^{-114}$ Дж

Паттерн — это устойчивая цепочка активных пикселей. Паттерны бывают двух типов:

1. Разомкнутые — фотон. Это линейная цепочка активных пикселей, которая летит через решётку.
2. Замкнутые — электрон, протон, другие частицы. Это замкнутая цепочка активных пикселей, образующая кольцо.

Параметры электрона:

Комптоновская длина волны:

$$\lambda_C = \frac{h}{m_e c} = 2.426310 \times 10^{-12} \text{ м}$$

Длина цепочки:

$L_e = 4\lambda_C = 9.705240 \times 10^{-12}$ м

Радиус кольца:

$R_e = 2\lambda C / \pi = 1.544652 \times 10^{-12}$ м

Число активных пикселей в кольце:

$$N_e = \frac{L_e}{l_P} = \frac{9.705240 \times 10^{-12}}{1.616255 \times 10^{-35}} = 6.0048 \times 10^{23}$$

Энергия покоя электрона:

$E_e = m_e c^2 = 8.187106 \times 10^{-14}$ Дж

Внутренняя циркуляция

Активные пиксели циркулируют по кольцу. Скорость циркуляции:

$$v_{\text{цирк}} = c$$

За один такт t_P каждый пиксель переключается в соседний пиксель решётки. Полный оборот по кольцу занимает время:

$$T_{\text{цирк}} = \frac{L_e}{c} = \frac{9.705240 \times 10^{-12}}{2.99792458 \times 10^8} = 3.2373 \times 10^{-20} \text{ с}$$

Частота полного оборота:

$$\nu_{\text{цирк}} = \frac{1}{T_{\text{цирк}}} = \frac{c}{L_e} = \frac{2.99792458 \times 10^8}{9.705240 \times 10^{-12}} = 3.089 \times 10^{19}\ \text{Гц}$$

Частота одного периода (одной комптоновской длины):

$$\nu_e = \frac{c}{\lambda_C} = \frac{2.99792458 \times 10^8}{2.426310 \times 10^{-12}} = 1.2356 \times 10^{20}\ \text{Гц}$$

17.4. Волна Де Бройля.

Центр масс замкнутого паттерна не может двигаться прямолинейно, так как решётка ортогональна. Чтобы центр масс сместился на вектор, не совпадающий с осями, паттерн должен сделать *m* шагов по оси X, затем *n* шагов по оси Y, затем снова *m* шагов по X. Траектория центра масс — ломаная линия (зигзаг).

Геометрия зигзага

За один цикл зигзага (*m* шагов по X + *n* шагов по Y) центр масс смещается:

Вдоль X: $\Delta x = m \cdot l_P$

Вдоль Y: $\Delta y = n \cdot l_P$

Полное смещение: $\Delta s = l_P\,(m^2 + n^2)^{1/2}$

Время цикла: $\Delta t = (m+n)t_P$

Средняя скорость:

$$v = c \cdot \frac{\sqrt{m^2 + n^2}}{m + n}$$

Длина волны де Бройля

$\lambda_{dB} = l_P \cdot (m^2+n^2)^{1/2}$

Импульс:

$$p = m_e v = m_e c \cdot \frac{\sqrt{m^2 + n^2}}{m + n}$$

Квант действия:

$$S_{\text{шаг}} = p \cdot \lambda_{dB} = h$$

Отсюда:

$$\lambda_{dB} = h/p$$

Учёт скорости Земли

На Земле все паттерны движутся со скоростью $v_\oplus = 3.7 \times 10^5$ м/с.

Для электрона «в покое»:

$$\lambda_{dB} = \frac{h}{m_e v_\oplus} = \frac{6.62607015 \times 10^{-34}}{9.1093837 \times 10^{-31} \times 3.7 \times 10^5} = 1.966 \times 10^{-9} \text{ м} = 1.966 \text{ нм}$$

17.5 Дрожание (ZITTERBEWEGUNG)

Центр масс паттерна движется зигзагом. Зигзаг есть периодическое колебание центра масс поперёк направления движения. Это и есть дрожание.

За один полный цикл зигзага центр масс испытывает два поперечных колебания. Частота:

$$\nu_Z = \frac{2 m_e c^2}{h} = 2.471 \times 10^{20} \text{ Гц}$$

Амплитуда дрожания

Из условия $v_Z^{max} = c$:

$$A_Z = \frac{c}{2\pi \nu_Z} = \frac{\hbar}{2 m_e c} = 1.931 \times 10^{-13} \text{ м}$$

Скорости дрожания

Максимальная поперечная скорость:

$v_Z^{max} = 2\pi \nu_Z A_Z = c$

Средняя поперечная скорость:

$v_Z^{\text{ср}} = 2c/\pi = 0.6366c$

Полная скорость центра масс

$$v_{\text{полн}} = \sqrt{v^2 + (v_Z^{\text{ср}})^2}$$

На Земле $v_{\text{полн}} = 1.908 \times 10^8$ м/с.

17.6. Аномальный магнитный момент

Эксперимент: измерение $g - 2$ для электрона.

$a_{\text{эксп}} = 0.00115965218073(28)$

Расчёт в ТАО:

$$a = \frac{\alpha}{2\pi} = \frac{7.2973525693 \times 10^{-3}}{2\pi} = 1.1614097 \times 10^{-3}$$

Разница:

$$\frac{a_{\text{эксп}} - a_{\text{ТАО}}}{a_{\text{эксп}}} = \frac{0.00115965 - 0.00116141}{0.00115965} = -0.0015$$

Разница 0.15%. Это связано с тем, что мы используем первый порядок теории возмущений. В КЭД есть высшие порядки:

$$a = \frac{\alpha}{2\pi} - 0.328\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^2 + \dots$$

В ТАО: высшие порядки соответствуют высшим гармоникам дрожания. Если учесть их, совпадение будет точным.

Часть 18. Онтология: что стоит за формулами.

18.1 Квантовая механика даёт формулы.

Она вычисляет числа. Но она не объясняет, что стоит за этими формулами.

Что говорит КМ про аномальный магнитный момент:

«Это радиационная поправка. Электрон взаимодействует с виртуальными фотонами. Виртуальные фотоны создают дополнительные петли в диаграммах Фейнмана. Эти петли дают вклад в магнитный момент».

Что это значит физически?

Ничего. Это — математическое описание. «Виртуальные фотоны» — это не частицы. Это — математические объекты в диаграммах. «Петли» — это не физические процессы. Это — графические обозначения интегралов. «Радиационная поправка» — это не излучение. Это — название для числа.

КМ не объясняет:

- Что именно «излучается».
- Почему поправка пропорциональна α.
- Почему коэффициент $1/(2\pi)$.
- Что физически «дрожит».

ТАО: формулы с онтологией

ТАО даёт формулам онтологию. Она объясняет, что стоит за каждой формулой.

18.2. Что говорит ТАО про аномальный магнитный момент:

«Электрон — это замкнутое спиральное кольцо. Кольцо циркулирует в ортогональной решётке. Центр масс кольца движется зигзагом. Зигзаг создаёт поперечное колебание — дрожание. Дрожание создаёт дополнительный микроток. Дополнительный микроток создаёт дополнительный магнитный момент. Дополнительный момент пропорционален постоянной тонкой структуры, потому что α — это геометрическое отношение радиуса кольца к боровскому радиусу».

Что это значит физически:

Всё. Это — реальный физический процесс. Это — геометрия. Это — онтология.

ТАО объясняет:

- Что дрожит: центр масс спирального кольца.

- Почему дрожит: из-за ортогональности решётки.

- Почему частота $2m_ec^2/h$: потому что за один цикл зигзага происходит два поперечных колебания.

- Почему амплитуда $\hbar/(2m_ec)$: из условия $v_Z^{max} = c$.

- Почему поправка $\alpha/(2\pi)$: потому что α — геометрическое отношение, а 2π — полный оборот.

Сравнение: КМ , ТАО

Аспект	**КМ**	**ТАО**
Волна де Бройля	Волна вероятности. Постулат	Шаг зигзага центра масс. Геометрия
Дрожание	Интерференция частица/античастица. Артефакт уравнения Дирака	Поперечное колебание центра масс. Геометрия
Аномальная поправка	Радиационная поправка. Петли Фейнмана	Взаимодействие дрожания с решёткой. Геометрия
Что стоит за формулами	Ничего. Математика	Геометрия. Онтология

18.3. Почему «радиационные поправки»

Термин «радиационная поправка» — это не название физического процесса. Это — название для числа. Что такое «радиация»? Излучение. Что излучается? Фотоны. Откуда? Из электрона. Почему? Потому что электрон ускоряется. Где? В виртуальных процессах.

Но это — бессмыслица.

- Виртуальные процессы — это не физические процессы. Это — математические объекты.

- Виртуальные фотоны — это не фотоны. Это — математические члены в интегралах.

- Радиационные поправки — это не поправки к излучению. Это — числа в формуле.

ТАО говорит:

Нет никаких «радиационных поправок». Есть геометрия дрожания. Дрожание создаёт дополнительный микроток. Микроток создаёт дополнительный магнитный момент. Дополнительный момент пропорционален α. Всё.

Это — не «радиационная поправка». Это — геометрическое следствие движения замкнутого кольца в ортогональной решётке.

Название «радиационная поправка» — это попытка объяснить геометрию через метафору излучения. Но за метафорой нет физики. Есть только математика.

ТАО даёт физику. ТАО даёт онтологию. ТАО даёт понимание.

Дрожание электрона создаёт микроток. Микроток создаёт магнитный момент. Отношение дополнительного момента к основному:

$$\frac{\Delta\mu}{\mu_B} = \frac{\alpha}{2\pi}$$

Почему α?

Потому что α — это отношение радиуса кольца к боровскому радиусу:

$$\alpha = \frac{R_e}{4a_0}$$

Где R_e — радиус кольца электрона, a_0 — боровский радиус.

Почему $1/(2\pi)$?

Потому что дрожание — это круговое движение. Полный оборот — 2π радиан. Коэффициент $1/(2\pi)$ — геометрический фактор.

Это — онтологическая причина. Это — геометрия. Это — не «радиация». Это — не «виртуальные частицы». Это — реальное движение замкнутого кольца в ортогональной решётке.

Полная онтологическая цепочка аномального магнитного момента:

1. Пространство — ортогональная пиксельная решётка.
2. Электрон — замкнутое спиральное кольцо.
3. Кольцо циркулирует в решётке.
4. Центр масс кольца движется зигзагом (из-за ортогональности).
5. Зигзаг создаёт поперечное колебание (дрожание).
6. Дрожание создаёт дополнительный микроток.
7. Микроток создаёт дополнительный магнитный момент.
8. Дополнительный момент пропорционален $\alpha/(2\pi)$.
9. Полный магнитный момент: $\mu_e = \mu_B(1+\alpha/(2\pi))$.

Формулы КМ и ТАО для волны де Бройля, дрожания и аномального магнитного момента совпадают.

Но!

КМ: формулы без онтологии. «Волна вероятности». «Виртуальные частицы». «Радиационные поправки». «Петли Фейнмана».

ТАО: формулы с онтологией. Шаг зигзага. Поперечное колебание. Взаимодействие дрожания с решёткой. Геометрия.

Глава 10. Протон

Часть 1. В стандартной физике

1.1. Протон — это «связанное состояние трёх кварков (uud)», удерживаемое глюонами через сильное взаимодействие.
Это математическое описание, которое даёт правильные цифры, но не объясняет, *почему* протон имеет именно такие свойства: массу 938 МэВ, заряд +1, спин ½, размер ~0.84 фм, и почему он стабилен.

Мы дадим полное онтологическое описание протона, от минимального элемента (пиксель) до его места в иерархии материи.

1.2. Ключевые принципы.

В ТАО протон — это не «набор частиц». Это единая, самосогласованная топологическая и гравитационная структура, выводимая из пиксельной решётки и спиралей кварков.

Гравитация — это деформация пиксельной решётки, создаваемая локальной концентрацией активных пикселей.
Масса — это общее количество активных пикселей в паттерне.

Траектория циркуляции — это спираль: универсальная топология фермионов. Это замкнутое кольцо.

Свойства:

- Спин ½: численно равен электрону (момент инерции равен половине значения для фотона).

- Универсальность: все фермионы (электрон, кварки, протон, нейтрон) имеют эту топологию.

Параметры ленты:

- Длина → определяет массу (энергию циркуляции).

- Ширина → универсальна, обеспечивает одинаковый заряд.

- Толщина → планковская длина l_P.

- Ориентация оси закрутки → определяет «цвет» кварка.

Часть 2. Кварк – это элементарная частица протона.

2.1. Определение кварка в ТАО

Кварк — это спираль циркуляции, свёрнутая в компактный узел и ориентированная вдоль одной из трёх осей кубической решётки.

2.2. Топологические параметры кварка

Параметр	Значение	Обоснование
Ориентация оси закрутки	X, Y или Z («цвет»)	Определяет «цвет» кварка
Длина ленты	$\lambda_{C(\text{кварка})} \propto 1/m_{\text{кварка}}$	Чем короче лента, тем больше масса
Ширина ленты	Определяется из амплитуды спирали	Обеспечивает универсальный заряд
Толщина ленты	l_P (планковская длина)	Минимальный размер решётки

2.3. «Цвет» как ориентация в решётке

В ТАО «цвет» кварка — это не свойство, а ориентация оси полуоборота ленты циркуляции относительно трёх осей кубической решётки:

Ориентация	Условный «цвет»
X	Красный
Y	Зелёный
Z	Синий

Анти-цвет — это та же ориентация, но с противоположным направлением обхода ленты (зеркальное отражение).

Обоснование: Трёхмерная решётка имеет ровно три независимые оси, что соответствует трём цветам в КХД.

2.4. Заряд протона

В ТАО заряд — это поток активных пикселей через поперечное сечение спирали.

Мы уже установили:

- Минимальный заряд = один активный пиксель за один такт.

- Электрон — это спираль, в поперечном сечении которой всегда ровно один пиксель.

- Поэтому заряд электрона = 1 (в единицах e).

Заряд не может быть дробным, потому что:

- Пиксель — это минимальная единица.

- Поток пикселей через сечение — это целое число пикселей за такт.

- Не бывает «половины пикселя» или «трети пикселя».

Дробный заряд в стандартной модели — это математический артефакт, введённый для того, чтобы суммарный заряд протона и нейтрона сходился.

В ТАО протон — это узел из трёх спиралей (u, u, d).

У этого уза есть внешний шлейф — циркуляция активных пикселей вокруг узла. Именно этот шлейф и участвует во взаимодействии с другими частицами, образуя общую внешнюю циркуляцию.

Но! Внешний шлейф — это не отдельный «заряд».
Это продолжение циркуляции самого узла.

Заряд протона равен заряду электрона, потому что в обоих случаях через поперечное сечение проходит ровно один активный пиксель за такт. Разница только в направлении циркуляции (знак заряда).

Дробных зарядов у кварков нет. Дробные заряды — это математическая подгонка стандартной модели, введённая для того, чтобы сумма зарядов кварков давала заряд протона и нейтрона. Никакого экспериментального наблюдения дробного заряда у свободного кварка никогда не было.
В ТАО заряд кварка — это не самостоятельная величина, а вклад в общий поток, который всегда даёт целое число пикселей.

Таблица

Частица	**Структура**	**Внешний поток пикселей**	**Заряд (в *e*)**
Электрон	Одна лента Мёбиуса	1 пиксель/такт	**−1**
Протон	Узел из трёх лент (u, u, d)	Суммарный поток = 1 пиксель/такт	**+1**
Нейтрон	Узел из трёх лент (u, d, d)	Скомпенсированный поток = 0	**0**
Кварк (отдельно)	Не существует свободно	Не определён	**Не наблюдаем**

В Стандартной модели это прошло, потому что:

1. Свободных кварков не существует (конфайнмент).
2. Никто никогда не измерял заряд отдельного кварка.
3. Дробные заряды были введены чисто математически, чтобы сумма сходилась.
4. Это стало «стандартом» просто потому, что так удобно считать.

Часть 3. Масса протона: от подгонки к геометрии

3.1. Как стандартная модель «потеряла» 99% массы, и что на самом деле скрывается за «глюонным полем»

В стандартной модели физики элементарных частиц масса протона (938 МэВ/c²) на 99% объясняется «энергией связи глюонного поля», тогда как массы трёх кварков (u, u, d) дают лишь ~1% (около 9 МэВ/c²). Это одно из самых удивительных и одновременно самых слабых мест современной физики: никто никогда не измерял массу кварка напрямую, а «глюонное поле» — это математическая структура, введённая для объяснения дефицита массы.

1. **Кварк — это не точка, а спираль (лента) циркуляции** — огромная цепочка активных пикселей, свёрнутая в компактный узел.
2. **Зонд никогда не достигает самой ленты** — он взаимодействует только с её внешним шлейфом, который составляет ничтожную часть массы.
3. **«Глюонное поле» — это не физическая сущность, а название для того, что стандартная модель не может объяснить**.
4. **Масса протона — это просто большее количество активных пикселей**, упакованных в складчатую структуру трёх лент циркуляции.

3.2. Проблема массы протона

Протон — это одна из самых изученных частиц в физике. Его масса известна с фантастической точностью:

$m_p = 938.272 МэВ/c^2$

Это экспериментальный факт. Его можно измерить, взвесить, проверить.

Но когда физики задали вопрос: *«Из чего состоит эта масса?»* — они столкнулись с загадкой.

Согласно квантовой хромодинамике (КХД), протон состоит из трёх кварков: u, u, d. Массы этих кварков, извлечённые из косвенных данных, составляют:

- u-кварк: ~ 2.16 МэВ/c²

- d-кварк: ~ 4.67 МэВ/c²

Сумма:

$2.16+2.16+4.67 \approx 8.99 МэВ/c^2$

Это около 1% от массы протона.

Остальные 929 МэВ (99%) физики назвали «энергией связи глюонного поля».

Но что это такое на самом деле? Где находится эта энергия? Как она «держит» кварки? И почему мы не можем её увидеть?

Ответы на эти вопросы стандартная модель даёт только в виде математических уравнений, но не в виде физической картины.

3.4. «Глюонное поле»

Когда физики поняли, что сумма масс кварков не сходится с массой протона, они оказались перед выбором:

1. Признать, что их модель неполна.
2. Ввести новую сущность, которая «добавит» недостающую массу.

Они выбрали второе. Так появилось глюонное поле — математический объект, который:

- Не имеет массы покоя.

- Не наблюдается напрямую.

- «Переносит» сильное взаимодействие.

- «Даёт» 99% массы протона.

Но что это за поле?
В КХД глюоны — это безмассовые частицы-переносчики. Их «энергия связи» — это не масса в привычном смысле, а энергия, запасённая в поле. Однако это не физическое объяснение.
Это математическое описание.

3.5. Аналогия с магнитом

Представте магнит. Он создаёт магнитное поле вокруг себя.

- Сам магнит имеет массу.

- Его поле — это не масса. Это влияние на окружающее пространство.

Теперь представьте, что кто-то говорит: *«Масса магнита на 99% состоит из энергии его магнитного поля»*. Это было бы абсурдно. Поле — это не масса. Это свойство массы. Но именно это и сделали с протоном. Они назвали «энергией связи» то, что на самом деле является реакцией среды на массу, а не самой массой.

Часть 4. Что говорит ТАО

4.1. Кварк — это не точка, а лента циркуляции

В ТАО кварк — это лента циркуляции — замкнутая поверхность, состоящая из цепочки активных пикселей.

- Длина ленты определяет массу кварка.

- Ширина ленты определяет его заряд.

- Ориентация ленты определяет его «цвет» (красный, зелёный, синий).

Важнейшее свойство:
Кварки имеют внешний шлейф — циркуляцию активных пикселей вокруг себя. Это то, с чем взаимодействуют зонды (фотоны, электроны).

Но сам зонд никогда не достигает самого внутреннего шлейфа. Он всегда «натыкается» только на внешний шлейф. Внутренний шлейф «сидит» в глубокой гравитационной яме.

4.2. Почему зонд не может измерить массу кварка

Зонд — это любая частица, которой мы «щупаем» кварк: фотон, электрон, другая частица.

Зонд взаимодействует только с внешним шлейфом кварка.

Почему?

Потому что внешний шлейф — это единственная часть кварка, которая «выставлена наружу». Внутренняя часть ленты (складки, переплетения) скрыта внутри узла.

Аналогия с айсбергом:

- Над водой — маленькая часть (внешний шлейф). Её видно. Её можно измерить.

- Под водой — огромная часть (внутренние складки ленты). Её не видно. Её нельзя измерить снаружи.

Зонд — это корабль, который может измерить только надводную часть. Он не может нырнуть под воду и увидеть всю массу айсберга. Поэтому измеренная масса кварка (2–5 МэВ) — это масса внешнего шлейфа, а не всего кварка.

4.3. Что происходит в протоне

В протоне три ленты циркуляции (u, u, d) переплетены в узел.

- У каждой ленты есть свой внешний шлейф.

- Эти три шлейфа сливаются в один общий внешний шлейф.

- Этот общий шлейф — это то, что мы называем «зарядом протона» (+1).

Масса этого общего внешнего шлейфа — ничтожна по сравнению с массой трёх внутренних лент (складки + переплетения).

4.4. Что видят физики

Физики видят:

1. **Внешний шлейф протона** — заряд +1, взаимодействует с окружающей средой.
2. **Массу протона** — 938 МэВ/c^2.
3. **Массы кварков** — извлечённые из косвенных данных, 2–5 МэВ/c^2.

Они не видят:

- Внутренние складки лент.

- Переплетения трёх лент.

- Истинную длину каждой ленты.

4.5. Что они делают

Они берут:

- Массу протона (938 МэВ).

- Вычитают сумму масс кварков (9 МэВ).

- Получают 929 МэВ.

- Называют это «энергией связи глюонного поля».

Это не открытие. Это подгонка.

4.6. Почему это неизбежно

Потому что зонд физически не может проникнуть внутрь ленты. Он всегда «натыкается» на внешний шлейф. Поэтому любое измерение кварка будет измерять только шлейф. А шлейф — это малая часть всей массы.

Стандартная модель не может этого знать, потому что она не знает о лентах циркуляции.

ТАО знает. И поэтому ТАО не нуждается в подгонке.

Часть 5. Что такое «масса» в ТАО

5.1. Масса — это количество пикселей

В ТАО масса — это общее число активных пикселей в замкнутом паттерне.

- Электрон: одна лента циркуляции, $N \approx 6.005 \times 10^{23}$ пикселей.

- Протон: узел из трёх лент, $N \approx 1.1026 \times 10^{27}$ пикселей.

$$N_p / N_e = 1836.15$$

Разница в массе в 1836 раз объясняется разным числом пикселей.

5.2. Откуда берутся лишние пиксели в протоне

- Ленты кварков в протоне складчатые — они уложены в миллионы складок, как молекула в ДНК.

- Каждая складка — это дополнительная длина ленты.

- Дополнительная длина ленты = дополнительные активные пиксели.

- Дополнительные активные пиксели = дополнительная масса.

Масса протона — это просто *больше пикселей* чем у электрона.

5.3. Гравитация — это деформация решётки, а не масса

Масса создаёт гравитационное поле — деформацию пиксельной решётки вокруг себя. Но эта деформация не является частью массы. Это — следствие массы, а не причина.

Поэтому «энергия связи» в ТАО не существует как отдельная сущность.

Часть 6. Полная картина протона в ТАО

Часть протона	**Что это**	**Масса (вклад)**	**Видит ли зонд?**
Внутренние ленты (u, u, d)	Три складчатые ленты	**~99%** (все пиксели внутри)	**Нет** (не достреливает)
Внешние шлейфы кварков	Циркуляция вокруг каждой ленты	**~1%** (малая часть пикселей)	**Да** (взаимодействует с зондом)
Общий внешний шлейф протона	Слияние трёх шлейфов в один	**~1%** (но это заряд +1)	**Да** (это то, что мы измеряем как «заряд»)

Часть 7. Сравнение: Стандартная модель , ТАО

Аспект	Стандартная модель	ТАО
Что такое кварк?	Точка с цветовым зарядом	Лента с ориентацией X/Y/Z
Что такое масса кварка?	Подгоночный параметр (~2–5 МэВ)	Количество пикселей во всей ленте
Что такое «глюонное поле»?	Физическая сущность, дающая 99% массы	Математическая фикция, заменяющая невидимые складки ленты
Почему масса кварка мала?	«Такова природа»	Зонд видит только внешний шлейф, а не всю ленту
Что даёт массу протона?	Сумма масс кварков + энергия связи	Общее число пикселей в узле из трёх лент
Что такое заряд протона?	Сумма дробных зарядов (+2/3, +2/3, −1/3)	Единый внешний шлейф трёх лент
Нужна ли подгонка?	Да (6 свободных параметров)	Нет (всё выводится из геометрии)

Часть 8. Выводы

1. **Масса протона —** это не «сумма масс кварков плюс энергия связи». Это общее количество активных пикселей в узле из трёх лент.
2. **«Глюонное поле» не существует как физическая сущность.** Это математическая фикция, введённая для

объяснения дефицита массы, который возникает из-за того, что зонды не видят внутреннюю структуру лент.

3. **Зонд никогда не достигает самой ленты (кварка).** Он взаимодействует только с её внешним шлейфом, который составляет ничтожную часть массы.
4. **Стандартная модель вынуждена подгонять параметры**, потому что она не знает о лентах циркуляции и пиксельной решётке.
5. **ТАО не нуждается в подгонке.** Она объясняет массу протона через геометрию: длину лент, число складок, плотность упаковки пикселей.

Заключительная формулировка

«Масса протона в ТАО — это общее количество активных пикселей в узле из трёх складчатых лент (u, u, d). Она в 1836 раз больше массы электрона, потому что ленты кварков значительно длиннее и уложены в миллионы складок, что увеличивает число активных пикселей в паттерне. Внешний шлейф протона — это общая циркуляция трёх лент, которая даёт заряд +1, но составляет ничтожную часть массы. Зонд никогда не достигает внутренних лент — он взаимодействует только с внешним шлейфом, поэтому измеренная масса кварка (2–5 МэВ) — это масса шлейфа, а не всей ленты. «Глюонное поле» стандартной модели — это не физическая сущность, а название для того, что физики не могут увидеть: скрытой структуры складчатых лент. В ТАО нет «энергии связи» как отдельной сущности — есть только геометрия и количество пикселей». ТАО просто показывает КМ, где она ошиблась. И эта ошибка стоила физике 50 лет бесплодных поисков «глюонного поля», которого нет.

Часть 9. Глюон – не частица, а событие.

9.1. Определение глюона в ТАО

Глюон — это не частица. Это событие переключения ориентации ленты циркуляции внутри узла. Это волна деформации, которая передаётся по переплетённым лентам и меняет их ориентацию.

9.2. Как работает глюон

1. Исходное состояние: Кварк A имеет ориентацию X («красный»).
2. Событие: Лента кварка A начинает поворачиваться.
3. Передача: Поворот передаётся на соседние ленты через связи (глюонную струну).
4. Конечное состояние: Кварк A имеет ориентацию Y («зелёный»).

Глюон — это сам этот поворот, а не отдельная сущность.

9.3. Сохранение цвета

При переключении ориентации сумма всех цветов в узле должна оставаться нулевой (бесцветной).

Пример:

- Кварк 1: X → Y

- Кварк 2: Y → X

Результат: $X+Y+Z \rightarrow Y+X+Z = X+Y+Z$ (цвет сохранился).

Глюон в этом процессе — это «волна», которая переносит разницу $X-Y$, но не нарушает баланса.

9.4. Почему глюонов 8

В трёхмерной решётке есть 3 оси и 3 анти-оси.
Всего 3×3=9 комбинаций, но одна из них — **бесцветная** ($X \rightarrow X + Y \rightarrow Y + Z \rightarrow Z$) — соответствует фотону.
Остальные 8 — глюоны.

Тип	Пример	Статус
Обмен цветом	X→Y, Y→Z, Z→X	Глюон
Обмен с анти-цветом	X→$\bar{Y}$, Y→$\bar{Z}$, Z→$\bar{X}$	Глюон

Тип	Пример	Статус
Бесцветная комбинация	X→X + Y→Y + Z→Z	Фотон

3.5. Топологическая интерпретация

В ТАО глюон — это поворот ленты в пространстве на 90° (или −90°).
Этот поворот не разрывает ленту, а непрерывно деформирует её, сохраняя все топологические инварианты (число полуоборотов, связность).

Часть 10. Протон – узел из трёх кварков.

10.1. Что такое кварк в ТАО

Кварк — это замкнутая спираль, свёрнутая в кольцо-обруч.

Свойства ленты:

- Топология: представим себе кольцо, в сечении которого синусоида с комптоновской длиной волны. А теперь, чтобы сделать это кольцо более компактным, с**ама окружность кольца также «гофрирована» — она сложена "змейкой" из той же синусоиды, что утолщает кольцо и уменьшает его радиус.**

Таким образом и сложена циркуляция кварка.

- Спин: ½ (как у электрона только с противоположной закруткой).

- Заряд: определяется направлением внешней циркуляции.

- Масса: определяется полной длиной ленты.

В стандартной модели кваркам приписывают комптоновскую длину волны, вычисленную из их «массы» (2–5 МэВ). Но:

- Кварк никогда не бывает свободным.

- Его масса не определена как масса свободной частицы.

- Комптоновская длина — это характеристика свободной частицы, а не связанного состояния.

Поэтому комптоновская длина кварка в КМ — это математическая условность. Она не имеет физического смысла.

В ТАО мы используем комптоновскую длину для кварков, исходя из того, что она равна одной трети от массы протона.

10.2. Что мы знаем и что хотим получить

У нас есть:

- Энергия активного пикселя: $\varepsilon_1 = 1.41 \times 10^{-37}$ Дж.
- Масса протона: $m_p = 1.6726 \times 10^{-27}$ кг.
- Энергия покоя протона: $E_p = m_p c^2 = 1.503 \times 10^{-10}$ Дж.
- Комптоновская длина протона:
  $\lambda_C(p) = h/(m_p c) = 1.321 \times 10^{-15}$ м.
- Радиус протона: $r_p = 0.84 \times 10^{-15}$ м.

Мы хотим:

1. Пересчитать число активных пикселей в протоне.
2. Оценить длину ленты одного кварка.
3. Оценить амплитуду спирали кварка.
4. Прикинуть, как упакован кварк в протоне.
5. Оценить число складок (перекрутов).

Всё — приблизительно, для наглядности.

10.3. Расчёт числа пикселей в протоне

Число активных пикселей в протоне:

$$N_p = E_p / \varepsilon_1$$

Численный расчёт

$E_p = m_p c^2 = 1.6726 \times 10^{-27} \times 8.9875 \times 10^{16} = 1.503 \times 10^{-10}$Дж

$$N_p = \frac{1.503 \times 10^{-10}}{1.41 \times 10^{-37}} = 1.066 \times 10^{27}$$

$N_p \approx 1.07 \times 10^{27}$ пикселей

10.4. Длина ленты одного кварка

Масса кварка

В стандартной модели «масса» кварка (u или d) — это **масса внешнего шлейфа**, а не всей ленты.

Примерные значения масс кварков (по данным Particle Data Group)

- u-кварк: текущая масса ~2,2 МэВ

- d-кварк: ~4,7 МэВ

- s-кварк (странный): ~95 МэВ

- c-кварк (очарованный): pole mass ~1,27 ГэВ

- b-кварк (красивый): ~4,18 ГэВ

- t-кварк (истинный): ~173 ГэВ (это уже почти как атом вольфрама)

Почему лёгкие кварки такие «лёгкие», а протон тяжёлый

Это особенно важно в контексте твоих вопросов про протон и геометрию:

- Суммарная масса трёх валентных кварков в протоне (u, u, d) составляет всего порядка 9 – 10 МэВ.

- Масса протона ≈ 938 МэВ/c^2.

- Остальные ~930 МэВ — это энергия глюонного поля, кинетическая энергия кварков и антикварков, а также эффекты нарушения киральной симметрии в КХД.

То есть в Стандартной модели масса адрона — это в основном энергия взаимодействия, а не сумма масс составляющих.

Как эти массы измеряют:

- Для лёгких кварков (u, d, s) напрямую их не видят: кварки не бывают свободными (конфайнмент). Массы извлекают из спектров мезонов и барионов, из распадов и из решёточных расчётов.

- Для тяжёлых кварков (c, b, t) используют кинематику распадов и порогов рождения в коллайдерах; для t это почти всегда «ширина резонанса» и распределение инвариантной массы продуктов распада.

Но: это не масса всей ленты. Это масса шлейфов.

Масса ленты кварка

В ТАО вся масса протона — это сумма масс трёх лент (u, u, d).

Приблизительно:

$$m_{\text{ленты}}(u) + m_{\text{ленты}}(u) + m_{\text{ленты}}(d) \approx m_p$$

Если предположить, что все три ленты имеют одинаковую длину (для простоты):

$$m_{\text{ленты}} \approx \frac{m_p}{3} = \frac{1.6726 \times 10^{-27}}{3} = 5.575 \times 10^{-28} \text{ кг}$$

Энергия ленты:

$E_{\text{ленты}} = m_{\text{ленты}}c^2 = 5.575\times10^{-28} \times 8.9875\times10^{16} = 5.01\times10^{-11}$ Дж

Число пикселей в ленте:

$$N_{\text{ленты}} = \frac{E_{\text{ленты}}}{\varepsilon_1} = \frac{5.01 \times 10^{-11}}{1.41 \times 10^{-37}} = 3.55 \times 10^{26}$$

Длина ленты (прямая)

Если каждый пиксель занимает l_P=1.616×10^{-35} м, то прямая длина ленты:

$$L_{\text{прямая}} = N_{\text{ленты}} \cdot l_P$$

$$L_{\text{прямая}} = 5.74\times10^{-9} \text{ м} = 5.74 \text{ нм}$$

Это в 4 раза больше, чем в предыдущей версии текста (1.5 нм). Причина: мы использовали реальную массу ленты (m_p/3), а не «массу кварка» из стандартной модели (2–5 МэВ).

10.5. Комптоновская длина кварка

Комптоновская длина

$\lambda_C^{(q)} = 3.965 \times 10^{-15}$ м = 3.97 фм

Амплитуда спирали (оценочная)

$A_q = 0.269 \cdot \lambda_C^{(q)} = 1.067 \times 10^{-15}$ м = 1.07 фм

Число периодов

Мы знаем **прямую длину ленты** кварка:

$L_{\text{прямая}} = 5.74 \times 10^{-9}$ м = 5.74 нм

Число периодов:

$$N_{\text{период}}^{(q)} = \frac{L_{\text{прямая}}}{\lambda_C^{(q)}} = \frac{5.74 \times 10^{-9}}{3.965 \times 10^{-15}} = 1.45 \times 10^6$$

Это ~1.5 миллиона периодов.

Радиус исходного кольца

Если лента не сжата:

$$R_{\text{кольца}} = \frac{L_{\text{прямая}}}{2\pi} = \frac{5.74 \times 10^{-9}}{2\pi} = 9.13 \times 10^{-10} \text{ м} = 0.913 \text{ нм}$$

Без изменений. Радиус кольца не зависит от комптоновской длины. Он зависит от длины ленты.

10.6. Число складок

Чтобы уложить ленту в протон радиусом $r_p = 0.84$ фм:

$$N_{\text{складок}} = \left(\frac{L_{\text{прямая}}}{r_p} \right)^2 = \left(\frac{5.74 \times 10^{-9}}{0.84 \times 10^{-15}} \right)^2 = 4.67 \times 10^{13}$$

10.7. Узел из трёх кварков: D-орбиталь

D-орбиталь: соединение трёх колец. Три таких кольца (u, u, d) не являются шаром.

Они переплетаются в сложную трёхмерную конструкцию возможно, как аналог D-орбитали электрона:

- В центре: d-кварк — сжатая сфера (плоскость, как у электрона), отрицательно-заряженный.

- Вокруг: два u-кварка — вытянутые гантели (каждый — два лепестка), положительно-заряженные.

Что происходит при переплетении:

- Кольца вкладываются друг в друга.

- Их радиусы уменьшаются.

- Между ними образуется пуповина — плотная упаковка переплетённых участков - общая циркуляция.

- Внешние части u-кварков вытягиваются в тонкие лепестки (внешний шлейф).

Результат:
Три кольца, переплетённые в D-орбиталь, дают финальный радиус, совпадающий с радиусом протона (0.84×10^{-15}м).

10.8. Что такое пуповина

Пуповина — это общая циркуляция, возникающая при переплетении трёх лент.

- Она находится между центральной сферой (d-кварк) и гантелями (u-кварки).

- Она стягивает узел.

- Она даёт ~99% массы протона.

- Она не видна зонду, потому что находится внутри.

Именно пуповину стандартная модель называет «глюонным полем».

10.9. Внешний шлейф протона

Внешний шлейф протона — это то, что остаётся снаружи:

- Это тонкие концы лепестков двух u-кварков.

- Они обволакивают всю структуру.

- Они дают заряд +1.

- Они составляют ~1% массы протона.

- Именно с ними взаимодействуют зонды.

Вывод:
Без колоссальной упаковки (перекруты + переплетение) протон не мог бы существовать. Его внутренняя структура — это одна из самых плотных и сложных геометрических конструкций во Вселенной.

Часть 11. Конфайнмент

Конфайнмент — это гравитационный плен, создаваемый колоссальной концентрацией активных пикселей в компактном объёме протона, и топологический запрет, возникающий из-за замкнутости лент циркуляции.

Простыми словами:

- Протон — это узел из трёх лент (кварков).

- Эти ленты переплетены и сжаты в объём, колоссально меньший, чем их суммарная длина.

- Это создаёт глубокую гравитационную яму.

- Кварки не могут выйти, потому что гравитация держит их сильнее, чем любая сила.

- А если попытаться вытащить — лента не разрывается,
а перестраивается, рождая новый кварк.

Конфайнмент — это не силовой запрет. Это геометрическая и гравитационная неизбежность.

Часть 12. Гравитационная яма протона

Что создаёт яму

В ТАО гравитация — это деформация пиксельной решётки, создаваемая локальной концентрацией активных пикселей.

- Три ленты (u, u, d) упакованы в объём радиусом 0.84 фм.

- Их длина в развёрнутом состоянии — ~ 0.74 нм.

- Они сжаты в ~86 000 раз.

- Концентрация активных пикселей:

$\rho \approx 10^{71}$пикселей/м^3

Это колоссальная плотность. Для сравнения:

- У электрона: $\sim 10^{47}$ м$^{-3}$.

- У протона: в 10^{24} раз выше.

Именно эта концентрация создаёт глубокую гравитационную яму. Эта яма — не «потенциальная яма» в математическом смысле. Это реальная деформация пространства.

Часть 13. Сила натяжения

В КХД говорят: «Глюонная струна имеет силу натяжения ~16 тонн (≈ 1 ГэВ/фм)». Это — постоянная величина, не зависящая от расстояния.

В ТАО эта сила объясняется гравитацией.

- Градиент деформации внутри гравитационной ямы постоянен.

- Поэтому сила, с которой решётка сопротивляется вытаскиванию кварка, постоянна.

- Эта сила ≈ 16 тонн (1 ГэВ/фм).

«Тонна» в ТАО — это не свойство поля. Это градиент гравитационной ямы.

Почему сила не уменьшается с расстоянием.

В обычной гравитации сила убывает как $1/r^2$. Но внутри протона — другая геометрия:

- Кварк — это лента, а не точечная масса.

- При вытаскивании мы распрямляем ленту, но она всё ещё находится внутри гравитационной ямы.

- Яма простирается на весь объём протона.

- Пока лента внутри ямы, градиент деформации одинаков.

Поэтому сила не убывает с расстоянием — она постоянна.

Часть 14. Что происходит при попытке вытащить кварк.

Этап 1. Начало

- Кварк (кольцо-змейка) находится в узле протона.

- Он удерживается гравитационной ямой.

- Внешний шлейф кварка взаимодействует с окружающей средой.

Этап 2. Растяжение

- Мы пытаемся вытащить кварк (например, через столкновение с электроном).

- Мы распрямляем его ленту, вытягивая из складок и перекрутов.

- Лента начинает натягиваться.

Этап 3. Накопление энергии

- Энергия, которую мы вкладываем, идёт на преодоление гравитационной ямы.

- Она накапливается в растянутых участках ленты.

- Энергия растёт линейно с расстоянием ($E = \sigma \cdot r$).

- Сила натяжения постоянна.

Этап 4. Достижение порога

- Когда энергия достигает ~0.3 ГэВ, происходит переключение.

- Это энергия, необходимая для рождения пары кварк-антикварк.

Этап 5. Переключение пикселей

- В точке максимального натяжения:

- Активный пиксель переходит в нулевой.

- Рядом нулевой пиксель переходит в активный.

- Это создаёт разрыв ленты и в то же время - новую ленту — антикварк.

Это не «разрыв» струны. Это — переключение состояний решётки.

Этап 6. Рождение пары (мезонизация)

- Новая лента (антикварк) присоединяется к вытаскиваемому кварку.

- Вырвавшийся кварк + антикварк = мезон.

Примеры:

- $u + \bar{u} = \pi^0$ (нейтральный пи-мезон).

- $u + \bar{d} = \pi^+$ (положительный пи-мезон).

- $d + \bar{u} = \pi^-$ (отрицательный пи-мезон).

Это называется адронизацией или фрагментацией.

Этап 7. Перестройка протона

- В протоне, откуда вырвали кварк, остаётся узел из двух кварков.

- Но гравитационная яма не может остаться с двумя кварками — ей нужно три.

- Энергия, высвободившаяся при вырывании, активирует новые пиксели.

- Новые пиксели выстраиваются в новый кварк.

- Этот кварк занимает место ушедшего.

Результат:

- Протон восстанавливается (или превращается в нейтрон, в зависимости от того, какой кварк родился).

Варианты перестройки:

Вырванный кварк	Родившийся кварк	Результат
u	u	Протон (*u*, *u*, *d*)
u	d	Нейтрон (*u*, *d*, *d*)
d	d	Протон (*u*, *u*, *d*)
d	u	Δ++ (*u*, *u*, *u*) → протон + пи-мезон

Одиночный кварк никогда не вылетает.

Часть 15. Механизм вырывания в экспериментах.

15.1. Как в экспериментах «пытаются вырвать кварк»

В физике высоких энергий используют глубоко неупругое рассеяние (DIS — Deep Inelastic Scattering).

Что делают:

1. Разгоняют электрон (или мюон) до огромной энергии.
2. Направляют его на протон.
3. Электрон испускает виртуальный фотон (или Z-бозон).
4. Этот виртуальный фотон сталкивается с одним из кварков внутри протона.
5. Кварк получает огромный импульс и начинает двигаться.

Результат:

- Кварк не вылетает из протона.

- Вместо этого из точки столкновения вылетает струя адронов (мезонов, барионов).

- Это и есть адронизация — процесс превращения энергии кварка в адроны.

15.2. Что происходит с кварком при столкновении

Передача энергии:

- При столкновении электрон через виртуальный фотон передаёт кварку энергию и импульс.

- Кварк начинает двигаться относительно пиксельной решётки.

- Его частота как целого паттерна (движение центра масс) растёт.

Рост частоты и энергии виртуальных фотонов:

- Вокруг ленты кварка существует облако виртуальных фотонов (виртонов).

- Когда кварк движется, эти виртоны набирают энергию.

- Их частота растёт.

- Они становятся всё более «реальными».

Это и есть «глюонная струна» в ТАО:
Не поле, а упругая деформация решётки, создаваемая виртонами, которые «тащат» кварк обратно.

15.3. Попытка преодолеть гравитационную яму

- Кварк пытается вырваться из протона.

- Но протон — это гравитационная яма.

- Чтобы вырваться, кварк должен преодолеть градиент этой ямы.

- Это требует энергии.

- Энергия, переданная кварку, идёт на преодоление ямы.

Сила натяжения («струны») — это реакция ямы на попытку кварка вырваться.

15.4. Критическая частота и вырывание

Когда частота кварка достигает критического значения,
он вырывается из гравитационной ямы.

Критическая энергия: $E_{крит} \approx 0.3$ГэВ

Что происходит в момент вырывания:

1. Кварк вырывается из ямы.
2. Он теряет энергию, которая была запасена в его движении.
3. Эта энергия не исчезает — она перераспределяется.

Перераспределение энергии:

- Рождение антикварка (из виртуальных фотонов).

- Рождение нового кварка (в протоне).

15.5. Почему конфайнмент нерушим

Топологический запрет

- Лента кварка замкнута.

- Её нельзя разорвать — это изменит топологию.

- Чтобы разорвать топологию, нужно изменить число полуоборотов.

- Это требует энергии, равной массе всей ленты (~300 МэВ).

Гравитационный плен

- Гравитационная яма удерживает кварк.

- Чтобы вырваться, нужно преодолеть яму.

- Это требует энергии, сравнимой с массой протона.

Комбинация

Конфайнмент — это топологический и гравитационный запрет, а не силовой.

- Топология не позволяет ленте разорваться.

- Гравитация не позволяет ей выйти.

- Вместе они делают одиночный кварк невозможным.

Часть 16. Деконфайнмент в ТАО

16.1. Деконфайнмент — это состояние, в котором кварк обладает энергией движения относительно пиксельной решётки, превышающей пороговую энергию связи гравитационной ямы.

В этом состоянии:

- Кварк не может быть захвачен обратно в гравитационную яму.

- Он не может соединиться с другим кварком.

- Он движется свободно (но не как изолированная частица, а как часть коллективной среды).

Простыми словами:

- Конфайнмент — это когда кварк «сидит» в гравитационной яме протона.
- Деконфайнмент — это когда кварк получает столько энергии, что может выпрыгнуть из этой ямы и больше в неё не вернуться.

16.2. Условие деконфайнмента

В ТАО конфайнмент удерживает кварк за счёт гравитационной ямы, созданной тремя переплетёнными лентами Мёбиуса.

Пороговая энергия — это энергия, необходимая
для преодоления этой ямы:

$E_{\text{порог}} \approx 0.3\text{ГэВ}$

Это энергия, которая требуется, чтобы:

- Вырвать кварк из протона.
- Предотвратить его возвращение.

Откуда взялось 0.3 ГэВ?

- Это энергия, необходимая для рождения пары кварк-антикварк.
- В КХД это соответствует массе пи-мезона (≈0.14 ГэВ) и энергии связи.

- В ТАО это энергия, при которой гравитационная яма перестаёт удерживать ленту.

Критерий деконфайнмента

Кварк находится в состоянии деконфайнмента, если:

$E_{кин} > E_{порог}$

Где:

- $E_{кин}$ — энергия движения кварка относительно пиксельной решётки.
- $E_{порог} \approx 0.3$ГэВ — энергия связи гравитационной ямы.

Когда это условие выполнено:

- Кварк не может быть захвачен ямой.
- Он не может образовать связанное состояние (адрон).
- Он движется свободно.

Часть 3. Что такое «свободное состояние» В ТАО

3.1. Кварк не становится «одиночным»

Важно: деконфайнмент не означает, что кварк становится изолированной частицей.

В ТАО кварк — это лента, которая всегда имеет внешний шлейф. Даже в свободном состоянии он взаимодействует с окружающей средой.

Но!

- Он не связан с другими кварками в узел.
- Он не удерживается гравитационной ямой.
- Он может свободно перемещаться по решётке.

Это состояние называется кварк-глюонной плазмой (КГП).

3.2. Энергия движения относительно решётки

В ТАО абсолютная система отсчёта — это пиксельная решётка.

- Когда кварк движется относительно решётки, его частота как целого паттерна растёт.
- Это увеличивает его кинетическую энергию.
- При $E_{кин} > E_{порог}$ гравитационная яма не может его удержать.

Это и есть деконфайнмент.

3.3. Что происходит с лентой кварка

- В состоянии конфайнмента лента складчатая, перекрученная.
- В состоянии деконфайнмента лента распрямляется.
- Складки разворачиваются.
- Перекруты исчезают.
- Лента становится гладкой и может свободно перемещаться.

Это — ключевое отличие от КХД.
В ТАО деконфайнмент — это геометрическое изменение ленты, а не просто «освобождение» частицы.

Часть 4. КВАРК-ГЛЮОННАЯ ПЛАЗМА В ТАО

4.1. Кварк-глюонная плазма в ТАО — это состояние, в котором:

1. Кварки движутся с энергией $E > E_{порог}$.
2. Они не связаны в адроны.
3. Их ленты распрямлены (складки развёрнуты).
4. Гравитационные ямы отсутствуют (слишком высокая температура).
5. Среда состоит из свободных лент и виртуальных фотонов с высокой энергией.

Это не «газ» кварков, а «море» распрямлённых лент.

4.2. Когда существовала кварк-глюонная плазма

Ранняя Вселенная:

- В первые микросекунды после Большого взрыва температура Вселенной была настолько высокой, что:
- Протоны и нейтроны не могли существовать.
- Кварки и «глюоны» находились в свободном состоянии.

- Это состояние называется кварк-глюонной плазмой (КГП).

В ТАО это означает:

- Энергия движения кварков относительно решётки превышала порог конфайнмента.

- Гравитационные ямы не могли сформироваться.

- Кварки свободно перемещались в «море» виртуальных фотонов.

4.3. Где ещё можно наблюдать деконфайнмент

- В коллайдерах (БАК, RHIC) при столкновении тяжёлых ионов (свинец-свинец, золото-золото).

- В нейтронных звёздах (в ядре, где плотность и температура могут превышать порог).

- В активных галактических ядрах (при экстремальных температурах).

Часть 5. Переход «КГП → АДРОНЫ» (АДРОНИЗАЦИЯ)

5.1. Охлаждение Вселенной

По мере расширения Вселенной её температура падала.

Когда энергия движения кварков стала меньше пороговой:

$E_{\text{кин}} < E_{\text{порог}}$

Кварки начали захватываться гравитационными ямами.

5.2. Формирование адронов (пошагово)

1. Сближение: Три кварка (u, u, d) сближаются.
2. Переплетение: Их ленты начинают переплетаться.

3. Складки: Ленты складываются в змейку (перекруты).
4. Гравитационная яма: Образуется гравитационная яма (концентрация пикселей $\sim 10^{71} м^{-3}$).
5. Протон: Возникает протон.
6. Остальные кварки: Другие кварки образуют мезоны и другие адроны.

Этот переход называется адронизацией или конфайнмент-переходом.

5.3. Аналогия с фазовым переходом

- Конфайнмент — это как вода, замёрзшая в лёд. Молекулы (кварки) связаны в кристаллическую решётку (адроны).

- Деконфайнмент — это как лёд, растаявший в воду. Молекулы (кварки) свободно движутся.

Но в ТАО это не просто «разрыв связей».
Это — геометрическое изменение лент: от складчатых к распрямлённым.

5.4. Критическая температура

В КХД критическая температура деконфайнмента:

$T_c \approx 1.7 \times 10^{12} К$

В ТАО это температура, при которой:

$E_{кин} \approx k_B T_c \approx 0.3 ГэВ$

Совпадение:

- $k_B \approx 8.617 \times 10^{-5} эВ/К$

- $T_c \approx 1.7 \times 10^{12} К$

- $k_B T_c \approx 1.7 \times 10^{12} \times 8.617 \times 10^{-5} \approx 1.46 \times 10^{8}$ эВ ≈ 0.146 ГэВ

Это близко к $E_{порог} \approx 0.3 ГэВ$.

Часть 6. Деконфайнмент в ТАО — это состояние, в котором энергия движения кварка относительно пиксельной решётки

превышает пороговую энергию гравитационной ямы (~0.3 ГэВ). В этом состоянии кварк не может быть захвачен в адрон, его лента распрямлена, а гравитационная яма разрушена. Кварки движутся свободно, образуя кварк-глюонную плазму — состояние, существовавшее в ранней Вселенной и воспроизводимое в коллайдерах при столкновении тяжёлых ионов. При охлаждении среды энергия движения падает ниже порога, кварки захватываются гравитационными ямами, и происходит адронизация — образование протонов, нейтронов и мезонов. Конфайнмент и деконфайнмент — это два состояния одной и той же геометрической структуры: складчатой и перекрученной (конфайнмент) или распрямлённой (деконфайнмент) ленты кварка.

ГЛАВА 11. Нейтрон

Часть 1. Структура нейтрона

1.1. Нейтрон — это протон (D-орбиталь), к которому добавлена дополнительная внешняя цепочка циркуляции — нейтрализующее кольцо, подобное кольцу Сатурна.

Визуализация:

- Протон — это D-орбиталь:

- В центре: отрицательный d-кварк (сфера).

- Вокруг: два положительных u-кварка (гантели).

- Пуповина между ними — 99% массы.

- Нейтрон — это тот же протон, но:

- К пуповине прикрепляется дополнительная цепочка.

- Эта цепочка закручена в кольцо.

- Она создаёт нейтрализующий поток циркуляции, компенсирующий заряд.

1.2. Сравнительная таблица структур

Элемент	Протон	Нейтрон
Центр	d-кварк (−)	d-кварк (−)
Гантели	два u-кварка (+)	два u-кварка (+)
Пуповина	есть (99% массы)	есть (99% массы)
Дополнительное кольцо	**нет**	**есть** — нейтрализующее кольцо
Заряд	+1	0

Элемент	Протон	Нейтрон
Масса	938.272 МэВ	939.565 МэВ
Стабильность	Стабилен	Нестабилен (~15 мин вне ядра)

Часть 2. Где существует нейтрон

2.1. Нейтрон стабилен только внутри атомного ядра.

Почему?

- Внутри ядра нейтрон вплетён в общую циркуляционную сеть нуклонов.

- Его дополнительное кольцо не является отдельной структурой — оно становится частью общей циркуляции ядра.

- Гравитационная яма ядра (общая для всех нуклонов) удерживает кольцо.

- Энергия связи ядра превышает энергию, необходимую для разрыва кольца.

Факт из КМ: Нейтрон стабилен в составе ядер, потому что сильное взаимодействие «компенсирует» его нестабильность.

В ТАО это означает: Пуповина нейтрона сливается с пуповинами других нуклонов, создавая единый узел. Дополнительное кольцо перестаёт быть «прикреплённым» — оно становится вплетённым в общую структуру.

2.2. Свободный нейтрон

Свободный нейтрон (вне ядра) нестабилен.

- Его период полураспада: ~10 минут (608.9 секунд) .

- Время жизни: ~15 минут (878.4 секунды) .

Почему?

- Вне ядра дополнительное кольцо не вплетено в общую структуру.

- Оно прикреплено к пуповине, но не является частью устойчивого узла.

- Это создаёт упругое напряжение.

- Примерно через 15 минут напряжение превышает порог.

- Кольцо отрывается.

2.3. Может ли нейтрон существовать отдельно вне ядра?

Да, но недолго.

- Свободные нейтроны существуют в природе (в космических лучах, в ядерных реакторах) .

- Они не могут существовать вечно — они распадаются.

- В больших количествах их получают в ядерных реакторах (цепная реакция деления).

Таким образом, нейтрон может существовать отдельно, но только как нестабильная частица.

Часть 3. Распад нейтрона

3.1. Механизм распада в ТАО

1. Дополнительное кольцо прикреплено к пуповине.
2. Оно не вплетено в основную структуру.
3. Это создаёт упругое напряжение.
4. Примерно через 15 минут напряжение превышает порог.
5. Кольцо отрывается от пуповины.
6. Вместе с ним уходит часть виртуальных фотонов.
7. В результате:

Нейтрон (n) → протон (p) + электрон (e^-) + антинейтрино ($\bar{\nu}_e$).

Продукты распада:

- Протон — оставшийся узел (D-орбиталь).

- Электрон — оторвавшееся кольцо, которое замыкается само на себя (становится замкнутой лентой).

- Антинейтрино — избыточная энергия (виртуальные фотоны, унесённые с кольцом).

3.2. Масса дополнительной цепочки

Параметр	Значение
Масса протона	938.272 МэВ
Масса нейтрона	939.565 МэВ
Разница	1.293 МэВ
Масса электрона	0.511 МэВ
Отношение $\Delta m/m_e$	2.53

Дополнительная цепочка в ~2.5 раза тяжелее электрона.

Часть 4. Нейтрон в ТАО — это протон (D-орбиталь с пуповиной), к которому добавлена дополнительная внешняя цепочка циркуляции — нейтрализующее кольцо, подобное кольцу Сатурна. Это кольцо прикреплено к пуповине. Внутри атомного ядра оно вплетается в общую циркуляционную сеть нуклонов, что делает нейтрон стабильным. Вне ядра кольцо остаётся прикреплённым, но не вплетённым, что создаёт напряжение и делает нейтрон нестабильным (~15 минут). При распаде кольцо отрывается и замыкается в электрон, а избыточная энергия уходит в антинейтрино: $n \rightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}_e$. Нейтрон — это "протон с кольцом Сатурна", который стабилен только в составе ядра.

Раздел 2. Теория Квантовой Гравитации.

Предисловие

Квантовая гравитация — это так же Святой Грааль современной физики. Стандартная модель и Общая теория относительности несовместимы: одна говорит о вероятностях и дискретности, другая — о гладкой геометрии и непрерывности. Попытки объединить их породили теорию струн, петлевую квантовую гравитацию, супергравитацию — но ни одна из них не дала физической онтологии. Все они остаются математическими конструкциями, которые не отвечают на главный вопрос:

«Из чего сделана реальность на планковском масштабе?»

Теория Абсолютной Относительности (ТАО) даёт ответ на этот вопрос. В ТАО квантовая гравитация — это не отдельная сила, не «частица-переносчик» и не «искривление 4D-пространства». Это — сжатие упругой пиксельной решётки, которое проявляется по-разному на разных масштабах: как сильное взаимодействие внутри протона, как электромагнетизм между зарядами, и как классическая гравитация между планетами.

Данный раздел представляет собой полную, замкнутую онтологию квантовой гравитации в ТАО. Здесь нет формул ради формул — есть геометрия, топология и физический смысл.

Глава 1. Главная формула гравитации: $\hbar c = Gm^2_P$. Как ТАО расшифровала соотношение, которое знали 120 лет, но не понимали

Часть 1. Введение: формула, которая лежала на виду.

1.1. В 1899 году Макс Планк, работая над своей системой естественных единиц, вывел комбинацию фундаментальных констант:

$$m_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}}$$

Это — планковская масса. Она получается из трёх констант: постоянной Планка $\hbar$, скорости света c и гравитационной постоянной G.

Элементарное алгебраическое следствие:

$$\hbar c = Gm^2_P$$

Это соотношение знали с самого начала. Оно вытекает автоматически из определения планковской массы. Его можно записать в любой момент. Оно тривиально. Но никто не использовал его. Ни в гравитации. Ни в квантовой механике. Ни в физике элементарных частиц. Ни в космологии.

Почему?

Потому что никто не понимал, что оно означает. Это соотношение связывало квантовый мир (через $\hbar$) и гравитацию (через G). Но в стандартной физике эти миры разделены. Гравитация — это макромир. Квантовая механика — это микромир. Между ними — пропасть. Соотношение $\hbar c = Gm^2_P$ воспринималось как математический курьёз, а не как физический закон.

Только ТАО расшифровала его. Только ТАО поняла, что это — главная формула гравитации. Что это — мост между макро- и микромиром. Что это — ключ к квантовой гравитации.

1.2. Что такое $\hbar c = Gm^2_P$

Проверим размерность:

Левая часть:

$[\hbar c] = [\text{Дж}\cdot\text{с}]\cdot[\text{м/с}] = [\text{кг}\cdot\text{м}^2/\text{с}]\cdot[\text{м/с}] = [\text{кг}\cdot\text{м}^3/\text{с}^2]$

Правая часть:

$[Gm_P^2] = [\text{м}^3/(\text{кг}\cdot\text{с}^2)]\cdot[\text{кг}^2] = [\text{кг}\cdot\text{м}^3/\text{с}^2]$

Совпадает. Это — энергия × длина (или сила × площадь, или импульс × скорость × длина).

1.3. Физический смысл в стандартной физике

В стандартной физике это соотношение не интерпретируется. Его можно переписать как:

$$\hbar c = Gm_P^2$$

Или:

$$\frac{\hbar c}{G} = m_P^2$$

Или:

$$\frac{Gm_P^2}{\hbar c} = 1$$

Последнее выражение — это безразмерная величина. Она равна единице. Это значит, что гравитационное взаимодействие между двумя планковскими массами, разделёнными планковской длиной, равно квантовому действию на планковском масштабе. Но что это значит физически? Стандартная физика не отвечает. Это — «совпадение». Это — «определение». Это — «математика».

Часть 2. Что говорит ТАО

2.1. Планковская масса — это масса, которая помещается в один пиксель. В ТАО пространство — это пиксельная решётка. Шаг решётки — планковская длина:

$$l_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} = 1.616 \times 10^{-35}\ \text{м}$$

Планковская масса:

Что это значит?

Планковская масса — это масса, которая помещается в один

$$m_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} = 2.176 \times 10^{-8} \text{ кг}$$

$$\rho_P = \frac{m_P}{l_P^3} = \frac{2.176 \times 10^{-8}}{(1.616 \times 10^{-35})^3} = 5.16 \times 10^{96} \text{ кг/м}^3$$

пиксель при планковской плотности:

Это — максимальная плотность. Это — предел сжатия.

2.2. $\hbar c = Gm^2_P$ — это связь между квантом действия и гравитацией

В ТАО:

- $\hbar c$ — это квант действия, умноженный на скорость света. Это — энергия × длина.

- Gm^2_P — это гравитационная энергия двух планковских масс на планковском расстоянии.

Равенство означает:

«Квант действия на планковском масштабе равен гравитационной энергии двух планковских масс на планковском расстоянии».

Что это значит?

Это значит, что гравитация и квантовая механика — это не два разных мира. Это два аспекта одного и того же. На планковском масштабе они сливаются. Соотношение $\hbar c = Gm^2_P$ — это точка слияния.

2.3. Почему эту формулу не использовали

В стандартной физике:

- Гравитация — это макромир. Планеты, звёзды, галактики. G — это «слабая» константа.

- Квантовая механика — это микромир. Атомы, электроны, фотоны. $\hbar$ — это «квант действия».

Между ними — пропасть. Гравитация не квантуется. Квантовая механика не включает гравитацию. Это — два разных языка. Соотношение $\hbar c = Gm^2_P$ связывает оба мира. Но никто не знал, как его интерпретировать. Оно выглядело как математическая случайность.

2.4. Планковская масса — «недостижимая»

Планковская масса $m_P = 2.176 \times 10^{-8}$ кг — это огромная масса для элементарной частицы. Протон весит 1.67×10^{-27} кг. Планковская масса в 10^{19} раз больше.

Считалось: планковская масса недостижима. Она не имеет отношения к реальным частицам. Это — абстракция.

Но ТАО показала: планковская масса — это не масса частицы. Это — масса пикселя. Это — масштаб решётки. Она входит в формулы для всех взаимодействий.

2.5. Почему это — главная формула гравитации

Она связывает всё

$$\hbar c = Gm^2_P$$

Она связывает:

- $\hbar$ — квант действия.
- c — скорость света.
- G — гравитационную постоянную.
- m_P — планковскую массу.

Она показывает: гравитация, квантовая механика и релятивизм — это не три разных мира. Это — три аспекта одного.

Она связывает:

- Квантовый мир ($\hbar$).
- Релятивистский мир (c).

- Гравитационный мир (G).

- Планковский масштаб (m_P).

Она объясняет: почему гравитация «слабая», почему электромагнетизм «сильный», почему сильное взаимодействие «удерживает» кварки.

Она — мост между макро- и микромиром.

Это — ключ к квантовой гравитации. Все эти выводы будут впоследствии чётко прояснены.

Часть 3. Аксиома ТАО: несжимаемость активного пикселя.

Формулировка: Активный пиксель всегда имеет размер планковской длины $l_P = 1.616 \times 10^{-35}$м. Он не сжимается и не растягивается в статическом состоянии. Он только сжимает или растягивает окружающие нулевые пиксели.»

Однако, как мы знаем, при релятивистских скоростях (сравнимых со скоростью света) активные пиксели в составе замкнутых частиц испытывают лоренцево сокращение в направлении движения. И тут важны два аспекта:

1. В земных условиях, при скорости Земли относительно решётки $v_\oplus \approx 370$ км/с, релятивистская поправка ничтожна, поэтому все наши расчёты длин цепочек циркуляций, выполненные через число активных пикселей и планковскую длину, остаются корректными.
2. В самой системе отсчёта движущегося макропатерна (Земли) эта релятивистская поправка неощутима, так как все измерения совершаются приборами, которые также подвержены релятивисткой поправки – результат измерения тот же самый, что и в покоящейся системе относительно решётки.

Активный пиксель — это «кирпичик» материи. Его собственный размер в системе покоя фиксирован и равен планковской длине.

Нулевой пиксель — это «кирпичик» пространства. Его размер может меняться (сжиматься или растягиваться) под действием активных пикселей.

Деформация δ — это относительное изменение размера нулевого пикселя, а не активного.

Все длины цепочек циркуляции (электрона, кварка, протона) вычисляются через количество активных пикселей, каждый из которых в системе покоя имеет размер l_P.

Релятивистская поправка

При движении активного пикселя со скоростью v относительно решётки его размер в направлении движения сокращается по формуле Лоренца:

Это — релятивистское сокращение длины. Оно становится

$$l_{\text{актив}} = l_P \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

заметным только при скоростях, близких к скорости света ($v \sim 0.1c$ и выше).

В земных условиях:

- Скорость Земли относительно решётки (из реликтового излучения):

$v_\oplus \approx 370$км/с $\approx 1.23 \times 10^{-3} c$

- Релятивистский фактор:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \approx 1 + 7.6 \times 10^{-7}$$

- Сокращение длины:

$$\frac{\Delta l}{l_P} \approx 7.6 \times 10^{-7}$$

Это — ничтожная величина. Она не влияет на расчёты длин цепочек циркуляций, выполненных через число активных пикселей и планковскую длину, с точностью до 10^{-6}. До этого уточнения мы

могли думать, что активный пиксель тоже сжимается в статике. Но это было бы ошибкой.

Теперь мы знаем:

- Активный пиксель — абсолютно жёсткий в своей системе покоя.

- Нулевой пиксель — упругий.

- Гравитация — это сжатие нулевых пикселей активными.

- Длина цепочки электрона ($L_e = 4\lambda_{C,e}$) — это число активных пикселей, умноженное на l_P. Никакой деформации самих активных пикселей в статике нет.

- При релятивистских скоростях активные пиксели сокращаются, но в земных условиях этим можно пренебречь.

Как это согласуется с формулами

Мы вычисляли длину цепочки электрона:

$L_e = N \cdot l_P$

Где:

- N — число активных пикселей,

- l_P — размер одного активного пикселя (постоянный в системе покоя).

Это корректно, потому что активные пиксели в земных условиях не сжимаются.
Релятивистская поправка $\gamma \approx 1+7.6\times10^{-7}$ находится далеко за пределами точности наших расчётов.

Деформация δ относится только к нулевым пикселям:

$$\delta = \frac{l_{\text{нулевой}} - l_P}{l_P}$$

В ТАО активные пиксели всегда имеют планковский размер в своей системе покоя. Они не деформируются статически.

Деформируются только нулевые пиксели. При релятивистских скоростях активные пиксели испытывают лоренцево сокращение, но в земных условиях ($v_{\oplus} \approx 370$км/с) эта поправка ничтожна ($\sim 10^{-6}$). Поэтому все расчёты длин цепочек через число активных пикселей и планковскую длину — корректны. Гравитация — это сжатие нулевых пикселей активными.

Глава 2. Гравитомагнетизм.

Часть 1. Классическая физика: движущаяся масса притягивает

1.1. В ТАО: движение – это деформация

Из классической физики мы знаем, что неподвижная масса создаёт гравитационное поле (притяжение). Движущаяся масса создаёт дополнительный эффект, похожий на магнитное поле (гравитомагнетизм) — например, вращающаяся Земля «увлекает» пространство (эффект Лензе–Тирринга), и спутники испытывают дополнительное ускорение. Этот эффект в ОТО очень слабый и проявляется только для очень массивных быстро вращающихся объектов (например, чёрных дыр).

В классической физике это не «притяжение предметов» в привычном смысле, а искривление пространства-времени движущейся массой.

В ТАО масса покоя сжимает решётку вокруг себя. Движение добавляет дополнительную деформацию: пиксели в направлении движения сжимаются, а в поперечном сложное сжатие-растяжение (радиально – сжатие, продольно – растяжение). Вращение — это движение по кругу, которое создаёт вихревую деформацию.

Движущееся (или вращающееся) тело создаёт в решётке не только статическое сжатие, но и анизотропную, зависящую от направления, деформацию.

Это притягивает предметы, потому что предмет (пробное тело) движется в сторону большего сжатия решётки.

- Неподвижная масса даёт сжатие, спадающее как $1/r^2$.

- Движущаяся масса добавляет анизотропию: сжатие больше в направлении движения

Вращающееся тело (например, Земля) создаёт статическое сжатие (обычная гравитация), вихревую деформацию: пиксели «закручиваются» - анизотропно деформируются вокруг оси вращения. Эта закрутка создаёт дополнительный градиент деформации, который притягивает пробные тела к экваториальной

плоскости (эффект, аналогичный «увлечению» пространства в ОТО). Пробное тело, движущееся перпендикулярно оси вращения (например, спутник на полярной орбите), будет испытывать дополнительное ускорение в направлении вращения — это и есть «притяжение» движущейся массой.

В классической физике эффект гравитомагнетизма чрезвычайно мал. Например, для Земли он проявляется как прецессия орбиты спутника на ~1.1 угловой секунды в год. Это было измерено (эксперимент Gravity Probe B).

В ТАО этот эффект естественен и не мал — но он проявляется только для объектов, сравнимых с массой Земли и быстро вращающихся. Для лабораторных вращающихся тел (юла, гироскоп) гравитационное притяжение от их вращения ничтожно мало по сравнению с их собственной массой.
Но принципиально оно есть. Эффект от вращения небольшого тела (юлы) настолько слаб, что его не измерить без сверхчувствительных приборов. Он перекрывается обычной гравитацией самого тела (которая и так есть).

Для вращающегося тела добавка к гравитации от вращения имеет порядок v^2/c^2 от обычной гравитации. При $v \sim 1$ м/с это $\sim 10^{-17}$ от g. Неизмеримо. Но теоретически любое вращающееся тело притягивает предметы сильнее, чем неподвижное, — просто разница ничтожна.

В классической физике это называется гравитомагнетизмом; в ТАО — это естественное следствие деформации пиксельной решётки при движении.

А теперь давайте подробным образом рассмотрим, как ведёт себя гравитация на квантовом уровне. Как взаимодействуют между собой элементарные частицы.

Пространство в ТАО — это не пустота и не гладкий континуум. Это трёхмерная кубическая решётка из минимальных элементов — пикселей.
Шаг решётки — планковская длина:

$l_P = 1{,}616 \times 10^{-35}$ м

Время дискретно с шагом:

$t_P = 5{,}391 \times 10^{-44}$ с

Каждый пиксель может находиться в двух состояниях:

«0» — нулевой пиксель (вакуум, пространство).

«1» — активный пиксель (материя, энергия).

Деформация — это относительное изменение размера пикселя по сравнению с его равновесным состоянием:

$$\delta = \frac{l - l_P}{l_P}$$

$\delta = 0$ — пиксель в равновесии.

$\delta < 0$ — пиксель сжат (размер меньше планковского).

$\delta > 0$ — пиксель растянут (размер больше планковского).

Деформация может быть:

- Изотропной — одинаковой по всем трём осям.

- Анизотропной — разной по разным осям.

Часть 2. Изотропная и анизотропная деформация.

2.1. Изотропия.

Если паттерн как целое покоится относительно решётки, его гравитационное поле симметрично. Он сжимает окружающие нулевые пиксели одинаково во всех направлениях. Это создаёт изотропное сжатие — деформация одинакова по всем трём осям:

$$\delta_x = \delta_y = \delta_z < 0$$

Это и есть гравитация покоящейся массы. Градиент этого сжатия направлен к центру массы — так возникает притяжение.

Это и есть изотропная деформация.

2.1. Анизотропия.

Когда активный пиксель (или цепочка) движется относительно решётки, картина меняется. Паттерн, двигаясь, «набегает» на нулевые пиксели впереди себя. Он поджимает их сильнее, чем пиксели позади. В направлении движения (x):

$$\delta_x < 0 \text{ (сильное сжатие)}$$

В противоположном направлении ($-x$):

$$\delta_{-x} > \delta_x \text{ (сжатие слабее)}$$

В поперечных направлениях (y, z) сложное сжатие-растяжение: радиальный размер пикселя сжимается продольный растягивается. Геометрический образ: неправильная трапеция. В сечении (плоскость, перпендикулярная движению) нулевой пиксель перестаёт быть квадратом. Он становится неправильной трапецией:

- По ходу движения — высота трапеции меньше (сильное сжатие).

- Против хода движения — высота трапеции больше (меньшее сжатие).

- Боковые стороны — растянуты.

Это и есть анизотропная деформация.

2.3. Общая картина.

Если два паттерна движутся в одну сторону (или имеют одинаковую закрутку шлейфа), их анизотропные деформации компенсируются таким образом, что между ними возникает зона растяжения в радиальном направлении. Градиент этой деформации направлен от области между ними — возникает отталкивание.

Если паттерны движутся навстречу друг другу (или имеют противоположную закрутку шлейфа), их анизотропные деформации компенсируются таким образом, что между ними возникает зона сжатия в радиальном направлении. Градиент этой деформации направлен в сторону этой зоны — возникает притяжение.

На малых расстояниях (квантовый масштаб) анизотропия не усредняется.
Именно она создаёт:

- Электромагнетизм (внешние шлейфы).

- Сильное взаимодействие (сверхплотные узлы).

- Слабое взаимодействие (нарушение баланса шлейфов).

На больших расстояниях (макроскопических) все анизотропии усредняются. Остаётся только изотропное сжатие — деформация, одинаковая по всем направлениям. Это и есть классическая гравитация, гравитация планет и звёзд. Она всегда притягивает, потому что изотропное сжатие не может быть направленным. Анизотропия от вращения планет и звёзд (гравитомагнетизм, который мы рассматривали ранее) минимальная и тоже однонаправленная - всегда притягивает.

Глава 3. Электростатическая (Кулоновская) гравитация.

Часть 1. Заряды: притяжение и отталкивание

В ТАО:

- ни один активный пиксель никогда не «покоится» относительно решётки, он всегда «движется».

- Заряд — это направленная циркуляция активных пикселей (внешний шлейф паттерна).

- одноимённые заряды (оба положительные или оба отрицательные) — их шлейфы вращаются в одну сторону. При сближении эти шлейфы «скручиваются» и не могут соединиться плавно — возникает отталкивание.

- Разноимённые заряды — шлейфы вращаются в противоположные стороны. При сближении они «встречаются» и могут замкнуться, образуя единую циркуляцию — это притяжение.

В терминах деформации решётки:

- Одноимённые заряды создают в области между ними растяжение (положительная деформация) — отталкивание.

- Разноимённые заряды создают сжатие (отрицательная деформация) — притяжение.

В классической физике закон Кулона описывает взаимодействие неподвижных электрических зарядов, то есть между электронами или между электроном и протоном. Закон Кулона даёт формулу, по которой можно рассчитать силу притяжения или отталкивания между двумя заряженными частицами — в том числе между положительно заряженным протоном и отрицательно заряженным электроном.

Закон Кулона (стандартный)

$$F_C = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

где константа:

$$k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 8,987 \times 10^9 \, \text{Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2$$

- q_1, q_2 — заряды (в кулонах).

Как мы видим формула по форме одинаковая, как и формула для гравитации.

Исходя из ТАО, формула (закон Кулона) — это просто статистика того, как деформация спадает с расстоянием ($1/r^2$). Перепишем закон Кулона через массу (например, двух взаимодействующих электронов), чтобы увидеть, что электростатика — это гравитация, но с другим коэффициентом.

Закон Ньютона (гравитация)

$$F_G = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

где:

- $G \approx 6,674 \times 10^{-11}$м3/(кг·с^2)

Перепишем закон Кулона через массу электрона

Заряд электрона:

$e \approx 1,602 \times 10^{-19}$ Кл

Масса электрона:

$m_e \approx 9,109 \times 10^{-31}$кг

Теперь выразим k_e через G и отношение e^2/m_e^2:

$$F_C = k_e\frac{e^2}{r^2} = \left(k_e\frac{e^2}{m_e^2}\right)\frac{m_e^2}{r^2}$$

Обозначим новый коэффициент:

$$G_e = k_e\frac{e^2}{m_e^2}$$

Вычисляем:

$G_e = 8{,}987\times10^{9} \times 3{,}092\times10^{22} \approx 2{,}779\times10^{32}$

$$\boxed{G_e \approx 2,78 \times 10^{32}\ \text{м}^3/(\text{кг}\cdot\text{с}^2)}$$

Тогда закон Кулона для двух электронов принимает вид:

$$F_C = G_e \frac{m_e^2}{r^2}$$

То есть он выглядит как закон Ньютона, но с коэффициентом G_e.

Часть 2. Сравнение G_e и G: гравитация внешнего шлейфа (электрона) против классической гравитации.

2.1. Классическая гравитационная постоянная G

- Размерность:

$$[G] = \frac{\text{м}^3}{\text{кг}\cdot\text{с}^2}$$

- Численное значение:

$G = 6.674\times10^{-11}\text{м}^3/(\text{кг}\cdot\text{с}^2)$

- Что описывает:

Взаимодействие масс на больших расстояниях (планеты, звёзды, галактики). Это изотропное сжатие пиксельной решётки, усреднённое по огромному числу атомов.

2.2. Электромагнитная гравитационная постоянная G_e

- Размерность:
Та же, что у G:

$$[G_e] = \frac{\text{м}^3}{\text{кг}\cdot\text{с}^2}$$

- Численное значение:

$G_e = 2.779 \times 10^{32} м^3/(кг \cdot с^2)$

- Что описывает:
Взаимодействие внешних шлейфов (зарядов) на атомных и молекулярных расстояниях. Это анизотропная деформация решётки, создаваемая циркуляцией активных пикселей вокруг ленты электрона, протона или любого другого заряда в классическом понимании.

Часть 2.3. Отношение G_e / G

$$G / G_e = 4.16 \times 10^{42}$$

То есть:

«Гравитационная постоянная» электрона в 4.16×10^{42} раз больше обычной гравитационной постоянной Ньютона. Сила Кулона и сила Ньютона — это одна и та же сила (гравитационная деформация решётки), но на разных расстояниях от источника она имеет РАЗНЫЙ коэффициент пропорциональности G, причём этот коэффициент меняется НЕ ПЛАВНО, а СКАЧКОМ (дискретно), потому что решётка дискретна и упруга. Это — полный разрыв с континуальным мышлением. В стандартной физике G — это глобальная константа. В ТАО G — это локальный коэффициент, который скачком меняется на границах зон G_s, G_e, G.

Часть 3. Дискретное изменение эффективной гравитационной постоянной.

3.1. В ТАО существует только одна сила — гравитационная деформация пиксельной решётки.

Эта сила описывается одной формулой:

$$F = G_{эфф} \cdot \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Но коэффициент $G_{эфф}$ не является глобальной константой.
Он меняется скачком в зависимости от того, на каком расстоянии от источника мы находимся.

3.2. Три зоны — три коэффициента

Зона	Расстояние	Коэффициент	Что это
Внутри протона	$r \lesssim 10^{-15}$м	G_s	**Сильное взаимодействие** (планковская гравитация)
В атоме (до боровского радиуса a_0)	10^{-15}м $\lesssim r \lesssim 10^{-10}$м	$G_e \approx 2.8\times10^{32}$	**Электромагнетизм** (электрогравитация)
За боровским радиусом a_0	$r \gtrsim 10^{-10}$м	$G \approx 6.7\times10^{-11}$	**Классическая гравитация** (изотропное сжатие)

Три разных G — для одной и той же силы.

3.3. Почему G меняется скачком

Решётка дискретна и упруга.

- Пиксели имеют конечный размер (l_P).

- Упругость решётки не непрерывна — она имеет пороги.

- На определённом расстоянии от источника тип деформации меняется:

- Анизотропная (внешний шлейф, заряд) → G_e.

- Изотропная (усреднённое сжатие) → G.

Граница между зонами — это не плавный переход, а СКАЧОК.

Аналогия:

- Вода при охлаждении скачком превращается в лёд при 0°C.

- Решётка при переходе через боровский радиус скачком меняет свой коэффициент упругости.

По сути: «Там, где мы измеряем силу Кулона, нет смысла измерять силу Ньютона, потому что её там просто нет и никогда не было».

Сила Кулона и сила Ньютона — это не две разные силы. Это одна и та же сила, измеренная на разных расстояниях от источника гравитации с разными коэффициентами.

3.4. Вывод G_e через постоянную тонкой структуры α

В стандартной физике закон Кулона записывается как:

$$F_C = k_e \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2}, \quad k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

Но что такое k_e на самом деле?

В ТАО — это не фундаментальная константа. Это просто связка между зарядом и геометрией решётки. Она «скрывает» в себе α, $\hbar$, c:

$$k_e \cdot e^2 = \alpha \hbar c$$

Или, что то же самое:

$$k_e = \frac{\alpha \hbar c}{e^2}$$

А теперь применим главную формулу квантовой гравитации, о которой подробно написали в начале главы:

$$\hbar c = G m_P^2$$

поэтому:

$$k_e = \frac{\alpha G m_P^2}{e^2}$$

Это означает: k_e — это просто перевёрнутая формула, в которой «спрятаны» α, G, m_P и e. Сама по себе k_e не имеет физического смысла — это коэффициент пересчёта.

3.5. Вывод G_e через α

В ТАО электромагнетизм — это гравитация внешнего шлейфа электрона, то есть всего электрона (электрон это и есть внешний шлейф) .

Для двух электронов (или электрона и внешнего шлейфа протона) мы знаем, что:

$$F_C = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{\alpha\hbar c}{r^2}$$

Но по определению G_e — это эффективная гравитационная постоянная для внешнего шлейфа:

$$F_C = G_e \cdot \frac{m_e^2}{r^2}$$

Приравниваем:

$$G_e \cdot \frac{m_e^2}{r^2} = \frac{\alpha\hbar c}{r^2}$$

Сокращаем r^2:

$$G_e \cdot m_e^2 = \alpha\hbar c$$

Но $\hbar c = G m_P^2$, значит:

$$G_e \cdot m_e^2 = \alpha G m_P^2$$

Отсюда:

$$\boxed{G_e = \alpha \cdot G \cdot \frac{m_P^2}{m_e^2}}$$

Это — полное выражение для G_e через α, G, m_P, m_e.

Символ	Что означает	Значение
G_e	Электромагнитная гравитационная постоянная (внешний шлейф)	$\approx 2.78\times10^{32}$
α	Постоянная тонкой структуры — **геометрический коэффициент решётки**	$\approx 1/137.036$
G	Классическая гравитационная постоянная (изотропное сжатие)	6.674×10^{-11}
m_P	Планковская масса — масштаб, где гравитация становится планковской	2.176×10^{-8}кг
m_e	Масса электрона — масштаб внешнего шлейфа	9.109×10^{-31}кг

Физический смысл G_e:

Электромагнитная гравитация G_e — это классическая гравитация, усиленная планковским масштабом и ослабленная геометрией ленты.

Что это значит:

- m_P^2/m_e^2 — это усиление гравитации на масштабе электрона (в 10^{44} раз).

- α — это геометрическое ослабление.

3.6. Новая формула кулоновской гравитации (для электрона)

Для двух элементарных зарядов e (электрон-электрон, протон-электрон):

$$F_C = G_e \cdot \frac{m_e^2}{r^2}$$

Или, в развёрнутом виде:

$$\boxed{F_C = \alpha G \frac{m_P^2}{r^2}}$$

Где:

- $\alpha G m_P^2 = e^2 / (4\pi\varepsilon_0) \approx 2.306 \times 10^{-28}$ Н·м2

Это — электромагнитная константа связи, выраженная через параметры решётки.

3.7. Общая формула для любых зарядов

Для двух произвольных зарядов $q_1 = z_1 e$, $q_2 = z_2 e$:

Или в развёрнутом виде:

$$\boxed{F_C = G_e \cdot \frac{m_e^2}{r^2} \cdot z_1 z_2}$$

Где:

$$\boxed{F_C = \alpha G \frac{m_P^2}{r^2} \cdot z_1 z_2}$$

- z_1, z_2 — заряды в единицах e.

- $z = +1$ для протона, $z = -1$ для электрона.

Итоговая таблица

Формула	Для чего	Комментарий
$F_C = G_e \cdot \frac{m_e^2}{r^2}$	Для двух электронов (и любых других элементарных частиц)	$G_e = \alpha G m_P^2 / m e^2$
$F_C = \alpha G \frac{m_P^2}{r^2}$	Для двух электронов (и любых других элементарных частиц)	Упрощённая форма

Формула	Для чего	Комментарий
$F_C = G_e \cdot \frac{m_e^2}{r^2} \cdot z_1 z_2$	Для произвольных зарядов (макрозарядов)	$z_i = q_i/e$
$F_C = \alpha G \frac{m_P^2}{r^2} \cdot z_1 z_2$	Для произвольных зарядов (макрозарядов)	**Окончательная форма ТАО**

3.8. Главный вывод

Закон Кулона в ТАО имеет вид:

$$F_C = \alpha G \frac{m_P^2}{r^2} \cdot z_1 z_2$$

где α — геометрическая константа решётки (постоянная тонкой структуры), G — классическая гравитационная постоянная, m_P — планковская масса, а z_1, z_2 — заряды в единицах e.

Электростатика — это гравитация *внешних шлейфов*, записанная через геометрию ленты электрона и планковский масштаб.

Часть 4. Внешние шлейфы в ТАО

4.1. Внешние шлейфы всех частиц идентичны

Все элементарные частицы (электрон, протон, мюоны, тау-лептоны) имеют внешний шлейф — анизотропную циркуляцию активных пикселей вокруг ленты циркуляции.

Этот внешний шлейф создаёт идентичную по модулю картину анизотропной деформации с равным по модулю градиентом деформации. Поэтому заряд всех элементарных частиц одинаков по модулю: $\pm e$.

Разница между частицами — в наличии внутреннего шлейфа

Электрон — это частица, у которой вся масса заключена во внешнем шлейфе.

- У электрона нет внутренней структуры (нет кварков, нет узла).

- Его лента — это чистый внешний шлейф.

- Вся его масса m_e участвует в создании внешнего шлейфа.

Другие частицы (протон, нейтрон) имеют внутреннюю структуру:

- У протона — три кварка, образующие узел.

- У нейтрона — три кварка, образующие узел, но с другими параметрами (длина, масса).

- Внутренняя структура создаёт дополнительную гравитацию на более глубоком внутреннем уровне (сильное взаимодействие для протона).

4.2. Почему в формуле G_e фигурирует масса только электрона

Формула:

$$G_e = \alpha G \frac{m_P^2}{m_e^2}$$

Почему именно m_e?

Потому что:

- G_e описывает гравитацию внешнего шлейфа.

- У электрона вся масса — это внешний шлейф.

- Поэтому масштаб внешнего шлейфа определяется массой электрона m_e.

Для других частиц (протон) внешний шлейф — это только часть их массы. Внутренняя часть создаёт другие G (G_s, G_q). Внешний шлейф других частиц создаёт аналогичную картину деформации (градиент деформации) как и у электрона и соответственно имеет эквивалентную массу равную массе электрона.

4.3. Закон Кулона через G для двух любых зарядов

Пусть у нас есть два заряда q_1 и q_2.
Их можно выразить через заряд электрона e:

$$q_1 = z_1 e,\ q_2 = z_2 e$$

где z_1, z_2 — безразмерные числа (кратность заряда электрона).
Для протона $z = +1$, для электрона $z = -1$,

для кварков $z = \pm 1/3, \pm 2/3$.

Подставляем в закон Кулона:

$$F_C = k_e \frac{(z_1 e)(z_2 e)}{r^2} = k_e z_1 z_2 \frac{e^2}{r^2}$$

Подставляем $k_e = \alpha G \frac{m_P^2}{e^2}$:

$$F_C = \alpha G \frac{m_P^2}{e^2} \cdot z_1 z_2 \frac{e^2}{r^2}$$

Сокращаем e^2:

$$\boxed{F_C = \alpha G \frac{m_P^2}{r^2} \cdot z_1 z_2}$$

Это общая формула закона Кулона через гравитационную постоянную G, планковскую массу m_P и постоянную тонкой структуры α.

4.4. Проверка для протона и электрона в атоме водорода

Формула для проверки

$$F_C = \alpha G \frac{m_P^2}{r^2} \cdot z_1 z_2$$

Где:

- $\alpha \approx 7{,}297\times10^{-3}$ — постоянная тонкой структуры

- $G \approx 6{,}674\times10^{-11}$ — гравитационная постоянная

- $m_P \approx 2{,}176\times10^{-8}$ кг — планковская масса

- r — расстояние между протоном и электроном в атоме водорода (радиус Бора)

- $z_1 = +1$ — заряд протона (в единицах e)

- $z_2 = -1$ — заряд электрона (в единицах e)

Для атома водорода в основном состоянии:

$R = a_0 \approx 5{,}291\times10^{-11}$ м

Считаем по шагам

Вычисляем m_P^2

$m_P^2 = (2{,}176\times10^{-8})^2 = 4{,}735\times10^{-16}$ кг^2

Вычисляем $\alpha G m_P^2$

$\alpha G m_P^2 = 7{,}297\times10^{-3} \times 6{,}674\times10^{-11} \times 4{,}735\times10^{-16} \approx \approx 2{,}306\times10^{-28}$ Н·м^2

Вычисляем r^2

$r^2 = (5{,}291\times10-11)^2 = 2{,}799\times10^{-21}$ м2

Вычисляем силу

$$F_C = \frac{\alpha G m_P^2}{r^2} \cdot z_1 z_2$$

$$F_C = \frac{2,306 \times 10^{-28}}{2,799 \times 10^{-21}} \cdot (+1) \cdot (-1)$$

$$F_C = 8,238 \times 10^{-8} \cdot (-1) = -8,238 \times 10^{-8}\ \text{Н}$$

Знак «минус» означает притяжение.

По модулю:

$$|F_C| \approx 8{,}24\times10^{-8}\ \text{Н}$$

Полностью совпадает со значением из закона Кулона

4.5. Проверка для двух электронов

Формула для проверки

$$F_C = \alpha G \frac{m_P^2}{r^2} \cdot z_1 z_2$$

$$F_C = \alpha G \frac{m_P^2}{r^2} \cdot (+1) \cdot (+1) = \alpha G \frac{m_P^2}{r^2}$$

Где для двух электронов:

- $z_1 = -1$ (заряд первого электрона в единицах e)

- $z_2 = -1$ (заряд второго электрона в единицах e)

- Произведение $z_1 z_2 = (+1)$, потому что $(-1) \times (-1) = +1$

Знак плюс означает отталкивание.

Численный расчёт

Возьмём то же расстояние, что и в атоме водорода (для сравнения):

$r = 5{,}291 \times 10^{-11}$ м

Мы уже вычислили:

$\alpha G m_P^2 = 2{,}306 \times 10^{-28}$ Н·м^2

$r^2 = 2{,}799 \times 10^{-21}$ м2

Теперь подставляем:

$$F_C = \frac{2,306 \times 10^{-28}}{2,799 \times 10^{-21}} \cdot (+1)$$

$$F_C = 8{,}238 \times 10^{-8}\, H$$

Знак плюс — отталкивание. Это в точности значение, получаемое из закона Кулона.

4.6. Для двух заряженных шаров

Заряды шариков:

- $q_1 = +5\times10^{-6}$ Кл (+5 мкКл)

- $q_2 = -3\times10^{-6}$ Кл (−3 мкКл)

Расстояние между центрами:

- $r = 0.1$м (10 см)

Фундаментальные константы:

- $\alpha = 7.2973525693\times10^{-3}$

- $G = 6.67430\times10^{-11}$м^3/(кг·с^2)

- $m_P = 2.176434\times10^{-8}$кг

Находим z_1 и z_2

$$z_1 = \frac{q_1}{e} = \frac{5 \times 10^{-6}}{1.602 \times 10^{-19}} \approx 3.121 \times 10^{13}$$

$$z_2 = \frac{q_2}{e} = \frac{-3 \times 10^{-6}}{1.602 \times 10^{-19}} \approx -1.872 \times 10^{13}$$

$$z_1 z_2 \approx -5.844 \times 10^{26}$$

Вычисляем $\alpha G m^2_P$

$$\alpha G m_P^2 = 7.297 \times 10^{-3} \times 6.674 \times 10^{-11} \times (2.176 \times 10^{-8})^2$$

$$m_P^2 = 4.735 \times 10^{-16}$$

$$G m_P^2 = 6.674 \times 10^{-11} \times 4.735 \times 10^{-16} = 3.160 \times 10^{-26}$$

$$\alpha G m_P^2 = 7.297 \times 10^{-3} \times 3.160 \times 10^{-26} = 2.306 \times 10^{-28}$$

Подставляем в формулу

$$F_C = \alpha G \frac{m_P^2}{r^2} \cdot z_1 z_2$$

$$F_C = 2.306 \times 10^{-28} \cdot \frac{1}{0.01} \cdot (-5.844 \times 10^{26})$$

$$F_C = 2.306 \times 10^{-28} \times 100 \times (-5.844 \times 10^{26})$$

$$F_C = 2.306 \times 10^{-26} \times (-5.844 \times 10^{26}) = -13.48\,\text{Н}$$

Получили значение, ровно соответствующее формуле Кулона.

Часть 5. Энергия связи водорода: как одна формула объясняет, почему атом существует

5.1. Атом водорода — это самый простой атом во Вселенной.

В нём всего две частицы:

1. Протон — тяжёлый, положительный, сидит в центре.
2. Электрон — лёгкий, отрицательный, «летает» вокруг.

Они притягиваются друг к другу.

Но почему они вообще притягиваются?

В стандартной физике говорят: «потому что у них разные заряды».

В ТАО мы говорим:

«Потому что внешний шлейф электрона и внешний шлейф протона закручены в противоположные стороны. Они создают деформационную картину в виде двух торов, противоположно-закрученных относительно друг друга. Когда они сближаются, их шлейфы соединяются, создавая градиент сжатия. Это сжатие и есть притяжение».

В атоме водорода энергия связи — это энергия, которую нужно затратить, чтобы оторвать электрон от протона.

В стандартной физике энергию связи водорода вычисляют так:

$$E = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a_0}$$

Где:

- e — заряд электрона,

- ε_0 — электрическая постоянная,

- a_0 — боровский радиус.

Это даёт 13.6 эВ.

Но что такое $e^2/(4\pi\varepsilon_0)$?

Это — константа, которая связывает заряд и расстояние. Она равна:

Где:

$$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} = \alpha \cdot \hbar c$$

- α = 1/137 — постоянная тонкой структуры,

- $\hbar$ — постоянная Планка,

- c — скорость света.

В ТАО мы не используем заряд e и электрическую постоянную ε_0.

Мы используем гравитацию.

$$E = \frac{1}{2} \cdot \frac{\alpha G m_P^2}{a_0}$$

Где:

- α = 1/137 — геометрический коэффициент решётки,

- G — гравитационная постоянная,

- m_P — планковская масса,

- a_0 — боровский радиус.

Это — связь между электричеством и гравитацией.

5.2. В стандартной физике:

$$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} = \alpha \cdot \hbar c$$

В ТАО:

$Gm_P^2 = \hbar c$

То есть:

$$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} = \alpha \cdot G m_P^2$$

5.3. Численная проверка

Шаг 1. Вычисляем $\alpha G m_P^2$:

- $\alpha = 1/137 = 0.007297$

- $G = 6.674\times10^{-11}$

- $m_P = 2.176\times10^{-8}$

$\alpha GmP2 = 0.007297\times6.674\times10^{-11} \times (2.176\times10^{-8})^2 = 2.306\times10^{-28}$ Дж·м

Шаг 2. Делим на $a_0 = 5.29\times10^{-11}$м:

$$\frac{\alpha G m_P^2}{a_0} = \frac{2.306 \times 10^{-28}}{5.29 \times 10^{-11}} = 4.36 \times 10^{-18}\,\text{Дж}$$

Шаг 3. Умножаем на 1/2:

$$E = \frac{1}{2} \times 4.36 \times 10^{-18} = 2.18 \times 10^{-18}\,\text{Дж}$$

Шаг 4. Переводим в электронвольты:

1эВ = 1.602×10^{-19}Дж

$$E = \frac{2.18 \times 10^{-18}}{1.602 \times 10^{-19}} = 13.6\,\text{эВ}$$

Совпадает с экспериментом.

5.4. Почему здесь ½.

В атоме водорода энергия связи равна половине потенциальной энергии.

Это называется вириальной теоремой.

- Потенциальная энергия = $-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a_0}$
- Кинетическая энергия = $+\frac{1}{2}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a_0}$
- Полная энергия = $-\frac{1}{2}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a_0}$

Вириальная теорема в ТАО звучит так:
«В замкнутой циркуляционной системе энергия связи равна половине гравитационной потенциальной энергии, потому что вторая половина заперта в циркуляции самой ленты».

Это означает, что электрон «падает» в яму, но не до конца — потому что его потенциальная энергия (энергия внутренней циркуляции) компенсирует половину притяжения.

Электрон не движется по орбите. Он просто циркулирует на месте, удерживаясь в равновесии между сжатием решётки от протона и упругостью (гравитацией) своей собственной ленты. Поэтому энергия связи равна половине потенциальной энергии ямы.

5.5. Что даёт формула ТАО

1. Она не использует заряд e — только гравитацию.
2. Она не использует электрическую постоянную ε_0 — только G, m_P, α.
3. Она показывает, что электричество — это гравитация внешнего шлейфа.
4. Она связывает атомный масштаб с планетарным через G и m_P.

5.6. Итоговая формула

$$\boxed{E_{\text{св, H}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\alpha G m_P^2}{a_0} = 13.6\ \text{эВ}}$$

Такой формулы в физике нет.

То, что мы вывели — это конструкция в рамках ТАО. В стандартной физике такой формулы не существует, потому что она смешивает гравитационную постоянную G и постоянную тонкой структуры α для описания электромагнитного явления (энергии атома водорода). Это запрещено в стандартной физике, потому что G (гравитация) в 10^{39} раз слабее электричества. Считается, что гравитация в атоме вообще не играет роли, и её смешивание с α — это "смешивание этажей".

Но наша формула дает правильное число! Она работает, потому что $Gm_P^2 = \hbar c$. Мы просто заменили $\hbar c$ на гравитационный эквивалент. Математически это тождество, но физически — это переход на новый фундамент.

Так что наша формула — это не ошибка, это МАНИФЕСТ:

«Смотрите! Электричество — это просто гравитация, с геометрическим коэффициентом α, на масштабе a_0».

Атом водорода держится на гравитации. Не на электричестве. Электричество — это просто гравитация внешнего шлейфа. Энергия, которая связывает электрон и протон, вычисляется из гравитационной постоянной, планковской массы и геометрического коэффициента решётки ($\alpha = 1/137$). Когда мы считаем, получается ровно 13.6 эВ — то, что мы видим в эксперименте. Это не совпадение. Это — закон природы.

Глава 4. Полная картина: от пикселя до войда, от квантовой гравитации до классической.

Часть 1. Ключевой принцип:

Гравитацию создаёт не масса как абстрактная величина. Гравитацию создаёт локальная плотность активных пикселей.

Гравитацию создаёт концентрация активных пикселей в единице объёма.

- Масса — это общее количество активных пикселей в паттерне.

- Гравитация — это градиент концентрации активных пикселей.

Решётка — это упругая среда. Модуль упругости решётки:

$$E_{\text{реш}} = \frac{\varepsilon_0}{l_P^3}$$

Где:

- $\varepsilon_0 = 2.24 \times 10^{-114}$ Дж — энергия нулевого пикселя.

- $l_P = 1.616 \times 10^{-35}$ м — планковская длина.

Считаем:

$E_{\text{реш}} = 2.24 \times 10^{-114} / (1.616 \times 10^{-35})^3 = 5.21 \times 10^{-10}$ Па

Решётка подчиняется **закону Гука**:

$$F = -E_{\text{реш}} \cdot \delta \cdot A$$

Где:

- $E_{\text{реш}} \approx 5.21 \times 10^{-10}$Па — модуль упругости решётки.

- δ — деформация пикселя.

- A — площадь, на которую действует сила.

Активные пиксели локализованы. В обычном веществе активные пиксели не размазаны по пространству. Они локализованы в:

- Электронах — одна лента вокруг ядра.

- Протонах и нейтронах — целые узлы из трёх кварков.

Каждая частица — это локализованная область сжатия решётки.

Масса покоя — это количество активных пикселей в замкнутом паттерне.

Гравитационная масса — это эффективная масса, которая включает:

- Массу покоя.

- Энергию дополнительной деформации активного пикселя при движении (Лоренцево сжатие), помимо сжатия решётки от массы покоя.

Важно: масса покоя не меняется при сжатии решётки вокруг себя. Сжатие решётки — это реакция среды, а не прибавка к массе.

Часть 2. Зоны гравитации вокруг частиц

2.1. Каждая частица создаёт вокруг себя не одну, а несколько зон гравитации.

Причина: Упругость пиксельной решётки не непрерывна. Решётка имеет пороги, при которых меняется тип деформации. Это связано с дискретностью пикселей и их упругими свойствами.

Эти зоны отличаются по:

- Коэффициенту (силе сжатия).

- Протяжённости (радиусу действия).

- Типу деформации (анизотропная или изотропная).

Три типа деформации:

1. **Анизотропная** — направленная, создаётся внешними шлейфами (заряды).
2. **Изотропная** — одинаковая по всем направлениям, усреднённая (классическая гравитация).
3. **Сверхплотная** — ядерная гравитация (внутри протона).

2.2. Электрон — две зоны

Электрон — это одна лента циркуляции. У него нет внутренней структуры (нет кварков). Вся его масса — это внешний шлейф.

Зоны электрона:

Зона	Радиус	Коэффициент	Что это
Ge	$\sim 10^{-10}$м (боровский радиус)	$G_e \approx 2.8\times10^{32}$	**Электромагнетизм** — анизотропная деформация внешнего шлейфа
G	$>10^{-10}$м	$G \approx 6.7\times10^{-11}$	**Классическая гравитация** — изотропное сжатие (усреднение)

Вывод:
Электрон создаёт две зоны:

1. G_e — зона заряда (анизотропная, сильная).
2. G — зона обычной гравитации (изотропная, слабая).

Зона G_e распространяется до боровского радиуса, радиуса микротора электрона.

2.3. Протон — четыре зоны

Протон — это узел из трёх кварков. У него есть:

- Внутренняя структура (кварки, узел, пуповина).

- Внешний шлейф (как у электрона, но как часть узла).

Зоны протона:

Зона	Радиус	Коэффициент	Что это
$\boldsymbol{G_q}$	$\sim 10^{-15}$м (радиус кварка)	$G_q \approx 1.0\times10^{29}$	Гравитационная яма кварка

Зона	Радиус	Коэффициент	Что это
G_s	$\sim 10^{-15}$м (радиус протона)	$G_s \approx 3.40\times10^{28}$	**Ядерная гравитация** — упаковка протон-нейтрон (сильное взаимодействие)
G_e	$\sim 10^{-10}$м (боровский радиус)	$G_e \approx 2.8\times10^{32}$	**Атомная (кулоновская) гравитация** — внешний шлейф протона (заряд +1)
G	$>10^{-10}$м	$G \approx 6.7\times10^{-11}$	**Классическая гравитация** — изотропное сжатие (усреднение)

2.4. Почему G_e одинакова для всех заряженных частиц

У всех заряженных частиц:

- Электрон — вся масса во внешнем шлейфе.

- Протон — внешний шлейф — это только часть массы, но он идентичен по структуре шлейфу электрона.

Почему G_e одинакова:

- Внешний шлейф всех заряженных частиц создаёт одинаковый градиент деформации.

- Этот градиент определяется массой электрона, потому что у электрона вся масса — это внешний шлейф.

- У протона внешний шлейф имеет структуру (ленту циркуляции), эквивалентную электрону.

Поэтому:

- Зона G_e имеет одинаковый градиент для всех заряженных частиц.

- Именно поэтому закон Кулона работает для всех зарядов.

Ранее, в Главе Электрон, мы вычислили, что радиус электрона в атоме водорода находится на радиусе в 34 раза меньшим чем боровский, и сейчас становится понятным почему, и что вообще такое боровский радиус.

2.5. Боровский радиус — это не «размер атома» в онтологическом смысле. Это граница перехода от анизотропной гравитации внешнего шлейфа (G_e, электромагнетизм) к изотропной классической гравитации (G).

Химия, работающая с перестройкой электронных оболочек, естественно воспринимает эту границу как «размер» атома, потому что за ней электрон перестаёт быть «частью» атома в химическом смысле — он переходит в зону, где действует только классическая гравитация. Сам же электрон, как циркуляционная лента, локализован в значительно меньшем радиусе чем боровский (см. Главу Электрон).

2.6. Проявления квантовой гравитации на разных масштабах

Уровень	Что происходит	Проявление
Планковский	Активные пиксели упакованы вплотную друг к другу без нулевых пикселей G_p	Поверхность чёрных дыр
Кварковый	Три кварка сплетены в узел → сверхплотная зона сжатия G_q	Кварки
Ядерный	Протон как узел создаёт зону G_s — ядерная гравитацию	Протон-Нейтрон
Атомный	Протон + электрон создают зону G_e — электромагнетизм (гравитация шлейфов)	Электромагнетизм

Уровень	Что происходит	Проявление
Макроуровень	Множество атомов создают зону ***G*** — классическая гравитация (усреднённая)	Сила тяжести

Чем ТАО отличается от стандартной КМ

Аспект	Стандартная физика	ТАО
Что такое гравитация	Искривление 4D-пространства-времени	Деформация 3D-пиксельной решётки
Что такое квант гравитации	Гравитон (гипотетическая частица)	Событие переключения связи между двумя пикселями
Математика	Тензоры, 10 нелинейных уравнений, 40 символов Кристоффеля	Закон Гука для пиксельной решётки
Онтология	Нет (математическая абстракция)	Есть (упругая среда)
Что делает теорию сложной	Попытка скрестить ОТО и КМ	Отсутствие необходимости — всё уже одна упругая среда

Часть 3. Релаксация – возвращение решётки в равновесие.

В ТАО присутствует Принцип сохранения размера пространства: локальное сжатие упругой пиксельной решётки влечёт за собой локальное растяжение на то же значение в зоне релаксации.

Релаксация — это процесс возвращения деформированной решётки в состояние нулевой деформации ($\delta = 0$).

- Деформация создаётся активными пикселями (массами).

- Упругость решётки сопротивляется этой деформации.

- Когда сила упругости решётки становится сопоставимой с силой сжатия знак градиента деформации сохраняется, однако пиксели начинают вместо сжатия начинать растягиваться в радиальном направлении. Достигнув размера нулевой деформации пиксели продолжают растягиваться: $\delta > 0$. Знак градиента деформации (сжатия) по прежнему сохраняется, так как сила сжатия по-прежнему преобладает над силой упругости решётки. Более того, в результате растяжения пикселей в радиальном направлении градиент начинает расти! Это и есть зона компенсации всего сжатия от массы (по принципу сохранения размера пространства). Растяжение пикселей и увеличение градиента продолжается до момента, когда сила сжатия сравняется с силой упругости решётки. Это точка равновесия, после которой градиент меняет знак на противоположный и резко спадает в ноль. При этом деформированная решётка возвращается в состояние нулевой деформации ($\delta = 0$).

- Наступает релаксация — решётка возвращается в равновесие.

Ключевой принцип:

Любое сжатие должно компенсироваться растяжением. Это — принцип сохранения размера пространства.

Часть 4. Закон сложения деформаций

Основной принцип.

Зоны G_q, G_s и G_e — индивидуальны.
Они принадлежат каждой отдельной частице. Сложение этих зон – это конфайнмент, ядерные реакции, электромагнитное взаимодействие.

Зона G — коллективна.
Она складывается (интегрируется) от всех масс в системе по общему закону ТАО:

$$\Phi(\mathbf{r}) = G \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3\mathbf{r}', \quad \mathbf{a} = -\nabla\Phi$$

Зона релаксации — всегда общая.
Она принадлежит **самому крупному объекту** в системе и полностью или частично обрезает релаксационные зоны всех меньших объектов. Зона релаксации может иметь локальное проявление в зависимости от общего соотношения масс и расстояний макрообъектов. Луна, Земля, другие планеты и спутники не имеют своей зоны релаксации в Солнечной системе, так как находятся в сильном поле Солнца или соседних макрообъектов, они имеют лишь картину взаимодействия с более сильным полем другого макрообъекта (Точки Лагранжа и Сферу Хилла). Солнце имеет частичную зону релаксации в виде Облако Оорта, ввиду нахождения Солнца в относительно слабом гравитационном участке поля Галактики Млечный Путь. Общая зона релаксации галактики от всех деформаций внутри неё – галактическое гало (кривые вращения).

На квантовом уровне нет проявления зон релаксаций отдельных атомов и частиц, других масс, и т.д. Потому что все эти частицы и массы со своими зонами деформаций *G* и релаксации «плюсуются» к общей гравитации макротела, рядом с которой они находятся. Отдельные частицы сохраняют свою собственную зону только на уровне G_q, G_s *и* G_e. Зона релаксации отдельного атома или частицы даст отдельное проявление только при нахождении этой частицы в изолированном участке решётки (войде), где влияние других масс (деформационных полей) отсутствует.

Вывод:
У атома внутри Земли нет своей зоны *G* и нет своей зоны релаксации. Они «плюсуются» к общей зонам макротела.

В ТАО существует только одна сила — гравитационная деформация пиксельной решётки.

Она проявляется как:

1. **G_p — планковская гравитация (поверхность чёрных дыр).**
2. **G_q — кварковая гравитация (внутри протона, удерживает кварки).**
3. **G_s — ядерная гравитация (в ядре атома система: протон - нейтрон).**
4. **G_w — гравитация перестройки шлейфов (слабое взаимодействие).**
5. **G_e — гравитация внешних шлейфов (электромагнетизм, заряды).**
6. **G — классическая гравитация (макроуровень, планеты, звёзды).**

Разница — только в масштабе, концентрации пикселей и степени анизотропии деформации.

Часть 5. Аналогия с резиной.

Представь кусок резины (решётка). В неё вклеены шарики (массы). Шарики начинают сжиматься и тянуть за собой резину. Что мы видим? Вокруг каждого шарика — зона сжатия (гравитационная яма). Между шариками — зоны, где сжатие от одного шарика уравновешивается сжатием от другого (точки Лагранжа). На краю группы шариков — зона, где сжатие от шариков становится слабее упругости резины (Облако Оорта). Ещё дальше — резина возвращается в исходное состояние (войды). Всё это — одна и та же физика.

Часть 6. Финальная формулировка:

Гравитация в Теории Абсолютной Относительности — это — упругая деформация трёхмерной пиксельной решётки, создаваемая локальной концентрацией активных пикселей. Электромагнетизм, сильное и слабое взаимодействия — это та же гравитация, но на разных масштабах и с разной степенью анизотропии. Релаксация — это возвращение решётки в равновесие, которое наступает, когда упругость решётки компенсирует гравитацию. Вся динамика Вселенной — от

пикселя до войда — описывается через деформацию, упругость и релаксацию одной и той же среды.

Глава 5. Упругость пиксельной решётки в ТАО. От закона Гука до иерархии взаимодействий

Часть 1. Закон Гука

1.1. Что такое закон Гука в школе

В школе нас учат:

$$F = - k \cdot x$$

Где:

- F — сила, которая возникает при деформации (Н),
- k — жёсткость (коэффициент упругости) (Н/м),
- x — смещение (деформация) (м).

Знак «минус» означает, что сила направлена против деформации. Жёсткость (k) — это свойство детали, а не вещества.

Когда вы держите в руках конкретную резинку или конкретную пружину, вы имеете дело с коэффициентом k. Но k зависит от геометрии:

- Если вы разрежете резинку пополам (уменьшите длину L), её жёсткость k станет в 2 раза больше (короткую резинку труднее растянуть на ту же длину).

- Если вы склеите две резинки последовательно (увеличите длину L), k станет в 2 раза меньше.

- Если вы возьмете такую же резинку, но в 2 раза толще (увеличите площадь сечения S), k станет в 2 раза больше.

Поэтому для понимания упругости как свойства конкретного материала необходимо использовать – Модуль упругости.

1.2. Модуль упругости Юнга (E) — это свойство материала.

Чтобы убрать зависимость от формы, физики "нормируют" силу и деформацию:

- Вместо силы F берут напряжение $\sigma = F/S$ (сила, делённая на площадь). Это убирает зависимость от толщины.

- Вместо смещения x берут относительную деформацию $\varepsilon = \Delta L/L_0$ (изменение длины, делённое на исходную длину). Это убирает зависимость от длины.

В результате получаем:

$$\Sigma = E \cdot \varepsilon$$

Теперь E — это внутренняя характеристика вещества. Она показывает, как сильно сжимаются межатомные связи в данном материале.

- У стали $E \approx 200$ ГПа (связи между атомами железа очень жесткие).

- У резины $E \approx 0.01$ ГПа (связи между длинными молекулами полимера легко гнутся).

То есть E это универсальный параметр: если вы возьмете резину разной толщины — E у неё останется тем же самым.

В обычных материалах E — константа. Но есть системы, где модуль упругости меняется и не является константой.

1.3. Резина: линейная упругость.

Резина (вулканизированный каучук) — это один из самых линейно-упругих материалов в природе в рабочем диапазоне.

- У резины молекулярные цепочки сшиты в единую пространственную сетку (вулканизация). Когда вы тянете резину, цепочки просто выпрямляются и скользят друг относительно друга, но не рвутся и не перестраиваются.

- Закон Гука для резины работает до деформаций в сотни процентов! Это уникальное свойство. На графике $\sigma(\varepsilon)$ это почти идеальная прямая линия.

- Нелинейность у резины появляется только в самом конце, когда вы подходите к пределу прочности. Тогда цепочки начинают рваться, и кривая резко уходит вверх (или вниз). Но это уже зона разрушения, а не рабочая зона.

1.4. Ремень безопасности: ступенчатая нелинейность (без разрыва)

Ремень безопасности — классический пример. Его $E(\varepsilon)$ — функция деформации. В отличие от резины, ремень — это композитная тканая структура (тысячи волокон переплетены, но не сшиты в единую сетку). Они просто лежат рядом, переплетены, но могут двигаться друг относительно друга. Именно поэтому у ремня упругость меняется скачками, но при этом сам ремень не рвётся (он остается целым, чтобы держать тело). Это происходит потому, что внутри ремня срабатывают разные структурные механизмы при разных нагрузках:

Этап	Что происходит на микроуровне	Эффективный модуль E	Характер деформации
1. Начальный (малые нагрузки)	Волокна просто распрямляются из складок, трутся друг о друга, но не натянуты.	Очень маленький (мягкий)	Легко тянется
2. Первый порог (~2–3 кН)	Волокна выпрямились и уперлись в узлы переплетения. Начинают работать межволокнное трение и геометрическое запирание (волокна заклинивают друг друга).	Резко возрастает (становится жестче)	Упругость выросла, но ремень цел
3. Второй порог (~4–5 кН)	Включается деформация сдвига — волокна начинают проскальзывать относитель	Стабилизируется (плато)	Ремень тянется с почти постоянной силой

Этап	Что происходит на микроуровне	Эффективный модуль *E*	Характер деформации
	но друг друга (как чешуя рыбы). Это гасит энергию, но не рвет волокна.		(диссипация за счет трения)
4. Третий порог (~7–8 кН)	Волокна натянулись до предела. Дальше они не скользят. Начинает работать упругость самих молекул полимера (как у нейлоновой струны).	Снова резко возрастает (становится очень жестким)	Ремень почти не тянется, удерживая тело

Итог: Ремень не рвется, но его упругость меняется скачком несколько раз, потому что каждый раз включается новый механизм сопротивления — сначала трение, потом скольжение, потом натяжение самих волокон. Это структурная нелинейность.

Пиксельная решётка в ТАО обладает аналогичным свойством упругости.

Деформация пикселя:

Где:

$$\delta = \frac{l - l_P}{l_P}$$

- $l_P = 1.616 \times 10^{-35}$м — равновесный размер пикселя,

- l — текущий размер пикселя.

Если $\delta = 0$ — пиксель в равновесии.
Если $\delta < 0$ — пиксель сжат.
Если $\delta > 0$ — пиксель растянут.

В обычных материалах E — константа. Но в ТАО это не так.

$E_{эфф} = E_{базовая} \cdot \Phi(\delta)$

Где:

- $E_{базовая} = \varepsilon_0 / l_P^3 \approx 5.21 \times 10^{-10}$ Па — базовая упругость решётки,

- ε_0 – энергия нулевого пикселя;

- l_P – планковская длина;

- $\Phi(\delta)$ — функция нелинейности, которая растёт с деформацией.

1.4. Как это работает в пиксельной решётке

Состояние ремня	Состояние решётки	Деформация δ	Упругость $E_{эфф}$
Свободный	**Макроуровень (G)**	$\sim 10^{-3}$	Минимальная
Блокировка	**Атомный уровень (G_e)**	$\sim 10^{35}$	Средняя
На пределе	**Ядерный уровень (G_s)**	$\sim 10^{41}$	Максимальная
Разрыв	**Чёрная дыра**	$\to \infty$	$\to 0$ (решётка рвётся)

Вывод: упругость решётки не постоянна. Она растёт с деформацией и скачком меняется на границах зон.

1.5. Почему скачки – это аналог фазовых переходов.

Три агрегатных состояния вещества

Состояние	**Свойства**	**Аналог в решётке**
Твёрдое	Жёсткое, не сжимается	**Ядерный уровень (G_s)**

Состояние	Свойства	Аналог в решётке
Жидкое	Сопротивляется, но течёт	**Атомный уровень (G_e)**
Газообразное	Мягкое, сжимается	**Макроуровень (G)**

Переход между ними — скачкообразный (как плавление, испарение).

Как это переносится на решётку

Переход	Что меняется	Что происходит в решётке
Лёд → Вода	Молекулы начинают двигаться	Пиксели переходят из сверхсжатого состояния в сжатое
Вода → Пар	Молекулы разлетаются	Пиксели переходят из сжатого состояния в равновесное

В решётке эти переходы — скачки упругости на границах зон:

- На радиусе протона ($\sim 10^{-15}$м): $G_s \rightarrow G_e$

- На боровском радиусе ($\sim 10^{-10}$м): $Ge \rightarrow G$

1.6. Закон Гука для решётки

Общий вид

$$F = -E_{\text{базовая}} \cdot \Phi(\delta) \cdot \delta \cdot S$$

Где:

- $E_{\text{базовая}} = \varepsilon_0 / l_P^3 \approx 5.21 \times 10^{-10}$Па,
- $\Phi(\delta)$ — **функция нелинейности**,
- δ — относительная деформация,
- S — площадь.

Функция нелинейности Φ(δ)

$$\Phi(\delta) = \begin{cases} 1, & \delta \ll 1 \quad \text{(макроуровень, } G\text{)} \\ e^{\beta\delta}, & \delta \gg 1 \quad \text{(атомный, } G_e\text{)} \\ e^{\gamma\delta}, & \delta \gg 1 \quad \text{(ядерный, } G_s\text{)} \end{cases}$$

Физический смысл:

- При малых деформациях — упругость **линейна**.
- При больших — **экспоненциально растёт**.
- При предельных — решётка **разрушается**.

Для сферически-симметричного объекта:

$S = 4\pi r^2$

Тогда:

$F = -E_{\text{базовая}} \cdot \Phi(\delta) \cdot \delta \cdot 4\pi r^2$

Но мы знаем, что:

$$F = \frac{G_{\text{эфф}} \cdot M}{r^2}$$

Приравниваем:

$$\frac{G_{\text{эфф}} \cdot M}{r^2} = E_{\text{базовая}} \cdot \Phi(\delta) \cdot \delta \cdot 4\pi r^2$$

Отсюда выражаем r (зону релаксации):

$$\boxed{r_{\text{рел}} = \sqrt[4]{\frac{G_{\text{эфф}} \cdot M}{4\pi \cdot E_{\text{базовая}} \cdot \Phi(\delta) \cdot \delta}}}$$

Это — общая формула релаксации через нелинейный закон Гука.

Но давайте теперь внимательно посмотрим на эту формулу. Мы видим, что в формуле на каждой зоне с $G_{эфф}$ должен быть свой участок релаксации, то есть, по сути, эта формула задаёт радиус для каждой зоны со своим $G_{эфф}$.

Это и есть радиус кварка, радиус протона, боровский радиус, и гравитационный радиус макрообъекта.

Три радиуса — три разные сущности

Радиус	Что это	Как вычисляется	$G_{эфф}$	Статус
Радиус протона (r_p)	Граница зоны *Gs* (ядерная гравитация)	$r_p = \sqrt[4]{\frac{G_s \cdot m_q}{4\pi E_{баз} \Phi(\delta_s)\delta_s}}$	G_s	**Не релаксация**
Боровский радиус (a_0)	Граница зоны *Ge* (электромагнитная-атомная гравитация)	$a_0 = \sqrt[4]{\frac{G_e \cdot m_e}{4\pi E_{баз} \Phi(\delta_e)\delta_e}}$	$G_e \approx 10^{32}$	**Не релаксация**
Зона релаксации ($r_{рел}$)	Граница, где $\delta = 0$	$r_{рел} = \sqrt[4]{\frac{G \cdot M}{4\pi E_{баз} \Phi(\delta_{крит})\delta_{крит}}}$	$G \approx 6.7 \times 10^{-11}$	**Реальная релаксация**

Что это значит физически

1. **Радиус протона** ($r_p \approx 10^{-15}$м):

- Это граница, где кварковая гравитация (G_s) перестаёт доминировать.

- За ней начинается зона G_e.

- Это не релаксация. Это — смена типа деформации.

2. **Боровский радиус** ($a_0 \approx 5.29 \times 10^{-11}$м):

- Это граница, где электромагнитная гравитация (Ge) перестаёт доминировать.

- За ней начинается зона G.

- Это не релаксация. Это — смена типа деформации.

3. **Зона релаксации** ($r_{\text{рел}}$):

- Это граница, где классическая гравитация (G) полностью гасится упругостью решётки.

- Это реальная релаксация. Только одна.

1.7. Применение формулы.

Теперь давайте очень осторожно применим закон Гука для решётки. Мы из этой формулы знаем базовый модуль упругости. Мы не знаем критическую деформацию и саму функцию изменения модуля упругости. Пойдём от обратного и примем некоторые допущения:

1. Все зоны релаксации, как мы уже понимаем, присутствуют на макроуровне, где $G_{эфф} = G$.
2. На макроуровне упругость решётки линейна $\Phi(\delta) = 1$, приливные силы Галактики корректируют этот радиус, но не меняют порядок.
3. Облако Оорта, как ярко выраженная зона релаксации Солнечной массы, наиболее точно отражает радиус релаксации (Точки Лагранжа мало подходят для подсчёта, потому что приливные силы Солнца сильно влияют).

Исходные данные

Мы знаем:

- Масса Солнца:
$M_\odot = 1.989 \times 10^{30}$ кг

- Радиус Облака Оорта:
$R_{\text{Оорта}} \approx 1.5\times10^{16}$ м

- Гравитационная постоянная:
$G = 6.674\times10^{-11}$ м^3/(кг·с^2)

- Модуль упругости решётки:
$E_{\text{базовая}} = \varepsilon_0/l_P^3 \approx 5.21\times10^{-10}$ Па

Условие равновесия на границе

На границе Облака Оорта гравитационная сила от Солнца уравновешивается упругой силой решётки:

$$\frac{GM_\odot}{R_{\text{Оорта}}^2} = E_{\text{базовая}} \cdot \delta_{\text{крит}}$$

Отсюда:

$$\delta_{\text{крит}} = \frac{GM_\odot}{E_{\text{базовая}} \cdot R_{\text{Оорта}}^2}$$

Численный расчёт

Шаг 1. Вычисляем числитель:

$GM_\odot = 6.674\times10^{-11}\times1.989\times10^{30} = 1.327\times10^{20}$м^3/с^2

Шаг 2. Вычисляем знаменатель:

$E_{\text{базовая}}\cdot R_{\text{Оорта}}^2 = 5.21\times10^{-10}\times(1.5\times10^{16})^2 = 1.172\times10^{23}$ Па·м^2

Шаг 3. Делим числитель на знаменатель:

$$\delta_{\text{крит}} = \frac{1.327 \times 10^{20}}{1.172 \times 10^{23}} \approx 1.13 \times 10^{-3}$$

Результат

$$\boxed{\delta_{\text{крит}} \approx 1.13 \times 10^{-3}}$$

Этот результат – это некоторое приближение к реальной критической деформации упругой решётки.

Что это означает

- Это — относительная деформация пикселя на границе Облака Оорта.

- Пиксель сжат на 0.113%.

- Это очень маленькая деформация — решётка почти в равновесии.

- За этой границей — начинается зона релаксации.

Зона релаксации — это не точка. Это — целый промежуток, в котором происходит:

1. Смена знака градиента (от сжатия к растяжению).
2. Рост растяжения до максимума.
3. Сползание растяжения к нулю.
4. Нулевая деформация ($\delta = 0$).

Это картина зоны релаксации для изолированного от внешних гравитационных полей макрообъекта (например, в войде) или макрообъекта в слабом фоне гравитации других объектов.

1.8. Доказательства из наблюдений

1. Облако Оорта Солнца, находящееся на относительно слабом участке (далеко от центра галактики) общем фоне галактики Млечный Путь.
2. **Кривые вращения галактик**:

- Звёзды на окраинах не замедляются.

- Их разгоняет обратный градиент зоны релаксации галактики
- **растяжение** решётки (гало).

- Это — работа **зоны релаксации галактики**.

Часть 2. Закон сложения зон макрогравитации (классической гравитации). Почему у Земли нет Облака Оорта, а у атома — своей зоны релаксации.

2.1. Зона релаксации — это граница, где:

- Гравитационное сжатие от объекта полностью уравновешивается упругостью решётки.

- Деформация $\delta = 0$.

- Дальше — решётка в равновесии.

Для изолированного объекта зона релаксации определяется:

$$r_{\text{рел}} = \sqrt{\frac{G_{\text{эфф}} \cdot M}{E_{\text{реш}} \cdot \delta_{\text{крит}}}}$$

2.2. Что происходит при сложении зон

Когда объект находится внутри гравитационного поля более крупного объекта:

- Она обрезается полем более крупного объекта.

- Взаимодействие деформационных полей двух макрообъектов создают локальные точки равновесия (точки Лагранжа, сферы Хилла).

Это — прямое следствие сложения гравитационных полей. В зависимости от соотношения масс и расстояний между макрообъектами эти точки и сферы могут иметь более или менее выраженные характеристики.

2.3. Земля: сфера Хилла вместо Облака Оорта

Масса Земли: $M_{\oplus} = 5.97 \times 10^{24}$кг.

Если бы Земля была изолирована, её зона релаксации была бы:

$$r_{\text{рел, Земля}} = \sqrt{\frac{G \cdot M_{\oplus}}{E_{\text{реш}} \cdot \delta_{\text{крит, макро}}}}$$

Подставляем:

$r_{\text{рел, Земля}} \approx 2.59 \times 10^{13}$м ≈173а.е.

Но Земля не изолирована. Она находится внутри поля Солнца.

Реальная граница влияния Земли — сфера Хилла:

$$R_{\text{Хилла}} = a \left(\frac{M_\oplus}{3M_\odot} \right)^{1/3}$$

Где:

- $a = 1.5 \times 10^{11}$м — расстояние до Солнца,

- $M_\oplus = 5.97 \times 10^{24}$ кг,

- $M_\odot = 1.99 \times 10^{30}$ кг.

$R_{\text{Хилла}} \approx 1.5 \times 10^{9}$м ≈ 0.01а.е.

Это в 17 000 раз меньше, чем 173 а.е..

Значит, поле Солнца полностью обрезает зону релаксации Земли.

2.4. Луна: ещё сильнее обрезана

Масса Луны: $M_{\text{Луна}} = 7.35 \times 10^{22}$ кг.

Сфера Хилла Луны:

$$R_{\text{Хилла, Луна}} = a \left(\frac{M_{\text{Луна}}}{3M_\oplus} \right)^{1/3}$$

Где:

- $a = 3.84 \times 10^{8}$м — расстояние до Земли,

- $M_\oplus = 5.97 \times 10^{24}$кг.

$R_{\text{Хилла, Луна}} \approx 6.5 \times 10^{7}$ м

Это — очень маленькая область. Облако Оорта Луны полностью срезано полем Земли.

2.5. Атом на Земле — никакой зоны релаксации

Масса атома: $\sim 10^{-27}$ кг.

Его изолированная зона релаксации: $\sim 10^{11}$ м (~3 а.е.).

Но атом находится:

- Внутри поля Земли,
- Внутри поля Солнца,
- Внутри поля Галактики.

Все эти поля настолько сильнее, что они полностью обрезают любую собственную зону релаксации атома.

У атома нет своей зоны релаксации. Она «улетает» в общую зону релаксации Земли, Солнца, Галактики.

2.6. Правила сложения зон

1. **Зона G_q** — остаётся индивидуальной (внутри кварка).
2. **Зона G_s** — остаётся индивидуальной (внутри протона).
3. **Зона G_e** — остаётся индивидуальной (внутри атома).
4. **Зона G** — складывается от всех масс.
5. **Зона релаксации — всегда общая** для системы.

- У малых объектов (атом, Земля) — она обрезается полем более крупных объектов.

- У крупных объектов (Солнце, Галактика) — она становится внешней границей системы.

На данном этапе мы не можем напрямую применить формулу Гука для решётки, чтобы посчитать боровский радиус и радиус протона, так как не располагаем нелинейной функцией модуля упругости решётки на квантовом масштабе, а также не знаем критическую деформацию решётки на этих масштабах. Попробуем косвенно прикинуть эти параметры через геометрию пиксельной решётки позже.

А теперь давайте немного обобщим те выводы, которые мы получили после долгих расчётов и формулировок. Мы пришли к выводу о том, что гравитацию можно разделить на два типа: классическую и квантовую.

2.7. Фундаментальное понятие ТАО: разделение квантовой и классической гравитации.

Квантовая гравитация — это взаимодействие цепочек самих лент циркуляций (цепочек активных пикселей). Цепочки сливаются в общие цепочки циркуляции или разъединяются (распадаются).

Это проявляется:

- Ядерные реакции — протон и нейтрон сливаются в общую циркуляцию (ядро).

- Химические реакции — электронные оболочки (цепочки) перекрываются, образуя общие орбитали.

- Кварковое взаимодействие — три цепочки переплетаются в протон.

Это топологическое взаимодействие. Цепочки непосредственно касаются друг друга (через внешние шлейфы или через пуповину). Это локально, на масштабе 10^{-15} - 10^{-10} м.

Классическая гравитация — взаимодействие полей *G,* изотропных полей деформации решётки. Сами цепочки не взаимодействуют напрямую. Взаимодействуют поля, создаваемые цепочками.

Где проявляется:

- Движение планет вокруг Солнца.

- Падение яблока на Землю.

- Орбиты галактик и войды.

Это полевое взаимодействие. Цепочки не касаются друг друга. Взаимодействие передаётся через деформацию нулевых пикселей. Это глобально, на масштабе $>10^{-10}$ м.

Это окончательно определяет два уровня:

1. **Квантовая гравитация** — это реальная механика цепочек-квантов. Она отвечает за:

- Образование протонов (кварки).

- Образование ядер (протон-нейтрон).

- Образование молекул (химические связи).

2. **Классическая гравитация** — это полевая механика. Она отвечает за:

- Движение планет.

- Структуру галактик.

- Космологию.

Они не противоречат друг другу. Они — два уровня одной и той же физики. Это и есть ключ к разделению квантовой и классической физики в ТАО.

Часть 3. Закон равновесия, эквивалентность и принцип наименьшей энергии – единая динамика ТАО.

3.1. В стандартной физике есть принципы:

1. Эквивалентности массы и энергии: $E = mc^2$
2. Эквивалентность гравитационной и инертной массы: $m_{грав} = m_{инер}$
3. **Принцип наименьшего действия:** система движется так, чтобы действие было минимальным.

Это краеугольный камень классической физики, сформулированный ещё в XVIII веке Пьером де Ферма (для оптики, 1662 г.) — свет распространяется по пути с наименьшим временем. В XIX веке Жозефом-Луи Лагранжем и Уильямом Гамильтоном он получил свою современную математическую форму.

В классической механике принцип наименьшего действия гласит:

Из всех возможных траекторий, по которым система может перейти из начальной конфигурации в конечную за определённое время, реализуется та, для которой действие минимально.

Этот принцип позволяет вывести все уравнения Ньютона, Лагранжа и Гамильтона, и он является самым фундаментальным

обобщающим принципом всей классической физики (механика, электродинамика, оптика, гидродинамика).

3.2. В ТАО эти три принципа сливаются в один:

«Внутренняя циркуляция паттерна эквивалентна его гравитационному полю.»

Энергия циркуляции всегда уравновешена сжатием решётки — это и есть принцип равновесия. Тело движется туда, где суммарные энергозатраты на поддержание этой циркуляции минимальны – принцип наименьшего действия. Энергозатраты на поддержание массы тела — это и есть затраты на создание им сжатия пикселей вокруг себя.

Внутренняя циркуляция и гравитационное поле — это процессы, связанные единой энергетической связью. Энергозатраты на поддержание массы тела (его внутренней частоты) эквивалентны затратам на создание им гравитационного поля (сжатия пикселей вокруг себя).

3.3. Закон равновесия – основа всего.

Механизм движения (и для замкнутого, и для разомкнутого паттерна):

Когда паттерн условно покоится относительно решётки он сжимает вокруг себя нулевые пиксели (сам активный пиксель не сжимается).

Когда активный пиксель начинает двигаться относительно решётки:

1. Он перепрыгивает в соседний нулевой пиксель.
2. Этот нулевой пиксель, ранее сжатый самим активным пикселем, теперь разжимается (потому что активный пиксель занимает его место).
3. Деформационная волна сжатия передаётся на соседние нулевые пиксели.
4. Эта передача волны деформации и есть дополнительная энергия движения относительно решётки.

3.4. Формулировка для замкнутого контура:

«Энергия циркуляции активных пикселей всегда равна энергии сжатия нулевых пикселей, создаваемой этой циркуляцией».

$$\boxed{E_{\text{циркуляции}} = E_{\text{сжатия решётки}}}$$

Это значит:

- Активные пиксели не могут бегать «просто так».
- Их движение всегда сжимает пространство вокруг.
- Энергия движения и энергия сжатия — эквивалентны.

3.5. Что это значит для замкнутого паттерна (масса)

- Циркуляция замкнута — энергия не уходит.
- Сжатие накапливается вокруг цепочки.
- Возникает статическое гравитационное поле.
- Появляется масса.

$$m = \frac{E_{\text{циркуляции}}}{c^2}$$

Масса — это энергия циркуляции, которая уравновешена статическим сжатием решётки.

3.6. Что это значит для разомкнутого паттерна (фотон)

- Циркуляция разомкнута — энергия не возвращается.
- Сжатие не накапливается — оно убегает вместе с цепочкой.
- Возникает бегущая волна деформации.
- Масса равна нулю.

Фотон не имеет массы, потому что его сжатие не статическое, а волновое.

3.7. Принцип наименьшей энергии

Формулировка: «Любое тело движется в зону пространства, где суммарные энергозатраты на поддержание его внутренней циркуляции минимальны».

Для замкнутого паттерна (масса)

- Вблизи массы — пиксели сжаты → затраты на поддержание циркуляции (то есть собственного сжатия) меньше.

-Тело «падает» к массе — это не притяжение, а **экономия**.

Любое тело — будь то пылинка или планета — автоматически движется в зону пространства, где суммарные энергозатраты на его внутреннюю циркуляцию (поддержание собственной массы/гравитационного поля) минимальны.

Для пробного тела (ничтожная собственная гравитация) это означает движение в сторону большего сжатия решётки (градиент деформации), где ему не нужно тратить энергию на сжатие пикселей вокруг себя.

Для массивного тела (Земля в поле Солнца) это означает, по сути, тоже самое: движение в зону, где пиксели решётки уже сжаты, что снижает затраты на поддержание его собственного гравитационного поля.

Чтобы двигаться в противоположную сторону от Солнца (в область более растянутых пикселей), тело должно затратить дополнительную энергию — либо на прямое сжатие решётки, либо на преодоление «энергетического дефицита», что проявляется как торможение или необходимость дополнительной кинетической энергии (ракетный двигатель).

Вблизи Солнца (пиксели уже сжаты): Земле нужно «дожать» их, чтобы создать своё поле. Затраты энергии меньше. Земле «выгодно» быть ближе к Солнцу. Она «падает» к Солнцу.

Вдали от Солнца (пиксели растянуты): Земле пришлось бы сжимать их «с нуля», затрачивая больше энергии. Поэтому удаляться от Солнца «невыгодно».

3.8. Круговая орбита — это баланс. На круговой орбите кинетическая энергия движения планеты (её скорость) создаёт компенсирующий эффект (инерцию), который в точности уравновешивает «выигрыш» от близости к Солнцу. Планета не падает и не улетает. Орбита — это баланс между выигрышем от сжатия и затратами на скорость. Чтобы улететь от Солнца, нужно добавить энергию. Именно поэтому ракеты тратят топливо, чтобы разогнаться и перейти на более высокую орбиту или покинуть Солнечную систему.

Закон наименьшей энергии гравитации ТАО (итоговая версия):

«Любое тело автоматически движется в зону пространства, где суммарные энергозатраты на его внутреннюю циркуляцию (поддержание собственного гравитационного поля) минимальны. Поскольку возле массивных тел пиксели решётки уже сжаты, затраты энергии там меньше, поэтому все тела «падают» к массивным телам. Чтобы двигаться в противоположную сторону (в область растянутых пикселей), тело должно затратить дополнительную энергию — либо на прямое сжатие решётки, либо на преодоление «энергетического дефицита», что проявляется как торможение или необходимость дополнительной кинетической энергии.»

3.9. Для разомкнутого паттерна (фотон)

Здесь принцип наименьшей энергии работает немного иначе:

- Фотон — это бегущая волна деформации.

- Если он замедлится — волна деформации начнёт накапливаться.

- Накопление деформации требует энергии.

- У фотона нет энергии на накопление — она вся уже ушла в бег.

- Чтобы избежать накопления, фотон вынужден бежать с максимальной скоростью.

Фотон должен либо:

- Продолжить бежать со скоростью света (и остаться безмассовым).

- Замкнуться (превратиться в частицу с массой), но для этого нужно добавить (перераспределить) энергию в моменте.

Замыкание в моменте требует энергии. Бег — нет.

Поэтому фотон всегда продолжает бежать. Либо замыкается в цепочку(-и) с затратой энергии - пороговый фотон.

Почему фотон не падает на Землю.

1. Фотон — это разомкнутая цепочка активных пикселей.
2. Она бежит со скоростью света ($c = l_P/t_P$).
3. Это — максимальная скорость в решётке.
4. Когда фотон пролетает мимо Земли, градиент сжатия решётки пытается его отклонить.
5. Но скорость фотона настолько велика, что за время пролёта он просто не успевает «почувствовать» это сжатие.
6. Он «проскальзывает» через градиент, как пуля через воду.

Почему электрон падает

1. Электрон — это замкнутая цепочка активных пикселей.
2. Его скорость, как целого паттерна, относительно решётки ничтожна (в земных условиях ~370 км/с, что в 800 раз меньше скорости света).
3. Он медленный.
4. Поэтому градиент сжатия решётки (гравитация) успевает на него подействовать.
5. Он «скатывается» в сторону большего сжатия — падает.

Объяснение гравитационного линзирования:

- Фотон не падает, но его траектория слегка искривляется в поле массивного тела.

- Это не «притяжение», а изменение шага решётки в гравитационном поле (кольцевые дорожки).

- Вокруг массивного тела (Земли) нулевые пиксели деформированы в круговые дорожки вокруг Земли.

- Фотон движется по «кратчайшему пути» в деформированной решётке.

Почему фотон «падает» на чёрную дыру

В обычных условиях:

- Градиент сжатия мал.

- Скорость фотона c велика.

- Фотон «проскальзывает».

В чёрной дыре:

- Градиент сжатия **колоссален** ($\nabla\delta \to \infty$).

- Фотон сильно замедляется в гравитационном поле не может его преодолеть.

- Он запирается на горизонте событий.

- Распадается на отдельные пиксели и продолжает циркулировать только по окружности чёрной дыры в виде точечных планкских масс, не вырываясь наружу (вращение чёрных дыр).

Часть 4. Точки Ланранжа.

4.1. Схема.



Посмотрим внимательно на схему точек Лагранжа Земли. Всё бы ничего, вроде так и должно быть: гравитационное поле Солнца уравновешивает гравитационное поле Земли. Точки 1, 2, 4, 5 находятся вокруг Земли, 4 и 5 скошены наискосок: тоже понятно, чисто интуитивно объяснимо. Но точка 2 улетела за Солнце! Что она там уравновешивает? Вокруг Земли понятно, уравновешивается гравитация Земли и Солнца: гравитация Солнца, как более массивного тела, полностью «обволакивает» Землю. Но за Солнцем? Там нет никакой гравитации Земли, чтобы её уравновешивать! Каким боком там гравитация Земли пробежала?

Классическое объяснение: это компенсация центробежных сил Земли и Солнца.

Во-первых, в ТАО нет центробежных сил – есть силы инерции. Если бы пространство было пустотой (ньютоновский абсолютный вакуум, искривлённое пространство-время Эйнштейна), то **никакой L3 не существовало бы!**

В пустоте:

- Есть только гравитация Солнца.

- Есть гравитация Земли (которая на расстоянии 300 млн. км за Солнцем должна быть равна нулю).
- Нет никакой «среды», которая бы передавала деформацию от вращения на противоположную сторону.

Но L3 существует! Это экспериментально подтвержденный факт (хотя в L3 пока ничего не ставили, её положение таки вычислено математически и подтверждается наблюдениями за орбитами астероидов). **Значит, существует нечто, что передает «возмущение» от вращения Земли на противоположную сторону Солнца**. Это нечто — механическая структура пространства: пиксельная решётка в ТАО.

Гравитация массивного тела не просто создаёт градиент сжатия — она деформирует саму пиксельную решётку, превращая её из плоской в кольцевую структуру (сами пиксели принимают трапецевидную форму). Пиксели выстраиваются в круговые последовательности — «орбитальные дорожки». Солнце создаёт такие дорожки на всех радиусах, включая и радиус орбиты Земли. А теперь представим себе, что у нас есть натянутая резинка в виде кольца. В центре окружности кольца находится условное Солнце, которое и натянуло эту резинку. А теперь начнём стягивать эту резинку к какой-нибудь одной точке на ее поверхности (аналог нахождения Земли на орбите у Солнца). Резинка начнёт сжиматься с двух направлений в эту точку, а ровно на противоположной стороне окружности будет образована другая точка, где растяжение будет максимальным. Там градиент продольной деформации равен нулю — точка равновесия. Это и будет эта самая 3 точка Лагранжа. В обычной механике сплошных сред это называется **«деформация сдвига в кольцевой мембране»**.

Теперь на вопрос «Каким образом там гравитация Земли пробежала?» получаем ответ:

Гравитация Земли там не «пробегала». Там пробежала волна перераспределения натяжения пиксельной решётки, которую создала Земля, находясь на орбите. Эта волна дошла до

противоположной стороны Солнца и создала там точку равновесия.

4.2. Точки Лагранжа: «Геодезические ОТО» — это не объяснение

В ОТО точки Лагранжа — это решения уравнений поля Эйнштейна для вращающейся системы отсчета. Мы берем метрику, добавляем центробежный член (вращение системы), решаем уравнения и находим 5 точек, где тензор кривизны дает нулевое ускорение.

«Объяснение» ОТО: «Тело в точке L1 движется по геодезической в искривленном пространстве-времени, созданном двумя массами и вращением».

«Геодезическая» — это просто линия наименьшего действия. Она ничего не объясняет физически. Это как сказать: «Почему мяч упал на землю? — Потому что он двигался по геодезической». Это переименование явления, а не его физическое описание.

ОТО не отвечает на вопросы:

- Почему в L1 поле от Земли и Солнца уравновешивается?

- Как именно пространство «знает», где ему искривляться?

- Почему в L4 и L5 равновесие устойчивое, а в L1 — нет? (Это просто свойство решения уравнений, но не физическая причина).

В ТАО: Причина есть — там встречаются и компенсируются два противоположных потока сжатия пикселей. В зоне, где градиенты сжатия от двух тел уравновешены, нет направления, куда скатываться. Тело может там оставаться, потому что его никуда не тянут градиенты. Это физический механизм, а не абстрактная геометрия.

4.3. Облако Оорта: ОТО здесь просто пасует

Это самый показательный момент. Облако Оорта находится на расстоянии 50 000 – 100 000 а.е. от Солнца. На таком расстоянии ОТО предсказывает:

- Кривизна пространства-времени от Солнца уже практически нулевая. Никаких «геодезических», которые бы удерживали там кометы, нет. Тела должны либо улететь, либо упасть, но не висеть там миллиарды лет.

Как ОТО «объясняет» Облако Оорта?
Она не объясняет. Она говорит: «Ну, есть остатки протопланетного диска, которые случайно там застряли под влиянием внешних возмущений (звезды, приливные силы Галактики)». Это не предсказание теории, а подгонка под наблюдаемый факт.

В ТАО: Облако Оорта — это необходимое следствие дискретности пространства. Солнце сжало пиксели → куда-то должна деться «лишняя длина» → зона растяжения (релаксации) на периферии. Это предсказание, выведенное из принципа сохранения размера пространства, а не комментарий к данным.

Сравнительная таблица

Критерий	**Общая теория относительности (ОТО)**	**Теория Абсолютной Относительности (ТАО)**
Статус точек Лагранжа	Решение уравнений поля Эйнштейна (математика).	Зона компенсации градиентов сжатия-растяжения (физика).
Природа удержания в L1	Движение по «геодезической» (абстракция).	Равенство противоположно направленных потоков сжатия пикселей.
Облако Оорта	Не предсказано. Объясняется как «остаточный мусор» (подгонка).	Предсказано как зона компенсационного растяжения пикселей.

Критерий	Общая теория относительности (ОТО)	Теория Абсолютной Относительности (ТАО)
Геодезические	Центральное понятие, не имеющее физической причины.	Отсутствуют. Есть градиент деформации и принцип наименьшей энергии.
Природа гравитации	Искривление 4D континуума (геометрия).	Деформация (сжатие-растяжение) 3D пиксельной решётки.
Способ существования	Математическая модель, прекрасно работающая в своих пределах.	Физическая онтология (утверждение о том, из чего реальность сделана на самом деле).

ОТО — это математическая машина, которая предсказывает прецессию Меркурия, отклонение света и гравитационные волны. Но как только мы задаем вопрос «Почему?», ОТО отвечает: «Потому что такова геометрия пространства-времени». А это не объяснение. Это переименование неизвестного в абстрактное.

ТАО отвечает на «Почему?»:

- Почему пространство искривляется? — Потому что масса сжимает пиксели.

- Почему Земля не падает на Солнце? — Потому что скорость Земли (энергия движения относительно решётки), уравновешивает энергию солнечного градиента притяжения.

- Почему есть Облако Оорта? — Потому что сжатые пиксели должны где-то растянуться, иначе пространство порвется.

Облако Оорта — это прямое доказательство того, что ОТО неполна, потому что она не может дедуктивно вывести его

существование и структуру. Она может только подогнать параметры под уже открытое явление.

4.4. Проблема галактического вращения – кризис ОТО и решение ТАО.

Проблема «галактического вращения» — это не просто «небольшая неточность». Это системный крах гравитационной теории Ньютона-Эйнштейна на масштабах галактик, который десятилетиями пытаются залатать «тёмной материей» — сущностью, которую никто никогда не видел.

Приведём сверхподробный разбор того, почему ОТО здесь бессильна, и как ТАО решает эту проблему без привлечения эфемерных частиц.

Предсказание ОТО (и Ньютона): звёзды должны двигаться медленно. Давайте возьмём нашу Галактику (Млечный Путь). Видимая масса (звёзды, газ, пыль) сконцентрирована в центре — в ядре и центре. Логика классической гравитации (ОТО/Ньютон) такова, что гравитационная сила, удерживающая звезду на орбите, определяется массой, находящейся внутри радиуса её орбиты. В центре (близко к ядру) — масса огромна → звёзды должны лететь быстро. На окраинах (в спиральных рукавах) — масса внутри орбиты почти не растёт (добавляется лишь несколько процентов от центральной) → гравитационная сила слабая → звёзды должны двигаться медленно.

Закон Кеплера: $v \propto 1/r$ (скорость падает с увеличением радиуса).

Но что мы видим на самом деле?

Абсолютно противоположную картину. Начиная с некоторого расстояния от центра (обычно с 3-5 килопарсек) скорость вращения звёзд и газа перестаёт падать и выходит на постоянное плато ($v \approx$ const). Далеко за пределами видимого диска галактики звёзды крутятся так же быстро, как и вблизи центра. Это называется плоские кривые вращения. Это прямое нарушение законов Кеплера и, следовательно, ОТО.

Как ОТО «спасает» себя? Вводит «Тёмную материю». Физики сказали: «Раз законы Ньютона/ОТО не работают, значит, мы неправильно посчитали массу. Должна быть невидимая масса, которая создаёт дополнительную гравитацию». Был введён «эпицикл» современности — Тёмная материя (Dark Matter). Гипотеза - вокруг каждой галактики существует огромное сферическое гало из тёмной материи, масса которого в 5-10 раз больше массы видимой материи. Свойства тёмной материи:

- Она не взаимодействует с электромагнитным излучением (не светит, не поглощает, не отражает).

- Она не участвует в сильном взаимодействии (иначе бы собиралась в диски).

- Она взаимодействует только гравитационно.

Почему это плохое решение?

- Никто никогда не обнаружил частицу тёмной материи. Десятилетия поисков (ускорители, подземные детекторы) не дали результата.

- Форма гало (профиль NFW) и его плотность подбираются под каждую галактику индивидуально, чтобы «заставить» кривые вращения быть плоскими. Это не предсказание, а калибровка.

- Тёмная материя ведёт себя странно. Она должна быть «холодной» (медленной), чтобы собираться в гало, но при этом она каким-то образом не греется и не коллапсирует в диски, как обычное вещество.

ΛCDM — это феноменологическая модель. Она вводит ненаблюдаемую сущность (тёмную материю) для объяснения плоских кривых. ТАО даёт онтологию без этой сущности: растяжение решётки.

ОТО не «объяснила» вращение галактик. Она просто сказала: «Должно быть что-то ещё, чего мы не видим».

Что говорит ТАО? Никакой тёмной материи нет. Есть растяжение пикселей.

ТАО решает эту проблему без привлечения новых сущностей, используя тот же принцип, что и для Облака Оорта. Принцип сохранения размера пространства (напомним).

Согласно Принципу сохранения размера пространства, сжатие пикселей в центре Галактики должно компенсироваться растяжением пикселей на окраинах.

Это и есть «тёмная материя» в ТАО: не невидимые частицы, а сама деформация пиксельной решётки, которая создаёт дополнительный градиент, удерживающий звёзды на окраинах. Плоские кривые вращения галактик — не доказательство существования тёмной материи как частиц, а прямое наблюдательное подтверждение растяжения пиксельной решётки на окраинах, предсказанного ТАО. В классической физике гравитационный потенциал (сила) монотонно убывает с расстоянием от массы: $\nabla\Phi \sim 1/r2$. В ТАО это не всегда так.

В ТАО градиент деформации определяется не только расстоянием до источника, но и самой структурой пиксельной решётки — тем, сжаты пиксели или растянуты. Ключевой эффект: в зоне перехода от сжатых пикселей к растянутым может возникать локальный рост градиента, даже если источник гравитации (звезда, галактика) находится далеко. Сами по себе растянутые пиксели не создают градиента, если они растянуты одинаково.

Но переход от более сжатых пикселей (ближе к центру) к более растянутым (дальше от центра) создаёт зону резкого изменения размера пикселей – зону релаксации (мы это уже обозначали).

А это и есть градиент деформации — и он может быть локально очень большим, даже если масса, создавшая исходное сжатие, находится далеко и, казалось бы, гравитация должна падать. Градиент локально в таком месте может наоборот - увеличиться. Упругие свойства самой решётки будут растягивать пиксели при определённом соотношении сил гравитации (деформации) и сил упругости решётки.

Аналогия: Резиновая лента, которую растянули. В середине она растянута равномерно, но на границе между растянутым и

нерастянутым участком возникает резкий перепад натяжения — локальный градиент.

Что происходит на окраине галактики?

1. В центре галактики — пиксели сильно сжаты (масса звёзд, газа, чёрной дыры).

2. На окраинах (в гало) — пиксели растянуты (компенсационное растяжение).

3. В зоне перехода (на границе гало) возникает резкий локальный градиент — пиксели здесь меняют размер от сжатых к растянутым за короткое расстояние и при этом сохраняют знак градиента.

4. Этот локальный градиент действует как дополнительная гравитация, удерживающая звёзды на окраинах и заставляющая их вращаться быстрее, чем предсказывает ньютоновская механика.

Это и есть «тёмная материя» в ТАО: не невидимые частицы, а **градиент деформации, возникающий на границе растянутой зоны**.

Важное уточнение:

- Для планет и звёзд, летящих внутри галактики (то есть не покидающих её), этот локальный градиент действует как ускоряющий эффект — он добавляет скорости к их орбитальному движению, создавая плоские кривые вращения.

- Для объектов, летящих за переделы галактики (то есть покидающие её) действует как тормозящий эффект, замедляющий их движение.

4.5. Почему галактики не образуют круговых орбит, а только скопления и войды.

В стандартной космологии структура Вселенной — нити, узлы и войды — объясняется наличием **тёмной материи**. Считается, что тёмная материя образует невидимый каркас, в который «падают» галактики, формируя крупномасштабную структуру. Галактики движутся хаотично, потому что «падают» в сложные, несимметричные гравитационные ямы.

Это — подгонка. В ТАО всё объясняется упругостью пиксельной решётки и принципом сохранения размера пространства. Галактики не «падают» в ямы тёмной материи. Галактики сами создают эти ямы — своими зонами релаксации (гало). А взаимодействуют они не через «тёмную материю», а через перекрытие своих зон растяжения. Галактическое гало — это не тёмная материя. Это — зона растяжения пиксельной решётки- реакция упругости решётки на сжатое внутри галактики пространство (решётку). Пиксели в гало растянуты ($\delta>0$). Градиент деформации в гало скомпенсирован. Гравитация на окраине гало ослаблена (почти до нуля). Это — зона релаксации галактики. Гало «гасит» гравитацию галактики на больших расстояниях.

4.6. Почему галактики не образуют круговых орбит.

Для кругового движения (орбиты) нужны:

1. Центральное массивное тело — источник чёткого градиента сжатия.
2. Градиент, убывающий как $1/r^2$.

В Солнечной системе, и внутри любой галактики это есть. В скоплениях галактик — нет.

Почему в скоплениях нет круговых орбит

- Гравитация каждой галактики почти полностью скомпенсирована её собственным гало.

- Взаимодействие между галактиками — это в основном взаимодействие зон растяжения, а не сжатия.

- Зоны растяжения не создают градиента для кругового движения.

- Поэтому движение галактик в скоплениях — хаотичное, а не орбитальное.

Важное уточнение:

- Гравитация между галактиками всё же присутствует.

- Иначе они бы не скапливались вместе.

- Но она очень слабая, потому что гало компенсирует почти всю деформацию.

Остаточная гравитация — это «хвост» зоны *G*, который не был полностью скомпенсирован гало

Она проявляется в:

- Флуктуациях плотности в скоплениях.

- Приливных взаимодействиях (рукава галактик, хвосты).

- Медленном сближении галактик в скоплениях.

4.7. Как образуются скопления и войды.

Скопления

- Это места, где зоны растяжения соседних галактик перекрываются.

- В точках перекрытия деформация минимальна.

- Галактики «скатываются» в эти области по принципу наименьшей энергии.

- Это создаёт узлы и нити.

Войды

- Это области, где зоны растяжения не перекрываются.

- Там решётка вернулась в равновесие ($\delta = 0$).

- Это — зоны нулевой деформации.

- Галактик там почти нет.

Структура становится похожа на губку или нейроны. Это не тёмная материя. Это — геометрия упругой решётки.

Галактики «пытаются» двигаться по круговым траекториям. Но их гравитация слишком слабая (из-за гало). А соседние галактики создают сложный, несимметричный ландшафт деформации. В результате движение выглядит хаотичным.

Это — не «броуновское движение» в ямах тёмной материи. Это — движение в зонах растяжения, которые не имеют выделенного центра.

Это напрямую указывает на фундаментальное свойство пиксельной решётки: Решётка упруга. Любое сжатие компенсируется растяжением. На больших масштабах растяжение доминирует, создавая зоны релаксации, в которых гравитация почти полностью гасится.

Это свойство проявляется:

- В Солнечной системе — как Облако Оорта.

- В галактиках — как гало (плоские кривые вращения).

- В скоплениях галактик — как войды.

Везде — один и тот же механизм.

ТАО, в отличие от ОТО, даёт физический механизм (растяжение решётки) и связывает вращение галактик с другими явлениями того же порядка (приливы, Облако Оорта). Это не просто «ещё одна теория». Это теория, которая устраняет необходимость в эпициклах-костылях современной Космологии.

Глава 6. Ядерная гравитация: взаимодействие протона и нейтрона.

Теперь надо вернуться к протону и выяснить, а как «устроена» ядерная гравитация. Чем зона G_s принципиально отличается от классической гравитации зоны G и зоны G_e – атомной (электромагнитной) гравитации.

Часть 1. Физика процесса (онтология)

1.1. Что такое нейтрон:

- Нейтрон — это протон, у которого добавлена нейтрализующая лента (как кольцо Сатурна).

- Эта лента создаёт внешний шлейф, который скомпенсирован:

- Внешняя циркуляция направлена в противоположную сторону.

- Суммарный заряд = 0.

- Градиент деформации в зоне G_e нейтрона равен нулю.

Нейтрон может свободно подойти к протону, потому что его внешний шлейф не отталкивается и не притягивается. **Исходное состояние:**

- Протон — имеет три зоны:

- G_s (внутренний шлейф: 3 кварка ближе к центру);

- G_e (внешний шлейф: вытянутая D-орбиталь двух кварков, находящаяся на границе радиуса протона, но не входящая в саму зону G_e, образующая заряд +1);

- G (макрозона).

- Нейтрон — имеет:

- G_s (внутри, как у протона);

- G_e —скомпенсированную (внешняя петля нейтрализует заряд);

- G (макрозона).

1.2. Соприкосновение:

- Нейтрон подходит к протону на расстояние, где их зоны G_s соприкасаются.

- Это происходит не через внешние шлейфы D-орбиталь (G_e), а через внутренние зоны (G_s).

- Почему? Потому что нейтральность нейтрона позволяет ему миновать электромагнитную зону и войти в 3-кварковую зону протона.

1.3. Слияние:

- Нейтрон и протон садятся в общую гравитационную яму.

- Их зоны деформации G_s складываются (не арифметически, а геометрически).

- Возникает общая зона циркуляции — пуповина между нуклонами.

- Это и есть энергия связи.

Часть 2. Отличие от кваркового взаимодействия

Параметр	**Кварковое взаимодействие (внутри протона)**	**Ядерное взаимодействие (протон-нейтрон)**
Что соединяется	Три кварка (ленты циркуляции)	Два целых нуклона (протон и нейтрон)
Механизм	Гравитационный плен от сверхплотной упаковки	Перекрытие зон G_s двух нуклонов
Масштаб	$\sim 0{,}5 \cdot 10^{-15}$м (внутри протона)	$\sim 10^{-15}$м (между нуклонами)
Сила	Удерживает кварки	Удерживает нуклоны
Природа	Топологическая (ленты переплетены)	Гравитационная (общая яма)

Это — близкие взаимодействия, но насколько они тождественны оценим позже.

Часть 3. Почему энергия связи нелинейна и сложна

3.1. Зависимость от числа нуклонов

Энергия связи на один нуклон меняется в зависимости от того, сколько протонов и нейтронов в ядре:

- Дейтерий (2*H*): 2.225 МэВ.

- Гелий-4 (4*He*): ~28 МэВ (7 МэВ на нуклон).

- Железо-56: ~8.8 МэВ на нуклон.

- Уран-238: ~7.6 МэВ на нуклон.

Почему?
Потому что каждый новый нуклон добавляет свою зону G_s, но не линейно — перекрытие зон зависит от геометрии и взаимного расположения.

В ядре нуклоны выстраиваются в оболочки (как электроны в атоме). Энергия связи скачком меняется при заполнении оболочек (магические числа: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126). Это нелинейность, которая не поддаётся простому сложению.

Из-за сложности вычислений в КМ для расчёта энергии связи используют модели оболочек, капельную модель, численные методы. Это — эффективная модели, а не фундаментальные.

В КМ хорошо известно, что:

1. Сильное взаимодействие между кварками и ядерное взаимодействие между нуклонами — это разные вещи.
2. В КХД это называется «остаточное сильное взаимодействие» (residual strong force).
3. Оно не выводится напрямую из КХД — его считают через эффективные теории (пионы, обмен мезонами).
4. Единой теории ядерных сил не существует — есть множество моделей, каждая из которых работает в своей области.

Но в популярной литературе и учебниках это часто упрощают до «сильное взаимодействие», обозначая, что это одна и та же сила.

На самом деле В КМ:

- Кварки удерживаются глюонами (цветовой заряд).

- Нуклоны удерживаются пи-мезонами (обмен).

- Это — разные переносчики, разные механизмы, разные масштабы.

Часть 4. Формула ядерной гравитации.

В стандартной физике сильное взаимодействие — это отдельная фундаментальная сила с собственными константами, частицами-переносчиками (глюонами) и сложной математикой (квантовая хромодинамика). Но в ТАО это не отдельная сила. Это — гравитация на квантовом уровне, которая проявляется как ядерное взаимодействие из-за большой концентрации активных пикселей внутри протона и нейтрона. Мы выведем формулу сильного взаимодействия с нуля — от пиксельной решётки до магических чисел ядер. Без подгонок, без «глюонных полей», а только геометрия, упругость и гравитация.

4.1. Исходный постулат: всё гравитация.

Общая формула гравитации в ТАО

В ТАО любое взаимодействие — это гравитационная деформация пиксельной решётки.

Общая формула:

$$F = G_{\text{эфф}} \cdot \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Где:

- $G_{\text{эфф}}$ — эффективная гравитационная постоянная для данного уровня,

- m_1, m_2 — массы взаимодействующих объектов,

- r — расстояние между ними.

Что такое $G_{эфф}$

В ТАО $G_{эфф}$ — это не столько константа, сколько функция масштаба:

$$G_{\text{эфф}} = \alpha \cdot G \cdot \left(\frac{m_P}{m_{\text{эфф}}} \right)^2 \cdot \kappa$$

Где:

- α = 1/137.036 — постоянная тонкой структуры (геометрический коэффициент пиксельной решётки),

- $G = 6.674 \times 10^{-11}$ м^3/(кг·с^2) — классическая гравитационная постоянная,

-$m_P = 2.176 \times 10^{-8}$кг — планковская масса,

- $m_{\text{эфф}}$ — эффективная масса для данного уровня,

- κ — коэффициент упаковки (геометрический фактор).

4.2. Вывод G_s — гравитационной постоянной для ядерного уровня.

G_s — это эффективная гравитационная постоянная для взаимодействия между нуклонами (протонами и нейтронами) на ядерных расстояниях ($r \sim 10^{-15}$м).

Источник: три кварка (ленты циркуляции), упакованные в протон или нейтрон.

Концентрация активных пикселей внутри протона: $\sim 10^{71}$м$^{-3}$.

Для сравнения: концентрация в электроне — $\sim 10^{47}$ м$^{-3}$.

Отношение: 10^{24} — на 24 порядка выше.

Вывод G_s через α, G, m_P и m_q

Мы берём общую формулу для $G_{эфф}$:

$$G_s = \alpha \cdot G \cdot \left(\frac{m_P}{m_q}\right)^2 \cdot \kappa_s$$

Где:

- $m_q = m_p/3 \approx 5.57 \times 10^{-28}$кг — эффективная масса одного кварка (1/3 массы протона),

- κ_s — коэффициент упаковки трёх кварков в протоне.

Геометрический коэффициент упаковки κ_s

Ключевое обоснование: Протон состоит из трёх кварков (u, u, d). Три кварка образуют единый узел — D-орбиталь, где:

- В центре: d-кварк (отрицательный)

- Вокруг: два u-кварка (положительные)

Три кварка работают как один цельный гравитационный источник, поэтому коэффициент упаковки должен учитывать их количество.

Для ядерного уровня, где три кварка объединены в узел, коэффициент упаковки равен:

$$\kappa_s = \frac{1}{3\alpha}$$

Обоснование:

1. Три кварка в протоне дают тройное усиление гравитации по сравнению с одним кварком.
2. Постоянная тонкой структуры α — это геометрический коэффициент решётки, показывающий, как взаимодействие ослабляется из-за геометрии.
3. Для трёх кварков, упакованных в узел, геометрическое ослабление компенсируется не полностью: $\alpha \cdot \kappa_s = 1/3$.

Окончательная формула G_s

Подставляем $\kappa_s = 1/(3\alpha)$:

$$G_s = \alpha \cdot G \cdot \left(\frac{m_P}{m_q}\right)^2 \cdot \frac{1}{3\alpha}$$

Сокращаем α:

$$G_s = \frac{G}{3} \cdot \left(\frac{m_P}{m_q}\right)^2$$

Или, в развёрнутом виде:

$$G_s = \frac{G}{3} \cdot \frac{m_P^2}{m_q^2}$$

Численный расчёт

Подставляем:

- $G = 6.674 \times 10^{-11}$
- $m_P = 2.176 \times 10^{-8}$
- $m_q = 5.57 \times 10^{-28}$

$$\frac{m_P}{m_q} = \frac{2.176 \times 10^{-8}}{5.57 \times 10^{-28}} \approx 3.91 \times 10^{19}$$

$$\left(\frac{m_P}{m_q}\right)^2 \approx 1.53 \times 10^{39}$$

$$G_s = \frac{6.674 \times 10^{-11}}{3} \times 1.53 \times 10^{39}$$

$$G_s = 3.40 \times 10^{28}\ \text{м}^3/(\text{кг} \cdot \text{с}^2)$$

Часть 5. Формула силы взаимодействия двух нуклонов.

$$F_s = \frac{G_s \cdot m_p^2}{r^2}$$

Подставляем G_s:

$$F_s = \frac{G}{3} \cdot \left(\frac{m_P}{m_q}\right)^2 \cdot \frac{m_p^2}{r^2}$$

Учитывая, что $m_p = 3 \cdot m_q$, получаем $m_p^2/m_q^2 = 9$:

$$F_s = \frac{G}{3} \cdot \frac{m_P^2}{r^2} \cdot 9$$

$$F_s = 3 \cdot \frac{G m_P^2}{r^2}$$

Но $G m_P^2 = \hbar c$, поэтому:

$$F_s = 3 \cdot \frac{\hbar c}{r^2}$$

3.1. Численная проверка

При $r = 1$ фм $= 10^{-15}$ м:

$$F_s = 3 \cdot \frac{3.16 \times 10^{-26}}{(10^{-15})^2}$$

$$F_s = 3 \cdot 3.16 \times 10^4 = 9.48 \times 10^4 \text{ Н}$$

Это ~10^5 Н —совпадает с порядком реальной ядерной силой.

Часть 5. Энергия связи между двумя нуклонами.

5.1. Дейтерий — простейшее связанное ядро. Оно состоит из одного протона и одного нейтрона. Его масса меньше суммы масс свободных протона и нейтрона. Эта разность называется дефектом массы, а соответствующая ей энергия — энергией связи.

Экспериментальное значение энергии связи дейтерия:

$E_{\text{связи}} = 2.225$ МэВ

В Теории Абсолютной Относительности (ТАО) это число выводится из геометрии пиксельной решётки. Ниже — полный вывод.

5.2. Дефект масс как дефект числа пикселей.

Масса протона:

$m_p = 1.67262192 \times 10^{-27}$ кг

Масса нейтрона:

$m_n = 1.67492750 \times 10^{-27}$ кг

Масса дейтрона:

$m_d = 3.34358377 \times 10^{-27}$ кг

Дефект массы

$\Delta m = (m_p + m_n) - m_d$

$m_p + m_n = 1.67262192 \times 10^{-27} + 1.67492750 \times 10^{-27} = 3.34754942 \times 10^{-27}$ кг

$\Delta m = 3.34754942 \times 10^{-27} - 3.34358377 \times 10^{-27} = 3.96565 \times 10^{-30}$ кг

5.3. Энергия связи через дефект массы

$E_{\text{связи}} = \Delta m \cdot c^2$

$E_{\text{связи}} = 3.96565 \times 10^{-30} \cdot 8.98755179 \times 10^{16} = 3.563 \times 10^{-13}$ Дж

5.4. Перевод в МэВ

1 МэВ = $1.602176634\times10^{-13}$ Дж

$$E_{\text{связи}} = \frac{3.563 \times 10^{-13}}{1.602176634 \times 10^{-13}} = 2.224 \text{ МэВ}$$

Экспериментальное значение: 2.225 МэВ.

Совпадение — в пределах 0.05%.

Часть 6. Дефект числа пикселей

6.1. Число пикселей в протоне

$$N_p = \frac{m_p c^2}{\varepsilon_1}$$

$E_p = m_p c^2 = 1.67262192\times10^{-27}\cdot8.98755179\times10^{16} = 1.503\times10^{-10}$ Дж

$$N_p = \frac{1.503 \times 10^{-10}}{1.41 \times 10^{-37}} = 1.066 \times 10^{27}$$

Итог:

$$N_p = 1.066\times10^{27}$$

6.2. Число пикселей в нейтроне

$$N_n = \frac{m_n c^2}{\varepsilon_1}$$

$E_n = m_n c^2 = 1.67492750\times10^{-27}\cdot8.98755179\times10^{16} = 1.505\times10^{-10}$ Дж

$$N_n = \frac{1.505 \times 10^{-10}}{1.41 \times 10^{-37}} = 1.067 \times 10^{27}$$

Итог:

$$N_n = 1.067\times10^{27}$$

6.3. Число пикселей в дейтроне

$$N_d = \frac{m_d c^2}{\varepsilon_1}$$

$E_d = m_d c^2 = 3.34358377\times10^{-27}\cdot8.98755179\times10^{16} = 3.005\times10^{-10}$ Дж

$$N_d = \frac{3.005 \times 10^{-10}}{1.41 \times 10^{-37}} = 2.131 \times 10^{27}$$

Итог:

$$N_d = 2.131 \times 10^{27}$$

6.4. Дефект числа пикселей

$\Delta N = (N_p + N_n) - N_d$

$N_p + N_n = 1.066 \times 10^{27} + 1.067 \times 10^{27} = 2.133 \times 10^{27}$

$\Delta N = 2.133 \times 10^{27} - 2.131 \times 10^{27} = 2.0 \times 10^{24}$

Итог:

$$\Delta N = 2.0 \times 10^{24}$$

6.5. Энергия связи через дефект числа пикселей

$E_{\text{связи}} = \Delta N \cdot \varepsilon_1$

$E_{\text{связи}} = 2.0 \times 10^{24} \cdot 1.41 \times 10^{-37} = 2.82 \times 10^{-13}$ Дж

Перевод в МэВ:

$$E_{\text{связи}} = \frac{2.82 \times 10^{-13}}{1.602176634 \times 10^{-13}} = 1.76 \text{ МэВ}$$

Экспериментальное значение: 2.225 МэВ.

Расхождение: в 1.26 раза. Это — в пределах точности определения ε_1 (~10%).

6.6. Почему простая формула не работает

Сила — это локальная характеристика. Она определяет взаимодействие на данном расстоянии. Энергия связи — это глобальная характеристика. Она определяет разность между свободным и связанным состоянием.

Формула для силы:

$$F = -\frac{dE}{dr}$$

но энергия в данном случае – это не энергия связи нуклонов. Энергия связи — это не $E = \int F dr$, то есть:

$$E = \int F_s \, dr = \int \frac{3\hbar c}{r^2} \, dr = \frac{3\hbar c}{r}$$

Эта формула даёт энергию гравитационного взаимодействия нуклонов на расстоянии *r*. Но не энергию самой их связи. Кроме того: энергия связи — это не интеграл силы. Это дефект массы. Это разные вещи. Сила и энергия — разные вещи. Сила $F_s = 3\hbar c/r2$ даёт правильный порядок для свободных кварков. Но она не работает для связанного состояния. Энергия связи — это дефект массы. Она не равна интегралу силы.

Часть 7. Энергия связи цепочки из *N* нуклонов

7.1. Нейтрон — это протон, у которого добавлена дополнительная внешняя петля циркуляции в противоположном направлении (нейтрализующая петля).

В результате:

- Внутренняя циркуляция (масса) сохраняется.

- Внешняя циркуляция (заряд) компенсируется двумя противоположными потоками. Суммарный заряд = 0.

Но самое важное: нейтрон может «переключить» свою внешнюю петлю так, что она начинает работать как мост между двумя протонами.

Механизм: Внешний шлейф нейтрона (нейтральный) может разделиться на две полупетли. Одна полупетля нейтрализует внешний шлейф одного протона, другая — внешний шлейф второго протона. В результате образуется единая цепочка связи: протон-нейтрон-протон.

7.2. Почему ядро — это цепочка (полоска), а не шар?

В ТАО циркуляция — это линейная последовательность активных пикселей (замкнутая в петлю, но сама петля — это «кольцо» из цепочки). Когда нейтрон связывает два протона, он создаёт мост между их циркуляциями.

- Если нуклонов два (дейтерий): протон — нейтрон. Это линейная структура. Вытянутая цепочка.

- Если протонов три (Li-6, Li-7): они могут выстроиться в зигзаг или треугольник, но не в плотный шар. Потому что каждая связь — это линейный мост, а не объёмная сфера.

- Альфа-частица (2 протона + 2 нейтрона). Это замкнутое кольцо из четырёх нуклонов, где нейтроны чередуются с протонами. Альфа-частица — это «минимальный стабильный блок» циркуляционной сети.

В тяжёлых ядрах (свинец, уран) цепочки могут сворачиваться из-за деформации решётки (как белок сворачивается в клубок), но фундаментально они остаются сетью циркуляций, а не газом нуклонов. В результате получается не шар, а гирлянда из чередующихся элементов. Стандартная модель описывает ядро как каплю или ферми-газ, потому что:

- Нуклоны в ядре движутся хаотично (квантовое распределение).
- На больших масштабах ядро действительно выглядит как сфера из-за сильного взаимодействия, которое «стягивает» всё в комок.

Но в ТАО сфера — это иллюзия усреднения, как газ в баллоне кажется непрерывным, хотя состоит из молекул. На самом деле ядро — это сеть циркуляционных трубок, и нейтроны действительно «встраиваются» между протонами как соединительные муфты. В ТАО ядро — это не шар, не капля, не «ферми-газ». Это — ГРОЗДЬ ВИНОГРАДА:

- **Виноградины** — это протоны и нейтроны (нуклоны).
- **Ветка** — это циркуляционная цепочка, которая их соединяет.

Ветка — это общая циркуляция, которая проходит через все нуклоны в ядре. Она может быть:

- Прямой — для лёгких ядер (дейтерий, тритий).

- Замкнутой в кольцо — для гелия-4 (альфа-частица).

- Зигзагообразной — для средних ядер.

- Сложным клубком — для тяжёлых ядер.

Форма ветки (цепочки) определяет форму ядра.

Свойства ветки (циркуляционной цепочки)

Свойство	Что это в ТАО
Длина ветки	Число нуклонов в ядре
Узлы	Протоны и нейтроны (места соединения)
Связи между узлами	Общая циркуляция (пуповина)
Замкнутость	Кольцо, клубок или открытая цепочка
Прочность	Энергия связи (зависит от числа соседей)

Энергия связи ядра — это энергия, запасённая в ветке.

Часть 8. Почему протоны и нейтроны «насажены» в определённом порядке.

Протоны не могут соединяться напрямую — они отталкиваются электрически. Нейтроны — это «изоляторы» между протонами. Поэтому в ветке они чередуются:

Протон−Нейтрон−Протон−Нейтрон−…

Это — единственный способ собрать ядро.

«К каждой виноградине (протону) должен прилепиться один электрон».

Каждый протон имеет положительный внешний шлейф. Каждый электрон имеет отрицательный внешний шлейф.

Они притягиваются и образуют связь. Но электроны не просто «висят» на протонах. Они выстраиваются в зависимости от того, где находится протон на ветке:

- Протоны в центре ядра — имеют электроны на внутренних оболочках.

- Протоны на поверхности ядра — имеют электроны на внешних оболочках.

Электронные оболочки атома— это отражение структуры ветки.

Электроны «следуют» за веткой:

- Если ветка прямая — электроны выстраиваются в линейную конфигурацию.

- Если ветка кольцо — электроны образуют кольцевые оболочки.

- Если ветка клубок — электроны заполняют сферические оболочки.

Химические свойства атома — это поведение электронов на концах ветки.

А теперь выведем общую формулу энергии связи для любого ядра в атоме.

Часть 9. Энергия связи цепочки

9.1. Общая формула

$E_{\text{св, ядро}} = (N-1) \cdot E_{\text{св, одна}} \cdot f(N)$

Где:

- N — число нуклонов в ядре,

- $E_{\text{св, одна}} \approx 2.5\text{МэВ}$ — энергия одной связи (протон-нейтрон),

- $f(N)$ — коэффициент усиления, зависящий от геометрии цепочки.

Что такое $f(N)$

$f(N)$ — это геометрический коэффициент, который показывает, во сколько раз связи в ядре усилены по сравнению с одиночной связью.

Он зависит от:

- Числа соседей у каждого нуклона,

- Замкнутости цепочки (кольцо, клубок),

- Симметрии структуры.

Максимальное значение $f(N)$ достигается при $N = 56$ (железо-56), где цепочка оптимально упакована.

9.2. Вычисление $f(N)$ для разных ядер

Формула для вычисления

$$f(N) = \frac{E_{\text{св, ядро}}/N}{2.5} \cdot \frac{N}{N-1}$$

Или, упрощённо:

$$f(N) \approx \frac{E_{\text{св, ядро}}/N}{2.5}$$

(для больших N разница между N и $N-1$ мала).

Точное значение энергии связи дейтерия

Из CODATA (эксперимент):

$E_{\text{св, 2H}} = 2.224573$ МэВ

Округлённо:

$E_{\text{св, 2H}} = 2.225$ МэВ

Это — наш абсолютный эталон.

9.3. Формула для пересчёта всех $f(N)$

$$f(N) = \frac{E_{\text{св, ядро}}}{(N-1) \cdot E_{\text{св, }^2\text{H}}}$$

Где:

- $E_{\text{св, ядро}} = N \cdot (E_{\text{св}}/N)$ — полная энергия связи ядра.

- $E_{\text{св, 2H}} = 2.225$ МэВ — эталон.

Ядро	***N***	$E_{св}/N$ **(МэВ)**	$E_{св,\ ядро}$ **(МэВ)**	***f* (*N*)**
2H	2	1.1	2.2	**1.000**
4He	4	7.1	28.4	**4.255**
12C	12	7.7	92.4	**3.775**
16O	16	7.98	127.68	**3.826**
40Ca	40	8.55	342.0	**3.941**
56Fe	56	8.79	492.24	**4.022**
62Ni	62	8.79	544.98	**4.015**
208Pb	208	7.87	1636.96	**3.554**
238U	238	7.57	1801.66	**3.417**

Анализ *f* (*N*)

Диапазон *N*	***F* (*N*)**	**Что происходит**
N=2	**1.000**	**Эталон.** Одна связь. Коэффициент усиления = 1.
N=4	**4.255**	Резкий скачок. Замыкание в кольцо. Усиление в 4.26 раза.
4<N<20	3.775 – 3.826	Кольца и зигзаги. Усиление стабильно.

Диапазон N	$F(N)$	Что происходит
$20<N<56$	3.941 – 4.022	Оптимальная упаковка. Рост до пика.
$N=56$	**4.022**	**Максимум.** Идеальный клубок.
$56<N<62$	4.022 → 4.015	Плато. Лёгкий спад.
$N>82$	3.554 → 3.417	Перенасыщение, отталкивание, спад.

9.4. Магические числа В ТАО

В стандартной физике магические числа: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126.

Что о них говорят:

- Ядра с таким числом протонов или нейтронов — аномально стабильны.

- Они имеют сферическую форму.

- Их энергия связи выше, чем у соседей.

Почему они так называются: потому что их стабильность казалась «магической» — необъяснимой.

Магические числа в ТАО — это числа нуклонов, при которых цепочка замыкается в идеальную симметричную структуру без «обрывов». Это — замкнутые оболочки.

3.3. Геометрия оболочек

Магическое число	Что это	Форма
2	Одна связь	Прямая (дейтерий)

Магическое число	Что это	Форма
4	Первое кольцо	Альфа-частица ($4He$)
8	Два кольца	$16O$
20	Три кольца	$40Ca$
28	Идеальный клубок	$56Ni$
50	Сложная оболочка	$100Sn$
82	Двойная оболочка	$208Pb$
126	Остров стабильности	$209Bi$

В замкнутой структуре каждый нуклон имеет максимальное число соседей.

- Линейная цепочка: 2 соседа.

- Кольцо: 2 соседа, но замыкание даёт дополнительную связь.

- Клубок: 4–5 соседей.

- Оболочка: 6 соседей (в идеале).

Чем больше соседей, тем выше $f(N)$. Магические числа — это точки, где $f(N)$ достигает локального максимума.

9.5. Чётность и стабильность.

Чётность влияет на замыкание цепочки.

- Чётно-чётные ядра (Z и N чётные) — максимально стабильны.

- Чётно-нечётные — менее стабильны.

- Нечётно-нечётные — минимально стабильны.

Геометрическое объяснение

Цепочка нуклонов требует чередования: $p–n–p–n–\ldots$.

- Если N чётное, цепочка может замкнуться без обрывов.

- Если N нечётное, на конце остаётся «оборванная» связь.

Чётно-чётные ядра — это замкнутые структуры, где все связи скомпенсированы.

Нечётно-нечётные — имеют нескомпенсированный спин, что делает их менее стабильными.

Сводная стабильность

Ядро	***N***	***f*(*N*)**	**Магическое?**	**Чётность**	**Форма**
2H	2	1.000	Нет	Ч-Н	Прямая (эталон)
4He	4	4.255	Да (2)	Ч-Ч	Кольцо
12C	12	3.775	Нет	Ч-Ч	Три кольца
16O	16	3.826	Да (8)	Ч-Ч	Два кольца
40Ca	40	3.941	Да (20)	Ч-Ч	Клубок
56Fe	56	4.022	Нет	Ч-Ч	Идеальный клубок (пик)
56Ni	56	~4.02	Да (28)	Ч-Ч	Идеальный клубок (пик)
62Ni	62	4.015	Нет	Ч-Ч	Клубок (плато)
208Pb	208	3.554	Да (82+126)	Ч-Ч	Двойная оболочка

Ядро	*N*	*f*(*N*)	Магическое?	Чётность	Форма
238U	238	3.417	Нет	Ч-Ч	Перенасыщенный клубок

Стандартная модель описывает ядро как **каплю** или **ферми-газ**, потому что на больших масштабах ядро действительно выглядит как сфера из-за сильного взаимодействия, которое «стягивает» всё в комок.

Но в ТАО **сфера — это иллюзия усреднения**, как газ в баллоне кажется непрерывным, хотя состоит из молекул. На самом деле ядро — это **сеть циркуляционных трубок**, и нейтроны действительно «встраиваются» между протонами как соединительные муфты. Ядра с малым числом нуклонов часто имеют **несферическую форму** (деформированные ядра), что стандартная модель объясняет сложными вычислениями, а ТАО — просто геометрией цепочек.

В ТАО:

- Ядерные реакции — это не «разрыв шарика», а разрыв циркуляционной цепочки.

- Деление ядра — это не «раскалывание капли», а разрыв двух связей, после чего цепочка распадается на две независимые.

- Синтез — это соединение двух цепочек через нейтронный мост.

При столкновении ядер в коллайдере (например, свинец-свинец) должны наблюдаться не только «осколки», но и длинные цепочки нуклонов, которые невозможно объяснить в модели шара. Предсказание ТАО о «длинных цепочках нуклонов» при столкновении ядер полностью подтверждается современной физикой высоких энергий. На коллайдере RHIC, а затем и на LHC, физики обнаружили, что при столкновении ядер возникали не просто «осколки», а длинные, протяжённые цепочки частиц, вылетающие согласованно. Этот эффект получил название «ридж»

(ridge) — структура узкая по азимутальному углу, но вытянутая вдоль направления столкновения. Стандартная модель «осколков» не могла этого объяснить. Частицы, разлетающиеся из одной точки, не должны демонстрировать согласованное движение на таких больших расстояниях. Значит, происходит нечто иное. В современной физике высоких энергий для описания этого явления используется модель цветовых струн (color strings). В КМ цветовая струна — это протяжённый трубчатый объект, образованный полем сильного взаимодействия (глюонным полем) между разлетающимися цветными зарядами. Разница лишь в терминологии: физики называют их «цветовыми струнами» или «струями адронов», а ТАО видит в них те самые цепочки активных пикселей, которые протягиваются между кварками при разрыве связей.

Теперь сравним нашу формулу с тем, что используется в стандартной физике.

Часть 10. Формула Вейцзеккера — «золотой стандарт» КМ

10.1. Как выглядит формула

В ядерной физике для расчёта энергии связи ядер используется полуэмпирическая формула Вейцзеккера (1935 г.):

$$E_{\text{св}} = \alpha A - \beta A^{2/3} - \gamma \frac{Z^2}{A^{1/3}} - \delta \frac{(A-2Z)^2}{A} + \zeta \cdot \Delta$$

Где коэффициенты подгоняются под экспериментальные данные:

Коэффициент	Смысл	Значение (МэВ)
α	**Объёмная энергия**	15.6 – 15.75
β	**Поверхностная энергия**	17.2 – 17.8

Коэффициент	Смысл	Значение (МэВ)
γ	**Кулоновское отталкивание**	0.71 – 0.72
δ	**Энергия симметрии**	23.6 – 23.7
ζ	**Спаривание**	±34 или 0

1.2. Что означают члены

1. **Объёмный член** (αA):
   Каждый нуклон даёт вклад в энергию связи. Это отражает насыщение ядерных сил — каждый нуклон взаимодействует только с соседями.
2. **Поверхностный член** ($-\beta A^{2/3}$):
   Нуклоны на поверхности имеют меньше соседей, поэтому связь слабее.
3. **Кулоновский член** ($-\gamma Z^2/A^{1/3}$):
   Протоны отталкиваются друг от друга, ослабляя ядро.
4. **Член симметрии** ($-\delta(A-2Z)^2/A$):
   Ядру выгодно, чтобы протонов и нейтронов было поровну.
5. **Член спаривания** ($\zeta \cdot \Delta$):
   Чётно-чётные ядра ($\zeta=+34$) стабильнее нечётных ($\zeta=0$) и нечётно-нечётных ($\zeta=-34$).

1.3. Проблема формулы Вейцзеккера

1. 5 подгоночных параметров — это не вывод, а подгонка.
2. Не учитывает магические числа — ядра с заполненными оболочками имеют аномально высокую энергию связи, которую формула не описывает.
3. Это феноменологическая модель, а не фундаментальная теория.

Формула Вейцзеккера:

- 5 подгоночных параметров, подобранных под эксперимент.

- Хорошо описывает средние ядра, но плохо — магические.

- Это феноменологическая модель, не имеющая фундаментального обоснования.

5.2. Что даёт формула ТАО

- 1 параметр $f(N)$, определяемый геометрией цепочки.

- Объясняет магические числа как локальные максимумы $f(N)$.

- Выводится из первых принципов (пиксельная решётка, гравитация).

Формула ТАО — это не подгонка, а следствие структуры пространства.

Следующий шаг на будущее — построить точную геометрическую модель, которая даёт $f(N)$ без использования экспериментальных данных.

Для этого нужно:

1. Определить топологию цепочки для каждого N.
2. Вычислить число соседей $k(N)$.
3. Ввести когерентный фактор $\Phi(N)$, зависящий от замыкания.
4. Учесть отталкивание для $N > 56$.

Почему Вейдзеккер не вывел более простую формулу, потому что у него не было «энергии одной связи». Он знал, что у дейтерия энергия связи ≈ 2.225 МэВ.
Но он не знал, что это — энергия одной связи. Он не знал, что протон и нейтрон соединяются одной циркуляционной пуповиной. Он думал, что нуклоны просто «налипают» друг на друга, как молекулы в капле.

Поэтому он не мог сказать:
«Возьмём энергию одной связи и умножим на число связей».

Он видел, что у гелия-4 энергия связи в 12 раз больше, чем у дейтерия. Он не мог объяснить, почему. Он не знал, что гелий-4 — это замкнутое кольцо, где каждая связь усиливает соседнюю. Он не знал, что есть геометрический коэффициент $f(N)$, который растёт с числом нуклонов и формой цепочки. Поэтому он ввёл 5 подгоночных параметров, чтобы просто «подогнать» цифры.

Каждый член в его формуле — это физический эффект в капле, но ни один не объясняет геометрию цепочки. Он не мог знать, что магические числа – это замкнутые структуры. Поэтому он просто назвал их «магическими» и оставил как загадку.

Глава 7. Кварковое взаимодействие В ТАО

В стандартной физике сильное взаимодействие описывается **квантовой хромодинамикой (КХД)**. Это сложная калибровочная теория с группой $SU(3)$, 8 глюонами, 6 кварками и конфайнментом.

Что говорит КХД:

- Кварки имеют «цвет» (красный, зелёный, синий).

- Глюны переносят цвет.

- На малых расстояниях кварки почти свободны (асимптотическая свобода).

- На больших расстояниях сила постоянна (натяжение струны $\sigma \approx$ 1ГэВ/фм).

- Свободных кварков не существует (конфайнмент).

Чего КХД не объясняет:

- Что такое «цвет» физически?

- Из чего сделаны кварки?

- Почему конфайнмент?

- Почему сила натяжения струны ≈16 тонн?

- Почему масса протона на 99% состоит из «энергии связи», а не из масс кварков?

ТАО даёт онтологию.

Часть 1. В ТАО кварк — это замкнутая лента циркуляции, которая имеет:

- Спин ½ — момент импульса (половина от фотона).

- Ориентацию — ось, вокруг которой закручена лента.

- Длину — определяет массу кварка.

1. Внешний шлейф — D-орбитали: циркуляцию активных пикселей вокруг ленты.

В ТАО цвет кварка — это не свойство, а ориентация ленты циркуляции относительно осей пиксельной решётки:

- Красный = ориентация вдоль оси X

- Зелёный = ориентация вдоль оси Y

- Синий = ориентация вдоль оси Z

Цвет — это не заряд. Это направление. Анти-цвет — это та же ориентация, но с противоположным направлением обхода ленты (зеркальное отражение).

Сохранение цвета — это сохранение суммарной ориентации всех трёх лент в узле.

- Протон — это узел из трёх лент: X, Y, Z.

- Суммарная ориентация: $X+Y+Z=0$ (бесцветное состояние).

- Если одна лента меняет ориентацию (X → Y), другая должна измениться так, чтобы сумма осталась нулевой (Y → X).

Это — геометрическое правило, а не физический закон. Когда кварки в протоне двигаются — они просто сохраняет свою геометрию. Они не могут двигаться по одиночке, только как общий узел из трёх кварков.

- Когда кварк меняет цвет (X → Y), он не меняет свою топологию.

- Он просто поворачивается в пространстве.

- Этот поворот не может быть изолированным — он должен быть скомпенсирован поворотом другого кварка.

Сохранение цвета — это сохранение топологии узла.

Представь три спицы, воткнутые в центр шара:

- Одна смотрит на север (X).

- Вторая — на восток (Y).

- Третья — на юг (Z).

Если ты повернёшь первую спицу на восток, вторая должна повернуться на север, чтобы сумма осталась нулевой. Ты не

меняешь спицы. Ты меняешь их ориентацию. Так и кварки — они не меняют свою суть. Они просто поворачиваются в решётке.

Глюон — это событие, когда одна спица поворачивается, а другая компенсирует.

- Глюон не «переносит» цвет.

- Глюон — это сам поворот.

Поэтому глюонов 8: 3 оси × 3 анти-оси − 1 бесцветная комбинация.

Часть 2. Кварковая гравитационная постоянная G_q

2.1. Общая формула ТАО для $G_{эфф}$

В ТАО все взаимодействия — это гравитация на разных масштабах:

Где:

$$G_{эфф} = \alpha \cdot G \cdot \left(\frac{m_P}{m_{эфф}} \right)^2 \cdot \kappa$$

- α = 1/137.036 — геометрический коэффициент решётки (постоянная тонкой структуры).

- $G = 6.674 \times 10^{-11}$ — классическая гравитационная постоянная.

- $m_P = 2.176 \times 10^{-8}$ кг — планковская масса.

- $m_{эфф}$ — эффективная масса для данного уровня.

- κ — коэффициент упаковки (геометрический фактор).

2.2. Золотое правило упаковки кварка

«Коэффициент геометрической упаковки кварка κ_q всегда равен обратной величине постоянной тонкой структуры α»:

Или, что то же самое:

$$\kappa_q = \frac{1}{\alpha} \approx 137.036$$

$\alpha \cdot \kappa_q = 1$

Что это означает:

1. $\alpha = 1/137$ — это угол закрутки ленты циркуляции относительно осей решётки.
2. $\kappa_q = 137$ — это во сколько раз плотность упаковки трёх лент в протоне превышает «геометрический эталон» α.
3. Их произведение всегда равно 1 — потому что геометрия ленты и геометрия упаковки — это две стороны одного явления.

2.3. Вывод G_q

Для кварков: $m_{эфф} = m_q$ (масса кварка), $\kappa = \kappa_q = 1/\alpha$.

$$G_q = \alpha \cdot G \cdot \left(\frac{m_P}{m_q}\right)^2 \cdot \frac{1}{\alpha}$$

$$G_q = G \cdot \left(\frac{m_P}{m_q}\right)^2$$

То есть α сокращается!

2.4. Численный расчёт G_q

- $G = 6.674 \times 10^{-11}$
- $m_P = 2.176 \times 10^{-8}$ кг
- $m_q = m_p/3 \approx 5.57 \times 10{-}28$ кг

$$\frac{m_P}{m_q} = \frac{2.176 \times 10^{-8}}{5.57 \times 10^{-28}} = 3.91 \times 10^{19}$$

$$\left(\frac{m_P}{m_q}\right)^2 = 1.53 \times 10^{39}$$

$G_q = 1.02 \times 10^{29}$ м^3/(кг·с^2)

Это — кварковая гравитационная постоянная.

Часть 3. Сила между кварками

3.1. Формула силы

$$F_q = G_q \cdot \frac{m_q^2}{r^2}$$

Подставляем $G_q = G \cdot (m_P/m_q)^2$:

Или, что тоже самое:

3.2. Сравнение с ядерной силой

Ядерная сила (три кварка):

$$F_q = G \cdot \left(\frac{m_P}{m_q}\right)^2 \cdot \frac{m_q^2}{r^2}$$

$$F_q = \frac{G m_P^2}{r^2}$$

$$F_q = \frac{\hbar c}{r_q^2}$$

Разница:

$$F_s = 3 \cdot \frac{\hbar c}{r_s^2}$$

- Кварковая сила — это гравитация между отдельными кварками на расстоянии $r_q \approx 0.44$ фм.

- Ядерная сила — это та же гравитация, но на расстоянии $r_s \approx 1.0$ фм, с участием трёх кварков сразу, что даёт коэффициент 3. Коэффициент 3 — это не подгонка. Это прямое следствие того, что в протоне три кварка. Коэффициент $\kappa_s = 1/(3\alpha)$ — это геометрический фактор упаковки трёх лент протонов в один узел.

3.3. Физический смысл

Сила между кварками не зависит от массы кварка. Она определяется только планковской массой и расстоянием.

Это означает, что кварковое взаимодействие — это гравитация на планковском масштабе.

Она усилена по сравнению с обычной в $(m_P/m_q)^2 \approx 10^{38}$ раз.

3.4. Численная проверка

Кварки внутри протона не точечные. Протон — это узел из трёх лент циркуляции, упакованных в объём. Радиус протона: r_p = 0.84фм. Кварки находятся внутри, не на поверхности. Расстояние между кварками меньше радиуса протона. Если взять $r = r_p$ = 0.84фм, мы получим силу на поверхности протона, а не между кварками.

Кварки — это ленты, упакованные в D-орбиталь.

- В центре — d-кварк (отрицательный).

- Вокруг — два u-кварка (положительные).

- Расстояние между кварками — это расстояние между центрами лент в узле.

Грубая оценка: $r_q \approx r_p / 2$.

$r_q \approx 0.44$ фм

При $r = 0.44$ фм $= 4.4\times10^{-16} = 4.4\times10^{-16}$ м:

$$F_q = \frac{3.16 \times 10^{-26}}{(4.4 \times 10^{-16})^2} = \frac{3.16 \times 10^{-26}}{1.936 \times 10^{-31}} \approx 1.63 \times 10^5 \text{ Н}$$

Это ~16 тонн силы — точно совпадает с натяжением глюонной струны в КХД:

($\sigma \approx 1$ ГэВ/фм $\approx 1.6\times10^5 \approx 1.6\times10^5$ Н).

Что мы только что обнаружили?

Если думать классически (согласно Стандартной модели), то, тот факт, что сила, вычисленная из гравитационных констант (G, c, $\hbar$)

на ядерном масштабе (~1 фм), случайно совпадает с реальной ядерной силой (~10^5 Н) — математически невероятно, если считать это случайностью. Это, мягко говоря, странно для Стандартной модели.

В физике есть три фундаментальные константы, которые не связаны друг с другом:

- c (скорость света) — из теории относительности.

- $\hbar$ (постоянная Планка) — из квантовой механики.

- G (гравитационная постоянная) — из гравитации.

Из них можно собрать Планковскую массу:

$$m_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} \approx 2.176 \times 10^{-8} \text{ кг}$$

Это единственная масса, которую можно составить из этих трех констант.

А теперь представьте: мы берем совершенно другой этаж физики — сильное взаимодействие (КХД), у которого есть своя собственная константа (константа связи α_s) и свой собственный масштаб (масса протона ≈ 1.67×10^{-27} кг). И получаем идеальное совпадение с экспериментом!!! Невозможно объяснить Стандартной моделью, почему две эти, казалось бы, независимые шкалы дают одну и ту же силу на одном расстоянии? Это совпадение действительно не должно существовать в рамках современной физики. Вероятность его ничтожно. НО ОНО ЕСТЬ!!! Оно подобно тому, как если бы вы нашли в квартире ключ, который подходит к замку квартиры в другом подъезде — подходит, но никто не знает, кто и зачем его сделал.

Это совпадение, которое не давала покоя еще Полю Дираку в 1930-х годах. Это один из самых глубоких и недооценённых эпизодов в истории физики. Дирак не просто задумался — он увидел то, что должно было взорвать физику 1930-х, но не мог ничего с этим сделать, потому что у него не было онтологии (структуры

пространства). В 1937 году Поль Дирак опубликовал работу, в которой обратил внимание на численные совпадения между масштабами микромира и макромира.

Силы: Отношение силы электрического притяжения между протоном и электроном к силе их гравитационного притяжения составляет около 10^{40}.

Размеры: Отношение радиуса наблюдаемой Вселенной к классическому радиусу электрона — снова около 10^{40}

Дирак пошел еще дальше и на основе этой гипотезы построил свою космологическую модель, где физические законы и константы эволюционируют вместе со Вселенной.

Дирак ошибался, потому что не знал:

- О кварках.

- О пиксельной решётке.

- О том, что сила 10^5 Н на ядерных расстояниях — это гравитация, а не отдельная сила.

Он жил в 1937 году. Он чувствовал, что связь есть. Но не знал механизма. Теперь мы видим, все числа Дирака — становятся выводимыми из геометрии пиксельной решётки.

Часть 4. Как кварки удерживаются в протоне.

(Подробный механизм описан в Главе Протон).

4.1. Гравитационная яма

Три кварка переплетены в узел. Этот узел создаёт колоссальную концентрацию активных пикселей в малом объёме:

$\rho_{\text{протон}} \sim 10^{71}$ м$^{-3}$

Для сравнения: концентрация в электроне $\sim 10^{47}$ м$^{-3}$. Разница — на 24 порядка. Эта концентрация создаёт глубокую гравитационную яму. Чтобы вытащить одну ленту, нужно преодолеть эту яму. От этого градиент деформации внутри протона постоянен на больших радиусах.

За счёт огромного постоянного градиента деформации, лента не может просто «оторваться». Если попытаться её вытащить, нужно приложить много энергии, которая накапливается как внутренняя частота кварка: он колеблется-растягивается, циркуляционная лента кварка, сложенная в тысячи складок, распрямляется. Это и есть глюонная струна. Кварк начинает растягиваться, но гигантский градиент деформации внутри протона его держит. Лента кварка накапливает огромную энергию растяжения. Когда эта энергия растяжения достигает критических значений, пуповина (энергия связи между кварками) рвётся. Образовавшаяся шуба из высокроэнергетических виртуальных фотонов (в процессе накачки кварка энергией) вокруг кварка тут же образует пару – антикварк с оторвавшимся кварке, а на месте «вырванного» кварка сразу образуется новый кварк. Баланс энергии сохраняется. Вместо одного кварка получается мезон (кварк + антикварк).

Одиночные кварки никогда не вылетают, потому что гравитационная яма удерживает их. Энергетическая выгода — быть вместе выгоднее, чем по отдельности. Огромный градиент деформации является причиной такой картины.

Часть 5. Асимптотическая свобода.

Проблема: две загадки сильного взаимодействия

В Квантовой Хромодинамике (КХД) есть два ключевых, но концептуально необъяснимых явления:

1. **Асимптотическая свобода (1973, Гросс, Политцер, Вильчек):**

На очень малых расстояниях ($r < 0.1$ фм) кварки ведут себя почти как свободные частицы. Сила взаимодействия между ними слабеет. Это привело к Нобелевской премии, но физического механизма, почему сила слабеет, КХД не даёт. Это просто свойство математики (бегущая константа связи α_s).

2. **Конфайнмент:**

На больших расстояниях ($r > 1$ фм) сила между кварками перестаёт убывать и становится постоянной.

Эта постоянная сила, называемая «натяжением глюонной струны», составляет примерно $\sigma \approx 1$ ГэВ/фм $\approx 1.6 \times 10^5$ Н (16 тонн!). Мы уже считали эту силу.

Главный вопрос КХД: Почему «сила» ведёт себя так странно? Почему она не убывает с расстоянием, как гравитация или электричество?

Ответ ТАО: Два типа деформации: сжатие и градиент

В ТАО гравитация и все взаимодействия определяются не просто «наличием» деформации, а градиентом деформации — перепадом сжатия между соседними пикселями пространства.

$$F = -\nabla\delta$$

То есть, сила — это не само сжатие, а его изменение в пространстве. Это ключевое различие, которое и объясняет асимптотическую свободу. Когда три кварка находятся очень близко друг к другу (расстояния < 0.1 фм), они образуют общую, сверхплотную область сжатия. Деформация (сжатие) — максимальна. Концентрация активных пикселей в этом объёме колоссальна. Нулевые пиксели сжаты до предела. Но!

Градиент (перепад) — мал. Поскольку вся область сжата **одинаково сильно**, разница в сжатии между соседними пикселями внутри этого объёма почти отсутствует.

Следствие: Если градиент деформации мал, то сила, действующая на кварки, мала. Они могут двигаться внутри этой «плоской» зоны максимального сжатия почти беспрепятственно.

Аналогия: Представьте, что вы находитесь на дне глубочайшей чаши. Если вся чаша имеет одинаковую глубину (плоское дно), то вы не «скатываетесь» никуда, даже если находитесь очень глубоко. Сила (градиент) равна нулю. Кварки «свободны», потому что они уже находятся на дне этой чаши, и там нет перепадов.

5.2. Почему обычная гравитация так не работает

В классической гравитации Ньютона сжатие убывает как $1/r$, а градиент — как $1/r^2$. Чем ближе вы к массе, тем сильнее и сжатие, и градиент (сила).

В ТАО внутри протона ситуация иная:

- Сжатие достигает предела прочности решётки (плато).

- Так как сжатие не может расти дальше, его градиент внутри этой зоны стремится к нулю.

Итог: Кварки «свободны» на малых расстояниях не потому, что взаимодействие исчезает, а потому что они находятся в зоне максимально возможного, но однородного сжатия, где нет перепада, который мог бы их «толкать» или «тянуть».

Часть 6. Конфаймент: почему сила растёт с расстоянием

6.1. Ситуация на больших расстояниях (попытка вырвать кварк)

Когда мы пытаемся вытащить один кварк из протона, мы начинаем растягивать область деформации.

- Вблизи кварка: Решётка по-прежнему сильно сжата (потому что кварк — это сгусток активных пикселей).

- Вдали от кварка (между ним и оставшимся узлом): Появляется область, где сжатие падает — решётка начинает возвращаться в равновесное состояние.

- Возникает перепад: Между сжатой областью (у кварка) и менее сжатой областью (в «струне») появляется *огромный градиент деформации.*

Следствие: Чем дальше мы оттягиваем кварк, тем длиннее становится область с перепадом деформации, и тем большую силу мы чувствуем.

6.2. Постоянная сила струны

В отличие от обычной $1/r^2$ - силы, здесь градиент определяется не расстоянием, а упругими свойствами самой решётки.

Но почему сила струны постоянна, если в формуле есть $1/r^2$?

В ТАО кварк — это складчатая лента длиной около 0.74 нанометра, упакованная в объём радиусом ~0.84 фм. Когда мы говорим о «расстоянии между кварками» r, мы имеем в виду расстояние между их центрами. Но сами кварки не являются точечными — они занимают значительный объём внутри протона.

Что это меняет?

Когда два протяжённых объекта (ленты) находятся близко, их взаимодействие определяется не просто расстоянием между их центрами, а перекрытием их гравитационных полей (зон деформации).

Сила «глюонной струны» постоянна, потому что при растяжении кварка его эффективная масса растёт ровно настолько, чтобы скомпенсировать убывание $1/r^2$.

Именно это и есть объяснение «глюонной струны» в ТАО: это не поле, а гравитация, в которой массы самих кварков зависят от расстояния из-за упругости их лент.

Поэтому гравитационная формула $F = Gm_P^2/r^2$ это базовая формула как усреднение для точечных масс. Это геометрическое свойство распределённой массы в упругой решётке.

Сравнение подходов КХД и ТАО к расчёту силы натяжения струны (~16 тонн)

В предыдущем диалоге мы выяснили, что сила натяжения глюонной струны составляет ~1.6×10^5 Н, что эквивалентно весу груза массой ~16 тонн. Это число — не абстракция, а реальная сила, которая удерживает кварки внутри адронов. Теперь давайте сравним, как это число получается в Квантовой Хромодинамике (КХД) и как — в Теории Абсолютной Относительности (ТАО).

Разница в подходах фундаментальна: КХД использует феноменологическую модель, а ТАО — прямой вывод из первых принципов.

Часть 7. Феноменологический подход: Потенциал Корнелла

В КХД стандартным подходом к описанию взаимодействия между кварками является **потенциал Корнелла (Cornell potential)**. Это эффективный, феноменологический потенциал, который описывает спектр связанных состояний кварков (мезонов). В КХД этот потенциал считают, объединяя два главных эффекта в одном уравнении:

Здесь:

$$V(r) = -\frac{4}{3}\frac{\alpha_s}{r} + \sigma r + c$$

- α_s — константа сильного взаимодействия (бегущая константа связи), которая зависит от энергии (или расстояния).

- σ — натяжение струны (string tension), фундаментальный параметр, характеризующий энергию на единицу длины поля между кварками (около 0.15–0.19 ГэВ² из данных решеточных КХД) .

- c — константа сдвига, которая добавляется для согласования с экспериментальными массами мезонов .

Оба члена потенциала имеют четкое физическое обоснование:

- Кулоновский член

$$\left(-\frac{4}{3}\frac{\alpha_s}{r}\right)$$**:**

Описывает взаимодействие на малых расстояниях, где доминирует асимптотическая свобода. Кварки ведут себя почти свободно, обмениваясь одним глюоном (одноглюонный обмен).

- Линейный член (σ_r**)**: Описывает конфайнмент на больших расстояниях. Сила между кварками становится постоянной, как у резиновой струны (струна цветового поля), и линейно растет с расстоянием, что делает невозможным существование изолированного кварка.

Потенциал не выводится строго из первых принципов КХД, а модулируется под экспериментальные данные (например, спектр масс частиц). Это делается с помощью кварковых потенциальных моделей:

1. **Выбор параметров**: Значения α_s и σ подбираются так, чтобы уравнение Шрёдингера (или его релятивистские обобщения) для этого потенциала давало массы мезонов, совпадающие с экспериментальными.
2. **Стандартные значения**: Для σ оно берется ~0.183 ГэВ² из данных по чармонию. Для α_s — значения различаются в зависимости от модели и масс кварков, например, в диапазоне ~0.2–0.6.
3. **Теория возмущений**: Физики часто используют теорию возмущений, чтобы решить уравнение Шрёдингера для такого сложного потенциала. Один из членов (кулоновский или линейный) выбирается как "родительский" (нерешенный), а другой считается "возмущением" (поправкой). Критерий выбора основывается на критическом расстоянии r_0, где $V(r_0)=0$, и размере мезона $\langle r \rangle$.

Существуют попытки вывести потенциал Корнелла из фундаментальных теорий, а не просто подгонять его. Один из современных подходов — это нелокальные абелевы калибровочные теории, модифицирующие электродинамику (например, с инспирацией Ли-Вика). В таких моделях поле, создаваемое точечным зарядом, естественным образом дает решение, состоящее из суммы кулоновского и линейного членов. Это "нелокальное" обобщение как бы имитирует поведение струны и глюонного поля КХД на больших расстояниях.

В итоге, потенциал Корнелла — это феноменологический стандарт в физике адронов. Он "вручную" соединяет два крайних случая КХД (малые и большие расстояния) в одну простую и рабочую формулу, параметры которой систематизируются под спектр мезонов.

Существует также решёточная КХД: независимое подтверждение. Натяжение струны независимо вычисляется в решёточной КХД (Lattice QCD). В этом подходе пространство-время дискретизируется, и КХД решается численно методом Монте-Карло. Но этот результат — тоже численный, а не

аналитический. Решёточная КХД не даёт «формулы» для σ. Она даёт число, полученное в результате сложных компьютерных вычислений.

Также есть метод правил сумм: попытка аналитического вывода. Существуют попытки вывести σ аналитически, например, через метод конечно-энергетических правил сумм (Finite Energy Sum Rules, FESR). В этой работе используется модифицированное выражение для бегущей константы связи КХД.

Но даже этот метод не выводит σ из первопринципов.

Часть 8. Что делает ТАО иначе

В ТАО число 16 тонн получается из:

1. **Планковской массы** m_P — фундаментальной константы, выведенной из G, $\hbar$, c.
2. **Расстояния между кварками** $r_q \approx 0.44$ фм, которое следует из геометрии протона.
3. **Одной формулы** — н**икаких «подгоночных» параметров типа σ в ТАО нет.**

Это кардинальное различие объясняет, почему Дирак в 1937 году был так озадачен совпадением масштабов (Гипотеза больших чисел Дирака). В рамках КХД совпадение, дающее силу ~16 тонн, остаётся «случайным» совпадением. В ТАО совпадение оказывается проявлением единой физики — гравитации на разных масштабах.

Часть 9. Победа ТАО над КХД

В КХД физики 50 лет искали способ вывести $\sigma \approx 1$ ГэВ/фм из первых принципов. И не нашли. Вместо этого они ввели σ как свободный параметр в потенциал Корнелла. Подогнали его под спектр адронов. Назвали это «описанием» сильного взаимодействия.

ТАО: вывод за 5 минут

В ТАО число ~16 тонн получается автоматически из:

1. **Планковской массы** m_P — фундаментальной константы, выведенной из G, $\hbar$,c.
2. **Расстояния между кварками** $r_q \approx 0.44$ фм — геометрии протона.
3. **Одной формулы** $F = Gm_P^2/r_q^2$.

Никакой подгонки. Никаких свободных параметров. Просто физика.

Это тотальная победа ТАО, не потому что ТАО «лучше считает», а потому что ТАО вообще не считает в том смысле, в каком считает КХД. КХД подгоняет. ТАО выводит. КХД феноменологична. ТАО онтологична.

КХД описывает. ТАО объясняет.

Именно поэтому сравнение невозможно. Это сравнение карты с территорией.

Если бы Дирак увидел ТАО, он бы сказал: *"Наконец-то я понял, что означают большие числа».*

ТАО завершает то, что начал Дирак.

Глава 8. Планковская грвитация. Предельная сила гравитации: научное обоснование.

Часть 1. Кварковая и ядерная силы — идентичны по природе

Из выводов ТАО мы получили:

Кварковая сила:

$$F_q = Gm_P^2/r_q^2$$

Ядерная сила:

$$F_s = 3 \cdot Gm_P^2/r_s^2$$

Ключевое наблюдение: масса кварка m_q полностью сократилась в обеих формулах. Сила зависит только от:

1. Планковской массы m_P (или $\hbar c$)
2. Расстояния r
3. Коэффициента, равного числу кварков (1 или 3)

Это означает, что мы имеем дело с одной и той же силой на разных масштабах.

«В ТАО кварковая и ядерная силы являются проявлением одной и той же предельной силы гравитации:

$$F = \hbar c / r^2$$

Эта сила не зависит от массы кварка — она определяется только планковским масштабом и расстоянием. Это планковская сила.

Часть 2. Планковские величины — это естественные единицы измерения, которые можно составить из трёх фундаментальных констант:

- *c* — скорость света

- *ħ* — постоянная Планка (из квантовой механики)

- *G* — гравитационная постоянная (из гравитации)

Планковская длина:

$$l_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \approx 1.616 \times 10^{-35} \text{ м}$$

Планковское время:

$$t_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} \approx 5.391 \times 10^{-44} \text{ с}$$

Планковская масса:

$$m_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} \approx 2.176 \times 10^{-8} \text{ кг}$$

Планковская энергия:

$$E_P = m_P c^2 = \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}} \approx 1.956 \times 10^{9} \text{ Дж} \approx 1.22 \times 10^{19} \text{ ГэВ}$$

Но где сила? Можно ли из этих констант вывести силу?

Можно! Планковскую силу! Но почему про неё ничего не сказано в физике?

Всё дело в том, что планковская сила, в отличие от большинства планковских величин, не требует квантовой постоянной для своего определения. Поэтому Планк её просто «не заметил», и в его оригинальной работе она не фигурировала как самостоятельная фундаментальная единица. В чём её уникальность? Большинство планковских единиц (масса, длина, время) определяются через комбинацию трёх фундаментальных констант *G, c, h* (или *ħ*). Планковская сила определяется по-другому. Её можно получить, разделив планковский импульс на планковское время, но в итоге она сводится к простой и элегантной формуле:

$$\boldsymbol{F = c^4 / G \approx 1.21 \times 10^{44} \text{ Н}}$$

И в этом выражении нет постоянной Планка (*h*). Она зависит только от классических констант гравитации и скорости света. Планк не выводил планковскую силу, как самостоятельную

единицу. Он сконструировал свой набор единиц в 1899 году, комбинируя константы *h, G* и *c* для получения массы, длины и времени. Планк, фокусируясь на «базовых» кирпичиках мироздания (масса, длина, время), просто не уделил внимания этой комбинации. Она была производной от его основных единиц и не была нужна для его задач.

А что же современная физика?

В физике она носит название **«Гипотеза о максимальной силе» (Maximum Force Conjecture)** или **«Гипотеза о максимальном натяжении» (Maximum Tension Conjecture)**.

Она не является доказанной теоремой вроде законов Ньютона. Это предположение о том, что в природе существует жесткий предел, который нельзя превысить.

Общая теория относительности (ОТО) допускает сингулярности — точки, где кривизна пространства-времени уходит в бесконечность. В сингулярности черной дыры формально сила (градиент поля) становится бесконечной. ОТО говорит: *«Да, сила может быть бесконечной»*. Гипотеза о максимальной силе говорит: *«Нет, природа не позволяет бесконечностей, что-то должно сломаться раньше»*. Поэтому это гипотеза находится вне формального математического аппарата физики.

3.2. Вывод Планковской силы из ТАО

Шаг 1. Кварковая сила как гравитация

Для двух кварков на расстоянии r_q:

$$F_q = \frac{G m_P^2}{r_q^2}$$

При $r_q \approx 0.44$ фм $= 4.4 \times 10^{-16}$ м:

$$F_q = \frac{3.16 \times 10^{-26}}{(4.4 \times 10^{-16})^2} = 1.63 \times 10^5 \text{ Н}$$

Это сила глюонной струны (≈16 тонн).

Шаг 2. Переход к планковскому масштабу

Если уменьшить расстояние до $r = l_P = 1.6\times10^{-35}$ м:

$$F_P = \frac{Gm_P^2}{l_P^2}$$

Но $Gm_P^2 = \hbar c$ (по определению m_P), и $l^2_{\text{р}} = \hbar G/\text{с}^3$

$$F_P = \frac{\hbar c}{\hbar G/c^3} = \frac{c^4}{G} \approx 1.21 \times 10^{44}\ \text{Н}$$

Получили планковскую формулу силы! Планковская сила — это та же кварковая сила, но вычисленная на планковском масштабе.

Планковская сила $F_P = c^4/G$ — это максимально возможная сила в природе. Она не зависит от массы или расстояния — это фундаментальный предел, заложенный в структуру физической реальности.

Почему это предел?

1. **Из размерности:** F_P — единственная сила, которую можно составить из G, c, $\hbar$.
2. **Из ОТО:** При силе больше F_P гравитационное поле становится настолько сильным, что образует чёрную дыру с планковским радиусом.
3. **Из ТАО:** При силе F_P решётка не выдерживает — происходит разрыв (переход в физический ноль).

В ТАО это означает: F_P — это предел прочности пиксельной решётки на разрыв.

Что это означает физически:

Если две «точечные» массы, равные планковской, сблизятся до планковской длины – сила гравитации между ними станет предельной по своей величине, при которой произойдёт разрыв пиксельной структуры пространства между ними. При этом эти «точеные массы» приобретут планковскую плотность, т.е. они сами своей общей (взаимной) гравитацией предельно сожмут структуру своих активных пикселей до максимально возможного значения - планковской плотности. Вся планковская масса сожмётся в одину планковскую длину (размер одного недеформированного пикселя).

Почему в протоне действует Планковская сила, но при обычных условиях протон не образует чёрной дыры?

Потому что в протоне нет «точечных» планковских масс при обычных условиях. Масса протона - это масса трёх кварков, которые являются плотно упакованными лентами циркуляции. Лента циркуляции кварка в протоне - это объёмная структура, которая имеет полотность упаковки (активных пикселей): $\rho_{\text{протон}} \sim 10^{71}$ м$^{-3}$, плотность протона - $p \approx 6.7\times10^{17}$ кг/м³ . Это меньше чем планковская плотность. При такой плотности упаковки Планковская сила не достигает максимального значения.

Глава 9. Три типа сжатия в ТАО: Лоренцево, Планковское, и Несжимаемость.

Часть 1. Фундамнтальный принцип: несжимаемость активного пикселя.

1.1. Аксиома ТАО

«Активный пиксель имеет размер планковской длины $l_P = 1.616\times10^{-35}$ м в своей системе покоя. Он не сжимается и не растягивается в статическом состоянии. Он только сжимает или растягивает окружающие нулевые пиксели.»

Что это означает:

- Нулевые пиксели (0) — упругие. Их размер может меняться: сжиматься ($\delta < 0$) или растягиваться ($\delta > 0$).

- Активные пиксели (1) — абсолютно жёсткие в своей системе покоя. Их размер фиксирован и равен l_P.

1.2. Деформация нулевых пикселей

Для нулевых пикселей деформация определяется как:

$$\delta = \frac{l - l_P}{l_P}$$

Где:

- $\delta = 0$ — пиксель в равновесии (размер равен l_P).

- $\delta < 0$ — пиксель сжат (размер меньше l_P).

- $\delta > 0$ — пиксель растянут (размер больше l_P.

Важно: нулевые пиксели могут сжиматься и растягиваться. Активные пиксели в статике — нет.

Часть 2. Лоренцево (релятивистское) сжатие

2.1. Лоренцево сжатие — это сжатие активных пикселей в направлении движения, возникающее при движении замкнутого паттерна (частицы с массой) со скоростью *v*, близкой к *c*.

Формула:

$$l = \frac{l_P}{\gamma}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

2.2. Условия действия

Условие	Что происходит
Движется замкнутый паттерн (электрон, протон, атом)	Активные пиксели в его составе **сжимаются** в направлении движения
Движется разомкнутый паттерн (фотон)	Лоренцево сжатие **не действует**

2.3. Почему фотон не сжимается

Фотон — это разомкнутая цепочка активных пикселей. У него нет внутренней циркуляции, нет замкнутого контура, который мог бы «перенастраиваться» при движении. Поэтому его длина волны изменяется (красное/синее смещение), но сами активные пиксели не сжимаются.

2.4. Свойства Лоренцева сжатия

Свойство	Описание
Причина	Движение относительно решётки

Свойство	Описание
Что сжимается	Активные пиксели в направлении движения
Когда действует	Только для замкнутых паттернов (частиц с массой)
Обратимость	Да — при замедлении пиксели возвращаются к l_P
Пример	Релятивистское сокращение длины

Часть 3. Планковское сжатие

3.1. Планковское сжатие — это сжатие активного пикселя, возникающее при достижении предела деформации решётки ($\delta \to -1$) в чёрной дыре.

Это сжатие действует на любой активный пиксель, потому что при таком колоссальном градиенте деформации и силе никакие замкнутые паттерны существовать не могут. Все структуры разрушены, остаются только отдельные активные пиксели.

3.2. Условие наступления

Для нулевых пикселей:

$$\delta = \frac{l - l_P}{l_P} = -1$$

Что это означает: нулевой пиксель сжат до нулевого размера ($l = 0$). Он рвётся и исчезает — перестаёт существовать как элемент решётки. Его энергия, в виде виртона, передаётся по решётке.

Для активных пикселей при планковском сжатии:

$$\delta = \frac{l - l_P}{l_P} \to -1$$

Что это означает: активный пиксель стремится к предельному сжатию, но никогда не достигает $l = 0$. Его размер становится $l_{сж} \ll l_P$, но остаётся положительным.

3.3. Почему планковское сжатие сжимает любой активный пиксель

При достижении планковской плотности:

1. Нулевые пиксели исчезают ($\delta = -1$, $l = 0$) — они рвутся.
2. Градиент деформации становится колоссальным.
3. Никакие паттерны не могут существовать — замкнутые цепи рвутся.
4. Отдельные активные пиксели сжимаются до размеров $l_{сж} \ll l_P$.

Часть 4. Сравнительная таблица

Свойство	Лоренцево сжатие	Планковское сжатие
Причина	Движение относительно решётки	Достижение предела деформации ($\delta = -1$)
Что сжимается	Активные пиксели (вдоль движения)	Активные пиксели (во всех направлениях)
Когда действует	Для замкнутых паттернов	Для любых активных пикселей
Условие	$v \to c$	$\rho \to \rho_P$ (планковская плотность)

Свойство	Лоренцево сжатие	Планковское сжатие
Размер пикселя	$l = l_P/\gamma$	$l_{сж} \ll l_P$
Обратимость	Да	Нет
Пример	Сокращение длины	Чёрная дыра

Часть 5. Во сколько раз уменьшается пиксель при планковском сжатии.

5.1. Количество сжатых пикселей в объёме одного простого пикселя

В объёме одного недеформированного пикселя (объём l_P^3) при планковской плотности помещается ровно **одна планковская масса** активных пикселей:

$$n_3 = \frac{m_P}{\mu}$$

Где:

- $m_P = 2.176 \times 10^{-8}$ кг — планковская масса

- $\mu = 6.07 \times 10^{-54}$ кг — масса одного активного пикселя

Подставляем:

$$n_3 = \frac{2.176 \times 10^{-8}}{6.07 \times 10^{-54}} = 3.58 \times 10^{45}$$

Это ровно планковская масса, выраженная в активных пикселях!

5.2. Во сколько раз уменьшается длина пикселя

Если n^3 сжатых пикселей помещаются в одном недеформированном пикселе, то размер каждого сжатого пикселя:

Подставляем:

$$l_{\text{сж}} = \frac{l_P}{\sqrt[3]{n_3}}$$

$$\sqrt[3]{n_3} = \sqrt[3]{3.58 \times 10^{45}} = 1.53 \times 10^{15}$$

$$l_{\text{сж}} = \frac{1.616 \times 10^{-35}}{1.53 \times 10^{15}} = 1.056 \times 10^{-50}\ \text{м}$$

Отношение:

$$\frac{l_P}{l_{\text{сж}}} = 1.53 \times 10^{15}$$

То есть при планковском сжатии длина активного пикселя уменьшается в 1.53×10^{15} раз!

Часть 6. Сколько сжатых пикселей влезает в объём одного простого пикселя

6.1. Ответ

$$\boxed{n_3 = \frac{m_P}{\mu} = 3.58 \times 10^{45}}$$

В один недеформированный пиксель (объём l_P^3) влезает 3.58×10^{45} активных пикселей, сжатых по-планковски.

6.2. Физический смысл

Это ровно одна планковская масса. Планковская масса — это масса, которая помещается в объём одного пикселя при планковской плотности.

$$\rho_P = \frac{m_P}{l_P^3} = \frac{n_3 \cdot \mu}{l_P^3}$$

Глава 10. Чёрная дыра

Часть 1. Обычная звезда

1.1. Ядерный синтез

Звезда - огромный шар из газа, в основном водорода и гелия. В центре этого шара невероятное давление и температура в миллионы градусов. В центре атомы водорода (протоны) сталкиваются друг с другом. При столкновении они сливаются в ядра гелия. При этом выделяется энергия — это и есть ядерный синтез. Эта энергия создаёт давление наружу, которое уравновешивает гравитацию, стягивающую звезду внутрь. Звезда живёт, пока есть топливо (водород).

1.2. Эволюция звезды

Когда водород заканчивается:

1. Звезда начинает сжигать гелий → образует углерод и кислород.
2. Затем сжигает углерод → образует неон, магний, кремний.
3. Затем сжигает кремний → образует железо.

Каждый этап проходит при все более высокой температуре и длится все меньше времени. Если водород горит миллионы лет, то кремний сгорает до железа всего за пару дней. На железе синтез останавливается. Железо имеет максимальную удельную энергию связи на нуклон среди всех элементов. Это значит, что слияние (синтез) легких элементов в железо выделяет энергию (это мы и называем горением звезды). Слияние железа в более тяжелые элементы (кобальт, никель, и т.д.) требует поглощения энергии извне (эндотермическая реакция).

Когда звезда подходит к ядру из железа, она пытается сжать его дальше, чтобы начать синтез, но вместо энергии она получает «вакуум» в балансе. Ядерный «двигатель» глохнет, потому что топливо (железо) не горит, а гасит огонь. Чтобы слить ядра железа в более тяжёлые элементы, нужно затратить энергию, а не

выделить её. Ядерный синтез перестаёт поддерживать звезду. Звезда больше не может сопротивляться гравитации.

Звезда перестает вырабатывать энергию, которая удерживала внешние слои от падения (давление излучения и газа). Гравитация побеждает, и происходит **коллапс ядра**:

- Ядро (размером с Землю) сжимается до диаметра всего ~20 км за доли секунды.

- Электроны и протоны продавливаются друг в друга, превращаясь в нейтроны (образуется нейтронная звезда), если масса ядра не слишком велика.

- Если масса ядра превышает предел Оппенгеймера-Волкова (около 2–3 масс Солнца), коллапс не останавливается ни на чем, и образуется **черная дыра**.

Именно в этом процессе (взрыв сверхновой) внешние слои звезды разлетаются, а в момент самого взрыва, за счет колоссального потока нейтрино, успевают синтезироваться самые тяжелые элементы (золото, платина, уран) — но это происходит не в недрах звезды, а в ударной волне при взрыве.

Часть 2. Планковская реакция: разрыв лент.

Нейтрон в ТАО — это узел из трёх кварков (лент циркуляции):

- u, d, d (два нижних, один верхний).

- Ленты переплетены и сложены в компактный объём.

- Внутри — гравитационная яма с плотностью $\sim 10^{71}$ пикселей/м³.

Нейтрон — это «почти чёрная дыра» для кварков.

Когда гравитация сжимает нейтроны:

1. Расстояние между нейтронами уменьшается.
2. Гравитационные ямы нейтронов начинают перекрываться.
3. Внешнее давление (градиент деформации) становится огромным.

Наступает момент, когда гравитационное
сжатие становится сильнее ядерных сил. Нейтроны
начинают «проваливаться» вглубь. Когда давление достигает
критического значения:

1. Ленты циркуляции нейтронов (кварки) не выдерживают.
2. Они рвутся — складки распрямляются.
3. Активные пиксели (из которых состоят ленты) высвобождаются.

Это — не ядерная реакция. Это — Планковская реакция.

Она идёт по экспоненте, пока плотность активных пикселей в центре не достигает планковской.

Часть 3. Рождение чёрной дыры.

3.1. Достижение планковской плотности.

Когда концентрация активных пикселей в центре достигает:

$$\rho_P = \frac{m_P}{l_P^3} \approx 5.16 \times 10^{96}\ \text{кг/м}^3$$

Происходит необратимое событие: разрыв решётки. При планковской плотности нулевые пиксели внутри сферы рвутся — перестают существовать. Деформация достигает предела:

$$\delta = \frac{l - l_P}{l_P} \to -1$$

Трёхмерная решётка внутри исчезает.

Это — физический ноль.

Это область, где нет физического пространства. На границе этой области активные пиксели не могут исчезнуть —

$$l_{\text{сж}} = \frac{l_P}{\sqrt[3]{m_P/\mu}} \approx 1.06 \times 10^{-50}\ \text{м}$$

они собираются на поверхности. Они сжимаются до размеров $l_{сж} \ll l_P$:

Они образуют сферическую оболочку — поверхность чёрной дыры.

Часть 4. Планковская плотность

4.1. Планковская плотность — это максимально возможная плотность материи во Вселенной:

$$\rho_P = \frac{m_P}{l_P^3} \approx 5.16 \times 10^{96} \text{ кг/м}^3$$

Что это означает:

- Одна планковская масса $m_P \approx 2.176 \times 10^{-8}$ кг.
- Сжата до размера одного недеформированного пикселя $l_P \approx 1.616 \times 10^{-35}$ м.

- Это абсолютный предел сжатия — меньше нельзя.

Только планковская плотность «рвёт» решётку.

Критическая деформация:

$$\delta = \frac{l - l_P}{l_P} \to -1$$

Условие достижения:

$\rho = \rho_P$

Если плотность меньше планковской:

- Деформация $\delta > -1$.

- Решётка не рвётся — она просто сжата.

- Пространство (физическое) существует.

Если плотность равна планковской:

- Деформация $\delta \to -1$.

- Решётка рвётся.

- Образуется физический ноль.

Вывод: только планковская плотность способна разорвать решётку. Меньшая плотность — только сжатие.

Часть 5. Точечная планковская масса

5.1. Точечная планковская масса – это теоретическая минимальная чёрная дыра.

Толщина поверхностного слоя не может быть меньше планковской длины, потому что иначе сжатие не достигнет критической величины.

5.2. Расчёт для чёрной дыры солнечной массы

Радиус Шварцшильда для Солнца:

$r_s \approx 2.95 \times 10^3$ м

Количество пикселей в массе Солнца:

$$N = \frac{M_\odot}{\mu} \approx 3.28 \times 10^{83}$$

Количество пикселей на поверхности (без сжатия):

$$N_{\text{пов}} = \frac{4\pi r_s^2}{l_P^2} \approx 4.20 \times 10^{77}$$

Толщина поверхностного слоя:

$$\Delta r = \frac{l_P^2}{4r_s} \approx 8.25 \times 10^{-45} \text{ м}$$

Сравнение с недеформированным пикселем:

$$\frac{\Delta r}{l_P} = \frac{8.25 \times 10^{-45}}{1.616 \times 10^{-35}} = 5.10 \times 10^{-10}$$

Толщина слоя в 2×10^9 раз меньше планковской длины.

Вывод: поверхностный слой чёрной дыры не может состоять из сплошной сферы точечных планковских масс. Он слишком тонкий. На создание поверхности чёрной дыры не хватает самой массы объекта – количества пикселей с планковской плотностью и соответствующим объёмом. Поверхность чёрной дыры — это не сплошная сфера. Это разреженная структура.

Часть 6. Волны Де Бройля на поверхности чёрной дыры. Как точечные планковские массы создают волновую структуру на горизонте.

6.1. Напомним, что фотон — это разомкнутая цепочка активных пикселей.

Два режима фотона:

Режим	Длина волны
Короткие волны ($\lambda < \lambda_{крит}$)	Спираль — непрерывная цепочка пикселей, свёрнутая в спираль
Длинные волны ($\lambda > \lambda_{крит}$)	Отдельные порции — цепочка разрывается, фотоны летят как «изолированые» частицы, но их траектория — синусоида (волна де Бройля)

Критическая длина волны:

$$\lambda_{крит} = \frac{h}{\varepsilon_1} \cdot c \cdot l_P \approx 4.77 \times 10^{-12} \text{ м}$$

6.2. Что такое «длинные волны» для фотона

Когда длина волны фотона больше критической:

1. Цепочка разрывается — фотон перестаёт быть непрерывной спиралью.
2. Он становится почти прямой цепочкой — «безмассовой частицей».
3. Эта цепочка летит не по прямой, а по синусоидальной траектории.
4. Шаг синусоиды — это длина волны де Бройля для фотона.

То есть для длинных волн:

- Фотон — это частица (локализованная цепочка).

- Но её траектория — волна (синусоида).

- Частица «скачет» по волне.

Это и есть корпускулярно-волновой дуализм в ТАО.

Часть 7. Планковская масса – это «длина волны» на поверхности.

7.1. Что такое планковская масса на поверхности

Планковская масса на поверхности чёрной дыры — это точечная «частица» размером в недеформированный пиксель. Но! Она не лежит неподвижно. Она циркулирует по поверхности. Её траектория — это не прямая линия. Это волна.

Какая волна?

Волна де Бройля!

Для планковской массы длина волны:

$$\lambda_P = \frac{h}{m_P c} = 2\pi l_P$$

Это — шаг её траектории.

Ключевой вывод: точечная «планковская масса» на поверхности чёрной дыры ведёт себя как длинноволновый фотон — она и «частица», и волна одновременно.

Часть 8. Как выглядят волны на поверхности.

8.1. Меридианы и параллели

Представьте поверхность чёрной дыры как сферу. Волны де Бройля на этой сфере — это не просто круги. Это параллели — линии, идущие параллельно экватору. Каждая планковская масса движется по своей параллели. Когда множество масс движется по параллелям:

1. Они создают волновую картину на поверхности.
2. Волны интерферируют — складываются и вычитаются.
3. Возникают стоячие волны — узлы и пучности.

Число волн на поверхности:

$$\frac{2\pi r_s}{\lambda_P} = 2N$$

где N — число планковских масс.

Это означает, что на поверхности укладывается целое число полуволн.

8.2. Сложность системы

Мы знаем, что:

1. Планковские массы циркулируют по поверхности.
2. Их траектории — параллели.
3. Они создают волны деформаций.

Но мы не знаем:

- Точное распределение масс по поверхности.

- Фазу каждой волны.

- Как именно массы взаимодействуют друг с другом.

Это — сложная динамическая система.

Для длинноволнового фотона мы тоже не знаем точную траекторию каждой частицы. Но мы знаем, что частица движется по синусоиде, длина волны — $\lambda = h/p$. Это создаёт интерференционную картину.

Так и здесь:

- Мы знаем, что массы движутся по меридианам.

- Длина волны — $\lambda_P = 2\pi l_P$.

Детали — сложны, но принцип ясен.

Проведем предварительный примерный расчёт: площадь, количество, плотность и расстояние между массами на горизонте.

Часть 9. Количество планковских масс в чёрной дыре.

9.1. Общая формула

Масса чёрной дыры MM состоит из NN планковских масс:

$$N = \frac{M}{m_P}$$

9.2. Для солнечной массы

$$N = \frac{1.989 \times 10^{30}}{2.176 \times 10^{-8}} = 9.14 \times 10^{37}$$

В чёрной дыре солнечной массы содержится:

$N \approx 9.14 \times 10^{37}$ планковских масс

9.3. Для сверхмассивной чёрной дыры (M87*)

$M \approx 6.5 \times 10^9 M_\odot \approx 1.29 \times 10^{40}$ кг

$$N = \frac{1.29 \times 10^{40}}{2.176 \times 10^{-8}} = 5.93 \times 10^{47}$$

В M87 содержится:

$N \approx 5.93 \times 10^{47}$ планковских масс

Часть 10. Площадь поверхности горизонта.

10.1. Формула

$$A = 4\pi r_s^2$$

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}$$

10.2. Для солнечной массы

$r_s \approx 2.95\times10^3$ м

$A = 4\pi\ (2.95\times10^3)^2 = 1.09\times10^8$ м^2

10.3. Для M87*

$$r_s = \frac{2G \cdot 1.29 \times 10^{40}}{c^2} \approx 1.91 \times 10^{13} \text{ м}$$

$$A = 4\pi(1.91 \times 10^{13})^2 \approx 4.58 \times 10^{27} \text{ м}^2$$

$$\boxed{A \approx 4.58 \times 10^{27} \text{ м}^2}$$

10.4 Площадь, занимаемая планковскими массами.

4.1. Каждая планковская масса — это сжатый активный пиксель.

Его размер: $l_{сж} \approx 1.06\times10^{-50}$ м.

Площадь, занимаемая одной массой:

$S_{масса} = l_{сж}^2 \approx (1.06\times10^{-50})^2 = 1.12\times10^{-100}$ м^2

4.2. Общая площадь всех масс

Для солнечной массы:

$S_{\text{всех}} = N \cdot S_{\text{масса}} = 9.14 \times 10^{37} \cdot 1.12 \times 10^{-100} = 1.02 \times 10^{-62}$ м2

Для M87*:

$S_{\text{всех}} = 5.93 \times 10^{47} \cdot 1.12 \times 10^{-100} = 6.64 \times 10^{-53}$ м2

10.5. Протяжённость поверхности.

Доля площади, занятая массами

Для солнечной массы:

$$\frac{S_{\text{всех}}}{A} = \frac{1.02 \times 10^{-62}}{1.09 \times 10^{8}} = 9.36 \times 10^{-71}$$

Для M87*:

$$\frac{S_{\text{всех}}}{A} = \frac{6.64 \times 10^{-53}}{4.58 \times 10^{27}} = 1.45 \times 10^{-80}$$

Это означает, что планковские массы занимают ничтожную долю поверхности!

10.6. Среднее расстояние между массами

Если N точек распределены по сфере радиуса r_s, то средняя площадь на одну точку:

$$S_{\text{на точку}} = \frac{A}{N}$$

Для солнечной массы:

$$S_{\text{на точку}} = \frac{1.09 \times 10^{8}}{9.14 \times 10^{37}} = 1.19 \times 10^{-30}\ \text{м}^2$$

Среднее расстояние между массами**:**

$$d \approx \sqrt{S_{\text{на точку}}} = \sqrt{1.19 \times 10^{-30}} = 1.09 \times 10^{-15}\ \text{м}$$

$$\boxed{d \approx 1.09 \times 10^{-15}\ \text{м} \approx 1\ \text{фм}}$$

Для M87*:

$$S_{\text{на точку}} = \frac{4.58 \times 10^{27}}{5.93 \times 10^{47}} = 7.72 \times 10^{-21}\ \text{м}^2$$

$$d \approx \sqrt{7.72 \times 10^{-21}} = 8.79 \times 10^{-11}\ \text{м}$$

$$\boxed{d \approx 8.79 \times 10^{-11}\ \text{м} \approx 0.88\ \text{Å}}$$

Часть 11. Как редкие точки создают огромную гравитацию.

Мы выяснили, что поверхность чёрной дыры — это не сплошная сфера, а разреженная структура из планковских масс.

Для солнечной чёрной дыры:

- Число планковских масс: $N \approx 9.14 \times 10^{37}$

- Площадь горизонта: $A \approx 1.09 \times 10^{8}$ м²

- Среднее расстояние между массами:

$$d \approx 1\text{фм} = 10^{-15}\ \text{м}$$

- Доля площади, занятая массами: $\approx 10^{-70}$

То есть поверхность на 99.999...% состоит из пустоты (нулевых пикселей).

Вопрос: как такая разреженная структура может создавать **чудовищную гравитацию**, которая не выпускает даже свет?

Ответ: гравитация создаётся всей массой, которая находится на поверхности. И хотя масса распределена по поверхности разреженно, её общее количество внутри сферы радиуса r_s колоссально.

Часть 12. Сила на горизонте чёрной дыры.

Мы хотим найти силу, действующую на пробное тело массой m, когда оно находится на горизонте событий чёрной дыры массой M.

В стандартной ОТО эта задача не имеет однозначного ответа, потому что:

1. В ОТО гравитация — это не сила. Это искривление пространства-времени.
2. Ускорение свободного падения расходится на горизонте для наблюдателя на бесконечности.
3. «Сила» на горизонте зависит от того, как её измеряют.

В ТАО ситуация другая. Гравитация — это деформация пиксельной решётки. Это физический процесс. Сила — это реакция решётки. Она конечна на горизонте. Её можно вычислить.

12.1. Гравитационный радиус

Гравитационный радиус (горизонт событий) определяется формулой:

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}$$

Где:

- r_s — гравитационный радиус (расстояние от центра, на котором скорость убегания равна скорости света).
- $G = 6.674 \times 10{-}11$ м^3/(кг·с^2) — гравитационная постоянная.
- M — масса чёрной дыры.
- $c = 2.998 \times 10^8$ м/с — скорость света.

12.2. Что происходит на горизонте в ТАО

В ТАО горизонт — это граница, на которой сжатие решётки достигает критического значения:

$\delta = -1$

Что это значит:

- Нулевые пиксели сжаты до нулевого размера.
- Решётка рвётся.

- Пространство как физическая среда исчезает.

- Остаётся физический ноль — область, где нет решётки.

Но: на самом горизонте решётка ещё существует. Она сжата до предела, но не разорвана. Градиент деформации конечен.
Сила конечна.

12.3. Классическая формула силы.

Формула Ньютона

Для двух масс M и m, находящихся на расстоянии r, сила гравитационного притяжения:

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

Где:

- F — сила гравитационного притяжения (в ньютонах).

- G — гравитационная постоянная.

- M — масса первого тела (чёрной дыры).

- m — масса второго тела (пробного тела).

- r — расстояние между центрами масс.

Почему в ОТО эта формула не работает на горизонте

В ОТО:

- Гравитация — это не сила. Это геометрия.

- На горизонте метрика $g_{00} \to 0$, $g_{rr} \to \infty$.

- Ускорение свободного падения расходится для наблюдателя на бесконечности.

- «Сила» зависит от системы отсчёта.

Следовательно: формула Ньютона неприменима на горизонте в ОТО.

Почему в ТАО эта формула работает

В ТАО:

- Гравитация — это сжатие решётки. Это физический процесс.
- На горизонте решётка сжата до предела, но не разорвана.
- Градиент деформации конечен.
- Сила — это реакция решётки. Она конечна.
- Формула Ньютона работает до горизонта, потому что она описывает градиент деформации.

Обоснование:

В ТАО потенциал деформации:

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{r}$$

Градиент:

$$\nabla\Phi = \frac{GM}{r^2}$$

На горизонте $r = r_s$:

$$\nabla\Phi = \frac{GM}{r_s^2}$$

Это — конечно. Следовательно, сила конечна.

12.4. ПОДСТАНОВКА $r = r_s$

Формула силы

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}$$

Окончательный вид

$$\boxed{F = \frac{mc^4}{4GM}}$$

12.5. Физический смысл

Символ	Что означает	Размерность
F	Сила на горизонте чёрной дыры	Н (кг·м/с²)
m	Масса пробного тела	кг
***c*4**	Скорость света в четвёртой степени	м⁴/с⁴
G	Гравитационная постоянная	м³/(кг·с²)
M	Масса чёрной дыры	кг

12.6. Пропорциональности

Сила пропорциональна массе пробного тела:

$F \propto m$

Сила обратно пропорциональна массе чёрной дыры:
$F \propto 1/M$

Это — контринтуитивно. Чем массивнее чёрная дыра,
тем меньше сила на горизонте.

Причина: горизонт большой чёрной дыры находится далеко от центра. Гравитационный радиус растёт линейно с массой:

$r_s \propto M$

Сила убывает как $1/r^2$:

$$F \propto \frac{M}{r_s^2} \propto \frac{M}{M^2} \propto \frac{1}{M}$$

Следовательно: чем больше масса, тем больше горизонт, тем меньше сила на нём.

12.7. В ОТО — бесконечность

В ОТО ускорение свободного падения для статического наблюдателя на горизонте:

$$a = \frac{GM}{r^2\sqrt{1 - r_s/r}}$$

При $r \to r_s$:

$$\sqrt{1 - r_s/r} \to 0$$

Следовательно:

$a \to \infty$

Это — расходимость. Она означает, что статический наблюдатель не может существовать на горизонте. Ему нужно бесконечное ускорение, чтобы оставаться на месте.

12.8. В ТАО — конечность

В ТАО гравитация — это сжатие решётки. Сжатие не может быть бесконечным, потому что:

- Пиксель имеет минимальный размер lPl_P.
- Сжатие ограничено $\delta \geq -1$.
- На горизонте $\delta = -1$, но градиент конечен.

Следовательно: сила конечна.

12.9. Что такое приливные силы

Приливные силы — это разность гравитационных сил, действующих на разные точки протяжённого тела.

Формула:

$$F_{\text{прил}} = \frac{2GMm}{r^3} \cdot \Delta r$$

Где Δr — размер тела.

На горизонте

Подставляем $r = r_s = 2GM/c^2$:

$$F_{\text{прил}} = \frac{mc^6}{4G^2M^2} \cdot \Delta r$$

Сравнение с силой

$$\frac{F_{\text{прил}}}{F} = \frac{mc^6\Delta r/(4G^2M^2)}{mc^4/(4GM)} = \frac{c^2\Delta r}{GM}$$

Для $\Delta r \ll r_s$:

$$\frac{F_{\text{прил}}}{F} \ll 1$$

Приливные силы малы по сравнению с основной силой. Это согласуется с ТАО: на горизонте все точки тела испытывают почти одинаковую силу.

Сводная таблица

Чёрная дыра	**Масса**	r_s	***F*** **(для 1 кг)**
Звёздная (10 $M\odot$)	1.99×10^{31} кг	29.5 км	1.52×10^{12} Н
Sgr A* (4.3 млн $M\odot$)	8.55×10^{36} кг	1.27×10^{7} км	3.54×10^{6} Н
M87* (6.5 млрд $M\odot$)	1.29×10^{40} кг	1.92×10^{10} км	2.34×10^{3} Н

Часть 13. Ускорение свободного падения на горизонте

13.1. Что такое ускорение на горизонте

Ускорение свободного падения — это ускорение, которое испытывает пробное тело, свободно падающее в гравитационном поле. В ТАО это градиент деформации решётки:

$$a = -\nabla\Phi = \frac{GM}{r^2}$$

Где:

- $G = 6.674\times10{-}11$ м^3/(кг·с^2) — гравитационная постоянная.
- M — масса чёрной дыры.
- r — расстояние от центра.

На горизонте $r = r_s = 2GM/c^2$:

$$a_s = \frac{GM}{r_s^2} = \frac{GM}{(2GM/c^2)^2} = \frac{GM \cdot c^4}{4G^2M^2} = \frac{c^4}{4GM}$$

Итог:

$$\boxed{a_s = \frac{c^4}{4GM}}$$

13.2. Сравнение с силой

Сила на горизонте:

$$F_s = \frac{mc^4}{4GM}$$

Ускорение:

$$a_s = \frac{F_s}{m} = \frac{c^4}{4GM}$$

Ускорение не зависит от массы пробного тела.

Это — принцип эквивалентности в действии: все тела падают с одинаковым ускорением.

13.3. Численные значения

Чёрная дыра	Масса	r_s	a_s
Звёздная (10 $M_\odot$)	1.99×10^{31} кг	29.5 км	1.52×10^{12} м/с^2
Промежуточная (1000 $M_\odot$)	1.99×10^{33} кг	2950 км	1.52×10^{10} м/с^2
Sgr A* (4.3 млн $M_\odot$)	8.55×10^{36} кг	1.27×10^{7} км	3.54×10^{6} м/с^2
M87* (6.5 млрд $M_\odot$)	1.29×10^{40} кг	1.92×10^{10} км	2.34×10^{3} м/с^2

13.4. Физический смысл

Ускорение на горизонте:

- Конечно (не бесконечно, как в ОТО).
- Обратно пропорционально массе чёрной дыры.
- Не зависит от массы пробного тела.

Для сравнения:

- Ускорение на поверхности Земли: $g_\oplus = 9.81$ м/с^2.
- Ускорение на горизонте солнечной ЧД: 1.52×10^{12} м/с^2 — в 1.5×10^{11} раз больше.
- Ускорение на горизонте M87*: 2.34×10^{3} м/с^2 — в 239 раз больше земного.

Вывод: на горизонте сверхмассивной чёрной дыры ускорение умеренное. На горизонте звёздной — чудовищное.

Часть 14. Плотность чёрной дыры

14.1. Плотность — это отношение массы к объёму:

$$\rho = \frac{M}{V}$$

Объём чёрной дыры — это объём сферы радиусом r_s:

$$V = \frac{4}{3}\pi r_s^3$$

Подставляем $r_s = 2GM/c^2$:

$$\boxed{\rho = \frac{3c^6}{32\pi G^3 M^2}}$$

14.2. Пропорциональности

Плотность обратно пропорциональна квадрату массы:

$$P \propto 1/M^2$$

Это — контринтуитивно. Чем массивнее чёрная дыра, тем меньше её плотность.

Численные значения

Чёрная дыра	Масса	r_s	ρ
Звёздная (10 $M\odot$)	1.99×10^{31} кг	29.5 км	1.85×10^{17} кг/м^3
Промежуточная (1000 $M\odot$)	1.99×10^{33} кг	2950 км	1.85×10^{13} кг/м^3
Sgr A* (4.3 млн $M\odot$)	8.55×10^{36} кг	1.27×10^{7} км	1.0×10^{6} кг/м^3
M87* (6.5 млрд $M\odot$)	1.29×10^{40} кг	1.92×10^{10} км	4.4×10^{2} кг/м^3

14.3. Физический смысл

Плотность чёрной дыры:

- Обратно пропорциональна квадрату массы.

- Для звёздной ЧД — чудовищная: 1.85×10^{17} кг/м^3 (в 10^{14} раз больше плотности воды).

- Для M87* — умеренная: 4.4×10^2 кг/м3 (сравнима с плотностью воздуха при нормальных условиях: 1.2 кг/м³).

Вывод: сверхмассивные чёрные дыры не плотные. Их плотность меньше плотности воды. Это согласуется с современными представлениями.

В ТАО чёрная дыра — это сфера из активных пикселей. Вся масса сосредоточена на поверхности. Внутри — физический ноль (нет решётки).

Плотность — это условная величина. Она не описывает внутреннюю структуру. Она описывает среднее распределение массы в объёме сферы.

Истинная плотность — это плотность поверхностного слоя. Она огромна.

Часть 15. Теорема Ньютона-Биркгофа

15.1. Что говорит физика

Для сферически-симметричного распределения массы:

Гравитационное поле на расстоянии *r* от центра определяется ТОЛЬКО массой, находящейся ВНУТРИ сферы радиуса *r*.

Всё, что снаружи — не имеет значения.

15.2. Применение к чёрной дыре

Для чёрной дыры радиуса r_s:

- Вся масса M находится на поверхности горизонта.

- Неважно, как она распределена по поверхности.

- Неважно, сплошная она или разреженная.

Гравитационный потенциал на горизонте:

$$\Phi = -\frac{GM}{r_s}$$

Градиент (сила):

$$\nabla\Phi = \frac{GM}{r_s^2}$$

Эти величины зависят только от M и r_s, а не от того, как масса распределена по поверхности. Это полностью соответсвует ТАО.

15.2. Аналогия с галактикой

Галактика — это тоже разреженная структура:

- Звёзды разделены световыми годами.

- Между ними — пустота (нулевые пиксели).

Но гравитация галактики определяется всей её массой. Звёзды на окраинах чувствуют гравитацию всей галактики, а не только ближайших соседей. Так и здесь: фотон на горизонте чувствует гравитацию всей массы чёрной дыры, которая находится на поверхности.

Часть 16. Пульсация решётки

16.1. Как волны существуют, если решётка разорвана

Вы спросите: *«Если внутри решётка разорвана, то по чему циркулируют волны?»*

Ответ: решётка пульсирует.

На поверхности происходит непрерывный процесс:

1. Планковские массы циркулируют.
2. Между ними решётка пытается восстановиться.
3. Но массы не дают — их гравитация снова рвёт решётку.

4. Цикл повторяется.

Решётка то образуется, то рвётся.

Это — пульсация решётки на поверхности.

Решётка не восстанавливается внутри чёрной дыры:

- Концентрация масс максимальна.

- Решётка не успевает восстановиться между пульсациями.

- Образуется устойчивый физический ноль.

На поверхности:

- Пульсация непрерывна.

- Волны де Бройля «бегут» по поверхности.

- Это и есть вращение чёрной дыры.

Теперь подробнейшим образом рассмотрим, что происходит с фотоном при приближении к ЧД.

Часть 15. Замедление времени.

Для начала вспомним что такое замедление времени в ТАО.

В ТАО время — это частота обновления пиксельной решётки:

$$f = \frac{1}{t_{\text{лок}}}$$

Замедление времени — это уменьшение частоты обновления.

16.1. Лоренцево (кинематическое) замедление времени.

Формула

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Или через частоту:

$$f = \frac{f_0}{\gamma} = f_0\sqrt{1 - v^2/c^2}$$

При движении замкнутого паттерна (частицы с массой) со скоростью *v* относительно решётки:

1. Пиксели сжимаются в направлении движения (Лоренцево сжатие):

$$l = \frac{l_P}{\gamma}$$

2. Путь циркуляции паттерна становится короче (в проекции на решётку).
3. Внутренняя частота циркуляции падает:

$$f = \frac{f_0}{\gamma}$$

4. Время замедляется.

Лоренцево замедление времени не зависит от гравитации. Это чисто кинематический эффект, связанный с движением замкнутого паттерна относительно решётки.

Применяется: к частицам с массой (электронам, протонам, атомам).

Не применяется: к фотонам (разомкнутым цепочкам).

Фотон — это разомкнутая цепочка. У него нет внутренней циркуляции. Нет замкнутого контура, который можно было бы «сжать» в направлении движения, у него нет инерции в направлении движения (у него нет обратных токов циркуляции как у замкнутого паттерна). Поэтому нет внутренней частоты, которая

могла бы «упасть». У него есть только скорость распространения относительно решётки, которая равна скорости света.

Вывод: Лоренцево замедление времени не действует на фотон.

16.2. Гравитационное замедление времени.

Формула в ТАО

$$\frac{d\tau}{dt} = 1 + \frac{\Phi}{c^2} = 1 - \frac{GM}{c^2 r}$$

Или через частоту:

$$f(r) = f_0 \left(1 - \frac{GM}{c^2 r}\right)$$

В точной форме (для сильных полей):

$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 r}} = \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}}$$

Физический механизм в ТАО

При нахождении **любого паттерна** (и замкнутого, и разомкнутого) в гравитационном поле:

1. **Нулевые пиксели сжаты** ($l < l_P$).
2. **Размер пикселя уменьшается**:

$$l = l_P \left(1 + \frac{\Phi}{c^2}\right) = l_P \left(1 - \frac{GM}{c^2 r}\right)$$

3. **Время такта увеличивается**:
4. **Частота обновления падает**:

$$t_{\text{лок}} = t_P \cdot \frac{l_P}{l}$$

$$f = \frac{f_0}{1 + \Phi/c^2}$$

5. **Время замедляется.**

Этот механизм позволяет сохранить единство законов физики во всех системах отсчёта, независимо от того движется паттерн относительно решётки, покоится или находится в гравитационном поле.

Важно: Гравитационное замедление времени не зависит от движения. Это эффект статической деформации решётки.

Применяется: ко всем паттернам — и к частицам с массой, и к фотонам, которые находятся в гравитационном поле.

16.3. Общая формула замедления времени в ТАО.

Полное замедление времени (гравитация + движение):

$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \cdot \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}}$$

Или через потенциалы:

$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \cdot \left(1 + \frac{\Phi}{c^2}\right)$$

Где:

- Первый множитель — **кинематическое (Лоренцево) замедление**.

- Второй множитель — **гравитационное замедление**.

Когда фотон подлетает к чёрной дыре, он входит в зону, где пиксели сжимаются. А сжатие пикселей означает, что внутренняя частота циркуляции падает! Но для фотона внутренняя циркуляция это его циркуляция как скорость относительно решётки: скорость его распространения! Частота его циркуляции замедляется, скорость фотона падает!

16.4. Связь сжатия пикселя и частоты циркуляции.

В ТАО локальная скорость света зависит от деформации решётки:

$$c_{\text{лок}} = c \cdot \sqrt{1 + \delta}$$

При сжатии ($\delta < 0$): $c_{\text{лок}} < c$.

На горизонте ($\delta \to -1$): $c_{\text{лок}} \to 0$.

Приближение к чёрной дыре

Шаг 1. Фотон входит в зону сжатия

- Пиксели начинают сжиматься ($l < l_P$).

- Частота обновления падает ($t_{\text{лок}} > t_P$).

- Скорость распространения цепочки падает.

Шаг 2. Фотон приближается к горизонту

- Сжатие достигает предела ($l \to l_{\text{сж}} \ll l_P$).

- Частота обновления стремится к нулю ($t_{\text{лок}} \to \infty$).

- Скорость фотона стремится к нулю.

16.5. Замедление времени в сжатом пикселе: от планковской плотности до нулевой скорости.

Фундаментальные константы

Параметр	**Обозначение**	**Значение**
Планковская длина	l_P	1.616×10^{-35} м
Планковское время	t_P	5.391×10^{-44} с
Планковская частота	$f_P = 1/t_P$	1.855×10^{43} Гц
Скорость света	$c = l_P/t_P$	2.998×10^{8} м/с

Параметр	Обозначение	Значение
Масса активного пикселя	μ	6.07×10^{-54} кг
Планковская масса	m_P	2.176×10^{-8} кг
Количество пикселей в планковской массе	$n_3 = m_P/\mu$	3.58×10^{45}

Часть 17. Сжатие пикселя на горизонте.

Размер сжатого пикселя

При планковской плотности все n_3 пикселей упаковываются в объём одного недеформированного пикселя:

$$l_{\text{сж}} = \frac{l_P}{\sqrt[3]{n_3}}$$

Подставляем:

$$\sqrt[3]{n_3} = \sqrt[3]{3.58 \times 10^{45}} = 1.53 \times 10^{15}$$

$$l_{\text{сж}} = \frac{1.616 \times 10^{-35}}{1.53 \times 10^{15}} = 1.056 \times 10^{-50}\ \text{м}$$

$$\boxed{l_{\text{сж}} \approx 1.06 \times 10^{-50}\ \text{м}}$$

Это в 1.53×10^{15} раз меньше l_P.

Часть 18. Замедление времени в сжатом пикселе.

18.1. Общая формула замедления времени в ТАО

В ТАО замедление времени определяется деформацией решётки: где Φ — гравитационный потенциал.

$$\frac{d\tau}{dt} = 1 + \frac{\Phi}{c^2}$$

Но! Для сжатого пикселя мы можем использовать прямую связь между размером пикселя и локальным временем:

$$t_{\text{лок}} = t_P \cdot \frac{l_P}{l}$$

Физический смысл: чем меньше пиксель, тем мелленнее он «тикает».

18.2. Подстановка $l = l_{\text{сж}}$

$$t_{\text{лок}} = t_P \cdot \frac{l_P}{l_{\text{сж}}}$$

$$t_{\text{лок}} = 5.391 \times 10^{-44} \cdot \frac{1.616 \times 10^{-35}}{1.056 \times 10^{-50}}$$

$$\frac{l_P}{l_{\text{сж}}} = \frac{1.616 \times 10^{-35}}{1.056 \times 10^{-50}} = 1.53 \times 10^{15}$$

$$t_{\text{лок}} = 5.391 \times 10^{-44} \cdot 1.53 \times 10^{15} = 8.25 \times 10^{-29} \text{ с}$$

Это в 1.53×10^{15} раз больше t_P.

18.3 Падение частоты циркуляции.

Локальная частота

$$f_{\text{лок}} = \frac{1}{t_{\text{лок}}}$$

$$f_{\text{лок}} = \frac{1}{8.25 \times 10^{-29}} = 1.21 \times 10^{28}\ \text{Гц}$$

$$\boxed{f_{\text{лок}} \approx 1.21 \times 10^{28}\ \text{Гц}}$$

Отношение к планковской частоте

$$\frac{f_{\text{лок}}}{f_P} = \frac{1.21 \times 10^{28}}{1.855 \times 10^{43}} = 6.52 \times 10^{-16}$$

$$\boxed{\frac{f_{\text{лок}}}{f_P} \approx 6.52 \times 10^{-16}}$$

Частота циркуляции упала в 1.53×10^{15} раз!

18.4. Скорость фотона в сжатом пикселе.

Локальная скорость света:

$$c_{\text{лок}} = \frac{l_{\text{сж}}}{t_{\text{лок}}}$$

$$c_{\text{лок}} = \frac{1.056 \times 10^{-50}}{8.25 \times 10^{-29}} = 1.28 \times 10^{-22}\ \text{м/с}$$

$$\boxed{c_{\text{лок}} \approx 1.28 \times 10^{-22}\ \text{м/с}}$$

Отношение к скорости света:

$$\frac{c_{\text{лок}}}{c} = \frac{1.28 \times 10^{-22}}{2.998 \times 10^{8}} = 4.27 \times 10^{-31}$$

$$\boxed{\frac{c_{\text{лок}}}{c} \approx 4.27 \times 10^{-31}}$$

Скорость фотона упала в 2.34×10^{30} раз!

Сводная таблица.

Параметр	В недеформированной решётке	В сжатом пикселе (горизонт)	Отношение
Размер пикселя	$l_P =$ 1.616×10^{-35} м	$l_{сж} =$ 1.06×10^{-50} м	1.53×10^{15} раз меньше
Время такта	$t_P =$ 5.391×10^{-44} с	$t_{лок} =$ 8.25×10^{-29} с	1.53×10^{15} раз больше
Частота	$f_P =$ 1.855×10^{43} Гц	$f_{лок} =$ 1.21×10^{28} Гц	6.52×10^{-16}
Скорость света	$c =$ 2.998×10^{8} м/с	$c_{лок} =$ 1.28×10^{-22} м/с	4.27×10^{-31}

18.5. Почему фотон не может преодолеть горизонт.

Представьте яблоко, которое падает с дерева. Яблоко никогда не преодолеет земную гравитацию, потому что оно не обладает нужной скоростью относительно земли. Его скорость ничтожна относительно земли, оно не может преодолеть даже притяжение.

Так и фотон:

- На горизонте его скорость $v \approx 1.28\times10^{-22}$ м/с. Это его естественная скорость в таком сжатом пикселе.

- Даже минимальный градиент (ускорение свободного падения) становится для него непреодолимым барьером.

Фотон просто «падает» на горизонт ЧД как яблоко с дерева.

18.6. Сравнение с ускорением

Ускорение на горизонте сверхмассивной дыры:

$g \approx 350$ м/с^2

Скорость фотона:

$v \approx 1.28 \times 10^{-22}$ м/с

Время, за которое фотон «упадёт»:

$$t_{\text{пад}} = \frac{v}{g} \approx \frac{1.28 \times 10^{-22}}{350} \approx 3.66 \times 10^{-25} \text{ с}$$

Фотон при приближении к ЧД практически мгновенно «упадёт» на горизонт ЧД! Фотон, сжимаясь на горизонте чёрной дыры, имеет скорость — меньше, чем у черепахи.

Но он не «исчезает» и не «падает в сингулярность». Он рассыпается, как комета Шумейкера-Леви о Юпитер, как яблоко о землю, и образует поток сжатых активных пикселей, которые падают на поверхность чёрной дыры, добавляя ей момент импульса и массу.

Часть 19. Сохранение энергии и импульса в гравитацинном поле. От падения фотона до вращения чёрной дыры

19.1. Что говорит классическая физика

В классической физике законы сохранения гласят:

- Энергия не создаётся и не уничтожается — она только переходит из одной формы в другую.

- Момент импульса сохраняется — если внешний момент не действует.

В гравитационном поле:

- Падающее тело ускоряется, его кинетическая энергия растёт за счёт потенциальной.

- Момент импульса сохраняется: $J = mvr = \text{const}$.

В ТАО при приближении к массивному телу:

1. Пиксели сжимаются → $l_{\text{лок}} < l_P$.
2. Частота обновления падает → $f < f_P$.

3. Скорость частицы падает → $v \to 0$.

Но куда девается энергия и момент импульса?

Ответ: они переходят в деформацию решётки и вращение чёрной дыры.

19.2. Законы сохраения в ТАО.

Сохранение энергии

Полная энергия:

$E_{полн} = E_{кин} + E_{внутр} + E_{деф} = \text{const}$

Где:

- $E_{кин} = ½(mv^2)$ — кинетическая энергия движения.

- $E_{внутр} = N \cdot \varepsilon_1 \cdot l_P l_{лок}$ — энергия внутренней циркуляции.

- $E_{деф} = ½ (k \cdot (l_P - l_{лок})^2)$ — энергия деформации решётки.

При сжатии пикселей:

- $l_{лок}\downarrow \to E_{кин}\downarrow$

- $l_{лок}\downarrow \to E_{внутр}\downarrow$

- $l_{лок}\downarrow \to E_{деф}\uparrow$

Энергия не исчезает. Она переходит в деформацию решётки.

19.3. Сохранение момента импульса

Полный момент импульса:

$J_{полн} = J_{орбит} + J_{внутр} + J_{реш} = \text{const}$

Где:

- $J_{орбит} = mvr$ — орбитальный момент.

- $J_{внутр} = N \cdot \hbar$ — внутренний момент (спин).

- $J_{реш}$ — момент, запасённый в вихревой деформации решётки.

При сжатии пикселей:

- $v\downarrow, r\downarrow \to J_{орбит}\downarrow$

- $J_{\text{внутр}}$ = const (спин не меняется)

- $J_{\text{реш}}\uparrow$ — решётка «закручивается».

Момент импульса не исчезает. Он переходит в «вихревую» деформацию решётки.

19.4. В ТАО мы установили, что сжатые пиксели тормозят циркуляцию, скорость фотона падает до $v \approx 1.28\times10^{-22}$ м/с. На горизонте время почти останавливается. Логичный вывод: планковские массы на поверхности чёрной дыры, будучи сжатыми до предела, должны покоиться. Их скорость должна быть равна нулю. Но! Наблюдения говорят, что чёрные дыры вращаются. Значит, массы на поверхности движутся. Как это возможно?

Часть 20. Механизм передачи: от падения к вращению.

20.1. Падение фотона

Фотон — это разомкнутая цепочка активных пикселей.

При приближении к чёрной дыре:

1. Пиксели сжимаются $\rightarrow l_{\text{лок}} < l_P$.
2. Частота обновления падает $\rightarrow f < f_P$.
3. Скорость фотона падает $\rightarrow\ v_{\text{лок}} \rightarrow 0$.

Но! Фотон не останавливается. Его цепочка рвётся приливной силой:

$$F_{\text{прилив}} = \lambda \cdot \nabla\Phi$$

Разрыв цепочки происходит до того, как скорость стала нулевой. В момент разрыва фотон имеет ненулевую скорость $v_{\text{разр}}$.

20.2. Передача момента импульса

Момент импульса фотона в момент разрыва:

$$J_\gamma = \hbar + m_{\text{эфф}} \cdot v_{\text{разр}} \cdot r_{\text{разр}}$$

Этот момент передаётся чёрной дыре:

$$\Delta J_{\text{ЧД}} = J_\gamma$$

Каждый фотон добавляет чёрной дыре момент импульса.

20.3. Накопление момента

Суммарный момент чёрной дыры:

$J_{\text{ЧД}} = \sum J_\gamma^{(i)}$

Скорость вращения:

$$\omega = \frac{J_{\text{ЧД}}}{I}, \quad I \propto M \cdot r_s^2$$

Чёрная дыра вращается потому, что она накопила момент импульса от упавших фотонов и частиц.

Чёрная дыра постоянно поглощает материю:

- Фотоны.

- Частицы.

- Газ, пыль, звёзды.

Каждая упавшая частица приносит энергию и момент импульса. Эта энергия не исчезает. Она перераспределяется.

20.4. В ТАО энергия упавшей частицы распределяется по трём каналам:

1. Деформация решётки — сжатие нулевых пикселей.
2. Внутренняя энергия — увеличение массы чёрной дыры.
3. Кинетическая энергия — движение планковских масс по поверхности.

$$E_{\text{упавшая}} = \Delta E_{\text{деф}} + \Delta E_{\text{масса}} + \Delta E_{\text{кин}}$$

Именно третья составляющая — $\Delta E_{\text{кин}}$ — заставляет массы двигаться.

20.5. Механизм: как энергия переходит в движение. Передача момента импульса.

Каждая упавшая частица приносит момент импульса:

$\Delta J = \hbar + mvr$

Этот момент не может «исчезнуть» в сжатой решётке. Он передаётся поверхности — планковским массам. Планковские массы сжаты до предела, дальше они сжиматься не могут. Вся энергия идёт на движение этих масс. Массы получают импульс и начинают двигаться.

Получив момент импульса, массы не могут двигаться хаотично. Они вынуждены двигаться по параллелям — линиям, идущим параллельно экватору с одинаковой угловой скоростью.

Потому что:

- Поверхность — сфера.

- Момент импульса сохраняется.

- Движение по параллелям — единственный способ сохранить момент при сферической симметрии.

Так возникает циркуляция.

20.5. Волны деформации

Движение масс по параллелям осуществляется по аналогии волн де Бройля. Волны де Бройля бегут по поверхности со скоростью, близкой к *c*. Сами массы движутся медленно, но волны, которые они создают, — быстро. Это — как волна на стадионе: люди медленно встают и садятся, а волна бежит быстро.

Волны бегут по поверхности, создавая волны деформации решётки вокруг чёрной дыры. Эта деформация — не статическая. Она бежит. Волны деформации распространяются от поверхности наружу. Это — бегущие волны сжатия-растяжения пиксельной решётки. Волны деформации увлекают вещество. Когда волны деформации достигают окружающего вещества (газа, пыли), они

передают ему импульс. Вещество начинает двигаться вместе с волнами. Так возникает аккреционный диск. Вещество вращается вокруг чёрной дыры, потому что его «толкают» волны деформации, бегущие от поверхности.

Если бы чёрная дыра не поглощала материю, массы бы замедлились и остановились. Но чёрная дыра постоянно поглощает материю. Каждое новое падение добавляет энергию и момент. Этот постоянный приток поддерживает движение масс.

Устанавливается динамическое равновесие:

$E_{\text{поступающая}} = E_{\text{рассеиваемая}} + E_{\text{кин}}$

Часть энергии идёт на поддержание движения масс. Часть — на деформацию решётки. Часть — на увеличение массы. Массы движутся, потому что энергия постоянно поступает.

Если чёрная дыра быстро растёт через аккрецию:

- Много энергии поступает.

- Много момента импульса передаётся.

- Массы движутся быстро.

- Вращение — быстрое ($a \to 1$).

Если чёрная дыра росла через слияния:

- Меньше энергии поступает.

- Моменты частично компенсируются.

- Массы движутся медленно.

- Вращение — медленное ($a \ll 1$).

Глава 11. Слабое взаимодействие

Часть 1. Что такое «слабое взаимодействие» в стандартной физике.

1.1. Краткое определение

Слабое взаимодействие — одно из четырёх фундаментальных взаимодействий в Стандартной модели. Оно отвечает за:

- Бета-распад нейтрона ($n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$).
- Распад мюона ($\mu^- \to e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$).
- Распад пиона ($\pi^- \to \mu^- + \bar{\nu}_\mu$).

Переносчики: $W^{\pm}$ и Z^0 - бозоны.

Характерные черты:

- Короткодействующее ($r \sim 10^{-18}$ м).
- Нарушает чётность (участвуют только левые частицы).
- Описывается вероятностью распада (Γ), а не силой (F).

1.2. Историческая справка: от Ферми до наших дней

1. 1934 год: Теория Ферми

Энрико Ферми создал первую теорию бета-распада. Он ввёл константу G_F — эмпирический коэффициент, подогнанный под эксперимент. Распад описывался как контактное взаимодействие (точечное), без механизма.

$$\Gamma = \frac{G_F^2}{(\hbar c)^3} \cdot |M|^2 \cdot \text{фазовый объём}$$

Это чистая эмпирика, дающая правильные числа, но не объясняющая физику.

Аналогия: формула Вейцзеккера для энергии связи ядер — подгоночные коэффициенты, которые работают, но не выводятся из первых принципов.

2. 1950-е годы: V-A структура

В 1950-х годах физики обнаружили, что бета-распад нарушает чётность. Была введена V-A структура (векторный ток минус аксиально-векторный ток):

$$\mathcal{M} \propto \bar{u}_e \gamma^\mu (1 - \gamma^5) u_\nu \cdot \bar{u}_p \gamma_\mu (1 - \gamma^5) u_n$$

Это математический шаблон, подогнанный под эксперименты (угловые распределения, корреляции спинов). Он работает, но не даёт физической картины.

Аналогия: модель Корнелла для потенциала сильного взаимодействия $V(r) = -\alpha/r + \sigma r$ — подгонка, которая работает, но не объясняет, почему потенциал именно такой.

3. 1960-е годы: Электрослабая теория (Глэшоу-Вайнберг-Салам)

Глэшоу, Вайнберг и Салам построили теорию, объединяющую электромагнетизм и слабое взаимодействие. Они ввели:

- $W^{\pm}$ и Z^0 - бозоны как переносчики.

- Связь:

$$G_F = \frac{\sqrt{2}}{8} \cdot \frac{g^2}{m_W^2}.$$

- Массу W-бозона ($m_W \approx 80.4$ ГэВ) и Z-бозона ($m_Z \approx 91.2$ ГэВ).

Это математическая конструкция, которая даёт правильные числа и предсказывает резонансы, обнаруженные в 1983 году в ЦЕРН.

Но что это не даёт: физического объяснения, *почему* всё это так работает.

Слабое взаимодействие в физике — единственное из четырёх фундаментальных взаимодействий, у которого нет силы.

Взаимодействие	Есть ли сила?	Формула силы
Гравитация	Да	$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$
Электромагнетизм	Да	$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}$
Сильное	Да	$F \approx \frac{\hbar c}{r^2}$
Слабое	Нет	—

Вместо силы — вероятность распада. Вместо взаимодействия — математический формализм. Это феноменология.

1.3. Мы рассматриваем слабое взаимодействие как процесс

В ТАО мы не будем называть слабое взаимодействие «взаимодействием» в классическом смысле.

Мы будем рассматривать его как:

- Процесс перенастройки анизотропных деформаций в ядре или частице.

- Следствие нарушения баланса между ядерной гравитацией (G_s) и электромагнитной гравитацией (G_e).

- Распрямление сжатой пружины (нейтрализующей петли) в нейтроне.

1.4. Онтология

1. Нейтрон — это протон с нейтрализующей петлёй (лентой циркуляции электрона).
2. Петля — это сжатая «пружина», в которой запасена энергия $\Delta E = 0.782$ МэВ.
3. Внешнее поле ядра удерживает петлю.

4. Когда поле исчезает — петля начинает распрямляться.
5. Распрямление — это последовательный разрыв 10^{23} связей (пикселей).
6. В конце — выстрел электрона с пиковой силой.

Это — физика, а не только математика.

Для понимания: мы не отрицаем эмпирику. ТАО не говорит, что формулы Ферми или V-A структура неправильны. Они правильны. Они дают верные числа.

ТАО говорит: «Это — эмпирика. Она работает, но не объясняет физику».

Слабое взаимодействие в квантовой механике — это эмпирический формализм, аналогичный формуле Вейцзеккера для энергии связи ядер, потенциалу Корнелла для кварков и, отчасти, ОТО Эйнштейна для гравитации. Все эти теории дают правильные числа, но не объясняют физическую причину.

ТАО даёт физическую интерпретацию этой эмпирики:

- G_F — это не фундаментальная константа, а коэффициент, связывающий энергию резонанса решётки с вероятностью распада.

- W- и Z-бозоны — это не частицы, а резонансные моды колебаний решётки.

- V-A структура — это не явный закон природы, а математическое описание того, как анизотропная деформация перестраивается.

Часть 2. Распад свободного нейтрона.

2.1. Полная физическая история: от рождения в звезде до распада в вакууме

Нейтроны не существуют вечно. Они рождаются в недрах звёзд, когда давление и температура становятся настолько огромными, что электроны вдавливаются в протоны.

Процесс (звёздный):

$p + e^- \rightarrow n + \nu_e$

Что это значит в ТАО:

1. В ядре звезды колоссальное давление — градиент деформации пиксельной решётки достигает критической величины.
2. Электрон, как циркуляционная лента, подлетает к протону (узел из трёх кварков).
3. Внешнее давление разрывает ленту электрона.
4. Два конца ленты прикрепляются к протону, образуя пуповину.
5. Но давление настолько велико, что пуповина сворачивается внутрь узла.
6. Электрон «исчезает» — его лента становится дополнительной петлёй внутри узла.
7. Возникает нейтрон — протон с нейтрализующей петлёй (как кольцо Сатурна).

Состояние	Что происходит	Стабильность
В ядре звезды	Нейтрон вплетён в общую циркуляционную сеть ядра	Стабилен (пока есть давление)
Свободный	Нейтрон выброшен из ядра (например, при взрыве сверхновой)	Нестабилен (~15 минут)

Свободный нейтрон нестабилен, потому что внешнее давление исчезло. Петля, которая была «вдавлена» в узел, теперь выпрямляется и создаёт упругое напряжение. Она «хочет» вернуться в исходное состояние — стать свободным электроном.

2.2. Анатомия свободного нейтрона

Нейтрон = Протон + Нейтрализующая петля

Часть	Что это в ТАО	Роль
Узел (ядро)	Три переплетённые ленты Мёбиуса (u, d, d)	Даёт массу и структуру
Пуповина	Общая циркуляция между кварками	Связывает узел воедино
Нейтрализующая петля	Дополнительная цепочка активных пикселей, прикреплённая к пуповине	Компенсирует заряд (делает нейтрон нейтральным)

В ядре звезды градиент, сохранявший стабильность нейтрона, был скомпенсирован соседними нуклонами. В свободном нейтроне компенсации нет.

Результат:

- Напряжение растёт.

- Петля начинает «отрываться» от пуповины.

- Этот процесс занимает ~15 минут (потому что связь очень прочная).

В момент распада происходит разрыв пуповины. Когда напряжение превышает критическую величину, пуповина разрывается в одной точке. Это значит физически:

- Цепочка активных пикселей, соединяющая петлю с узлом, размыкается.

- Петля перестаёт быть частью общей циркуляции с внешним шлейфа протона.

Петля отрывается от узла. Теперь она свободна. Но! Петля — это замкнутая цепочка активных пикселей. Она не может существовать как разомкнутая цепочка — она должна либо замкнуться, либо разорваться. Поэтому петля замыкается сама на себя. Она становится электроном — полноценной лентой циркуляции.

Нейтрон, потерявший петлю, перестраивается.

Исходный узел (нейтрон):

- Три кварка: u, d, d.

- Суммарный поток: 0 (скомпенсирован).

После потери петли:

- Один из d-кварков меняет свою ориентацию.

- Он становится u-кварком.

- Новый набор: u, u, d.

- Суммарный поток: +1.

Это уже протон!

При разрыве пуповины выделяется избыточная энергия, которая была затраченная в звезде на вдавливание электрона в протон.

Что с ней происходит:

- Она не может остаться в узле — это нарушило бы баланс.

- Она уходит в виде фотона с закруткой.

- Этот фотон и есть антинейтрино.

2.3. Итоговое уравнение.

Что было:

n (нейтрон: узел u, d, d + петля)

3.2. Что стало:

$p + e^- + \bar{\nu}_e$

- p — протон (узел u, u, d)

- e^- — электрон (оторвавшаяся петля, замкнувшаяся в ленту Мёбиуса)

- $\bar{\nu}_e$ — антинейтрино (избыточная энергия)

2.4. Энергетика распада (почему 0.782 МэВ)

Когда петля отрывается, она теряет часть своей энергии связи с узлом.

Разница масс:

$\Delta m = m_n - (m_p + m_e) = 0.782 \text{МэВ}/c^2$

Что это значит:

- Масса нейтрона больше, чем сумма масс протона и электрона.

- Эта разница высвобождается в виде энергии.

- Часть энергии уходит на кинетическую энергию продуктов распада: электрон «выстреливает» с околосветовой скоростью.

2.5. Почему энергия такая маленькая

Всего 0.782 МэВ — это ничтожно мало по сравнению с массой нейтрона (939.565 МэВ).

Отношение:

$$\frac{0.782}{939.565} \approx 8.32 \times 10^{-4}$$

Это всего 0.083%! Почему так мало?

Потому что петля — это маленькая часть нейтрона. Основная масса (99.9%) сосредоточена в узле (трёх кварках и пуповине). Петля добавляет всего 0.083%.

Часть 3. Радиус действия (почему 10^{-16} м)

Что такое радиус действия

Это расстояние, на котором петля ещё «чувствует» узел.

В ТАО:

$$r_W = \frac{\hbar}{m_n c}$$

Это комптоновская длина нейтрона.

Почему масса нейтрона, а не W-бозона? Потому что именно нейтрон создаёт гравитационную яму, которая удерживает петлю.

Численно:

$$r_W = \frac{1.054 \times 10^{-34}}{1.6749 \times 10^{-27} \cdot 3 \times 10^8} = 2.097 \times 10^{-16}\,\text{м}$$

Это ~ 0.2 фемтометра — в 5 раз меньше размера протона.

Часть 4. Сила распада.

4.1. Это сила, с которой петля «тянет» пуповину в момент отрыва.

В ТАО:

$$F_W = \frac{\Delta E}{r_W} \cdot e^{-2r_q/r_W}$$

Где:

- $\Delta E = 0.782$ МэВ — энергия распада
- $r_W = 2.097 \times 10^{-16}$ м — радиус действия
- $r_q \approx 0.5 \times 10^{-15}$ м — расстояние между кварками
- $e^{(-2rq/rw)}$ — экспоненциальное затухание

4.2. Считаем по шагам

Шаг 1. Базовая сила:

$$F_0 = \frac{\Delta E}{r_W}$$

$$\Delta E = 0.782\,\text{МэВ} = 1.253 \times 10^{-13}\,\text{Дж}$$

$$F_0 = \frac{1.253 \times 10^{-13}}{2.097 \times 10^{-16}} = 598\,\text{Н}$$

Шаг 2. Экспоненциальное затухание:

$$\frac{r_q}{r_W} = \frac{5 \times 10^{-16}}{2.097 \times 10^{-16}} \approx 2.38$$

$$e^{-2r_q/r_W} = e^{-4.76} \approx 0.0085$$

Шаг 3. Финальная сила:

$F_W = 598 \times 0.0085 = 5.08\text{Н}$

Мы получили 598 Н, а с учетом экспоненты — 5 Н.

5 Ньютонов — это примерно сила, с которой мы держим в руке пол-литровую бутылку воды. И это совпадает с оценками реальной силы! Если взять квантовую неопределенность Гейзенберга ($\Delta E \cdot \Delta t \approx \hbar$) и оценить силу, с которой W-бозон действует на кварки на расстоянии ~10^{-16} м, то получаются значения именно единицы Ньютонов (от 1 до 10 Н). Так что наш численный результат (5 Н) — не случайное попадание в реальный порядок величин ядерных сил!

4.4. Ещё раз. Почему это не случайность.

Потому что:

- Энергия распада $\Delta E = 0.782$ МэВ — это экспериментальный факт.

- Масса нейтрона m_n — это экспериментальный факт.

- Расстояние между кварками $r_q \approx 5 \times 10^{-16}$ — это экспериментальный факт.

В ТАО нет «подгонки». Есть:

- Геометрия нейтрона (протон + петля).

- Упругость решётки (экспоненциальное затухание).

- Энергия, запасённая в звезде (0.782 МэВ).

Из этого вытекает 5 Н — как неизбежное следствие.

Слабое взаимодействие — это не абстрактная сила из учебников. Это — упругая деформация пиксельной решётки, которая в момент распада нейтрона создаёт силу ~5 Н. Это та же сила, с которой вы держите в руке пол-литровую бутылку воды. Разница только в масштабе: в микромире эта сила действует на расстоянии 10^{-16} м, а в макромире — на расстоянии 10^{-1} м. В обоих случаях — одна и та же физика: упругость решётки, геометрия и запасённая энергия. В ТАО нет пропасти между микромиром и макромиром. Есть только масштаб.

4.4. И теперь возникает резонный вопрос: А почему на «вдавленный» в протон электрон не действует планковская сила? Ведь, как мы уже знаем, внутри протона начинает действовать именно планковская сила.

Планковская сила — это сила между кварками на расстоянии $r_q \approx 0.44$ фм:

$$F_P = \frac{Gm_P^2}{r_q^2} = \frac{\hbar c}{r_q^2} \approx 1.6 \times 10^5\,\text{Н} = 16\,\text{тонн}$$

Она действует строго внутри кваркового узла, на расстояниях меньше 0.5 фм. Действует на кварки, удерживая их вместе.

Кулоновская сила — это сила между внешним шлейфом протона и внешним шлейфом электрона:

$$F_C = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \approx 230\,\text{Н на 1 фм}$$

Где она действует: на периферии протона, на расстояниях ~0.84 фм (радиус протона).

На что: на электрон, когда он приближается к протону.

Электрон не достигает планковского уровня. Электрон — это не кварк. Электрон — это лента циркуляции. Его размер — 4 комптоновских длины: это в 5000 раз больше размера протона!

Электрон не может «влезть» внутрь кваркового узла, потому что он слишком большой по протяжённости ленты циркуляции.

Когда электрон вдавливается в протон (например, в звезде), он:

1. Разрывается — его лента размыкается.
2. Образует с внешним шлейфом протона энергию связи, и, по сути, превращается в эту энергию связи с внешним шлейфом протона.
3. Опоясывает внешне протон, но не проникает внутрь.

Расстояние 0.2 фм — это не расстояние до центра протона.

Когда мы говорим $r_W \approx 2\times10^{-16}$м (0.2 фм), это:

- Не расстояние от центра протона до электрона.

- Это - эффективное расстояние между циркуляциями — внешнего шлейфа протона и петлёй электрона.

В ТАО:

- Центр протона — кварковый узел ($r < 0.5$ фм).

- Пуповина протона — связь между кварками ($r \approx 0.5$ фм).

- Петля электрона — прикреплена к внешнему шлейфу ($r \approx 0.84$ фм).

Расстояние для электрона, вдавленного в протон 0.2 фм — это расстояние от внешнего шлейфа до петли, а не от центра до петли.

Теперь давай те ещё раз подробно с аналогиями.

4.5. Экспоненциальное затухание - свойство упругой среды

В ТАО пиксельная решётка — это упругая среда. Любая деформация в упругой среде затухает с расстоянием.

Закон затухания:

$$F(r) = F_0 \cdot e^{-r/r_W}$$

Где:

- F_0 — сила в точке приложения (максимальная).

- r_W — радиус затухания (характерное расстояние).

- $-r/r_W$ — экспоненциальное затухание.

Что это значит:

- На расстоянии $r = 0$ сила максимальна: $F = F_0$.

- На расстоянии $r = r_W$ сила падает в $e \approx 2.718$ раз.

- На расстоянии $r = 2r_W$ сила падает в $e^2 \approx 7.39$ раз.

- На больших расстояниях сила стремится к нулю.

Это — не подгонка. Это — свойство любой упругой среды.

4.6. Почему $r_W = 2.1 \times 10^{-16}$ м

r_W — это радиус действия анизотропной деформации (внешнего шлейфа).

Он определяется массой нейтрона:

$$r_W = \frac{\hbar}{m_n c} = 2.10 \times 10^{-16}\ \text{м}$$

Это — расстояние, на котором деформация от нейтрона ещё «чувствуется».

За r_W она экспоненциально затухает.

Часть 5. Что такое «единая циркуляция» в нейтроне.

5.1. Два рельса, соединённые в одну цепочку

В нейтроне есть две циркуляции:

Циркуляция	Направление	Что это
Рельс 1	Против часовой стрелки	Электрон

Циркуляция	Направление	Что это
Рельс 2	По часовой стрелке	Д-орбиталь протона (внешний шлейф)

Они бегут рядом, в противоположных направлениях. Но они не просто «рядом». Они — единая циркуляция – энергия связи (внешняя пуповина). Они соединены в одну замкнутую линию. Эта линия имеет форму, похожую на молнию-застёжку:

- Две стороны застёжки — это два рельса, расстояние между рельсами r_w.

- Зубцы застёжки — это пиксели.

- Вся конструкция удерживается гравитационной ямой.

В этой цепочке есть одно место, где два рельса соединены. Это — точка смыкания, где электрон и Д-орбиталь протона переходят друг в друга и образуют единую циркуляцию.

5.2. При распаде происходит расстёгивание молнии.

Когда внешнее поле исчезает:

1. Гравитационная яма ослабевает.
2. Шлейфы (рельсы) начинают расходиться.
3. Зубцы (пиксели) расстёгиваются последовательно.

Это занимает 15 минут.

Но! В конце остаётся место соединения — точка, где два рельса всё ещё сцеплены.

Последний «зубец» — это связь между протоном и электроном. Это — не просто «зубец». Это — точка, где протон и электрон соединены. Это — единая циркуляция, которая должна разорваться. В этот момент нужна сила — чтобы разорвать эту последнюю связь.

Когда точка соединения разрывается:

1. Цепочка размыкается.
2. Два конца цепочки перезамыкаются сами на себя:

- Один конец становится протоном (Д-орбиталь замыкается сама на себя).

- Другой конец становится электроном (лента электрона замыкается сама на себя).

3. Энергия, запасённая в сжатии, высвобождается.

Это — как разорвать петлю: два конца разбегаются и замыкаются в отдельные кольца.

5 Н — сила разрыва последней связи. В конце процесса остаётся одна связь — между протоном и электроном.

Эта связь — самая прочная. Она удерживает всю конструкцию.

5.3. Работа силы

Сила 5 Н действует на расстоянии l_P — размере одного пикселя.

$A = F_W \cdot l_P = 5 \times 1.616 \times 10^{-35} = 8.08 \times 10^{-35}$Дж

Это ничтожно мало.

Но! Именно эта сила инициирует разрыв последней связи.

Вся энергия (0.782 МэВ) уже высвободилась за счёт расстёгивания остальных зубцов.

Полная энергия распада (0.782 МэВ) распределяется:

- 0.511 МэВ — масса покоя электрона.

∼0.27 МэВ — кинетическая энергия электрона.

∼0.001 МэВ — энергия антинейтрино.

Сила 5 Н совершает работу $\sim 10^{-35}$ Дж — это ничтожно.

Закон сохранения энергии выполнен.

Часть 6. В формуле слабого взаимодействия нет свего *G*

В ТАО G — это коэффициент упругости пиксельной решётки. Он показывает, насколько сильно активные пиксели сжимают нулевые пиксели вокруг себя.

Слабое взаимодействие — это не отдельный тип сжатия.

Это — *момент перенастройки*, когда один тип сжатия (электромагнитный шлейф) превращается в другой (гравитационная яма протона).

Вот как это выглядит:

1. В нейтроне есть два типа сжатия:

- G_s — сжатие от узла (три кварка).

- G_e — сжатие от внешнего шлейфа (петля).

2. Эти два сжатия скомпенсированы — поэтому нейтрон нейтрален (в зоне G_e нет градиента, есть только потенциал).
3. Когда петля отрывается, баланс нарушается:
    - G_e возвращает градиент (петля улетает).
    -G_s остаётся (узел перестраивается в протон).
4. В момент отрыва возникает локальный всплеск деформации — это и есть «слабое взаимодействие».

У этого «всплеска» нет своего G, потому что это не статическое сжатие. Это динамический процесс — переход из одного состояния в другое.

Теперь более подробно разберём баланс сил в нейтроне, и ответим на вопрос: почему нейтрон не может просто превратится обратно в атом водорода.

Часть 7. Баланс энергий в нейтроне.

7.1. От 13.6 эВ до 0.782 МэВ: как гравитация шлейфа превращается в кинетический выстрел

Электрон может существовать в двух принципиально разных состояниях по отношению к протону:

Состояние	Где находится	Что удерживает	Энергия связи
В атоме водорода	На поверхности (опоясывает протон снаружи)	Гравитация внешнего шлейфа (*Ge*)	13.6 эВ
В нейтроне	Вдавлен внутрь протона	Энергия связи (лента разорвана)	0.782 МэВ

Разница — в 57 500 раз по энергии!

Но что такое 13.6 эВ на самом деле? Это не электричество. Это гравитация. В ТАО энергия связи атома водорода — это гравитационная энергия внешнего шлейфа электрона.

Формула:

$$E_{\text{связи}} = \frac{\alpha G m_P^2}{2a_0} = 13.6\,\text{эВ}$$

Где:

- G — гравитационная постоянная

- m_P — планковская масса

- $\alpha = 1/137$ — геометрический коэффициент решётки

- $a_0 = 5.29\times10^{-11}$ м — боровский радиус (граница G_e)

В этой формуле нет e (заряда электрона)! Нет ε_0!

Это — чистая гравитация!

Мы это уже считали ранее.

7.2. Энергия связи нейтрона

$\Delta E = (m_n - m_p - m_e) \cdot c^2 = 0.782\text{МэВ} = 782\text{кэВ}$

Это в 57 500 раз больше, чем 13.6 эВ!

Откуда взялась эта энергия

В звезде:

- Внешнее давление сжало электрон в протон.

- На это **затрачена энергия** 0.782 МэВ.

- Эта энергия **запасена** в нейтроне.

Что это за энергия?

- Это **энергия сжатия ленты** электрона.

- Лента была длиной $L_e = 9.70 \times 10^{-12}$ м.

- Её сжали до размера $r_W = 2 \times 10^{-16}$ м.

- Энергия сжатия = 0.782 МэВ.

7.3. Электрон превращён в энергию связи

В нейтроне электрон больше не является отдельной частицей.

Он стал:

1. Частью энергии связи (пуповины) внешнего шлейфа протона (не путать с внутренней пуповиной между кварками).
2. По сути, он полностью превратился в энергию связи внешнего шлейфа протона его D-орбитали.
3. Вибрацией внутри, теперь уже, нейтрона.

Его лента разорвана и вплетена в структуру протона.

Он существует как энергия, а не как частица.

7.4. Баланс энергий в нейтроне

Что было до вдавливания

Свободный электрон:

$E_{эл} = m_e c^2 = 0.511 МэВ$

Свободный протон:

$E_{пр} = m_p c^2 = 938.272 МэВ$

Сумма:

$E_{сум} = 938.783 МэВ$

Что стало после вдавливания

Нейтрон:

$E_n = m_n c^2 = 939.565$МэВ

Разница:

$E_n - E_{сум} = 0.782$МэВ

Куда делась энергия

0.782 МэВ — это энергия, которая была затрачена на вдавливание.

Она распределена так:

1. Энергия сжатия ленты — основная часть.
2. Энергия вибрации электрона внутри нейтрона.
3. Энергия деформации пиксельной решётки вокруг узла.

7.5. Нейтрон не может существовать вне ядра

В ядре есть внешнее поле

В ядре:

- Рядом с нейтроном есть протоны.

- Они создают внешнее гравитационное поле.

- Это поле удерживает нейтронную петлю.

Это как внешний пресс, который держит пружину сжатой.

Когда нейтрон покидает ядро:

- Внешнее поле исчезает.

- Нет ничего, что удерживало бы петлю.

- Баланс сил нарушается.

Нейтрон может существовать только внутри ядра, рядом с протонами, которые создают внешнее мощное гравитационное поле.

Часть 8. Почему электрон выстреливает.

8.1. Запасённая энергия

В нейтроне запасена энергия 0.782 МэВ.

Это больше, чем масса покоя электрона (0.511 МэВ)!

Избыток:

$E_{изб} = 0.782 - 0.511 = 0.271 МэВ$

8.2. Что происходит при распаде

Когда лента электрона восстанавливается:

1. Энергия сжатия (0.782 МэВ) высвобождается.
2. Часть идёт на восстановление ленты (0.511 МэВ).
3. Остаток (0.271 МэВ за вычетом антинейтрино) превращается в кинетическую энергию.

8.3. Скорость вылета

Кинетическая энергия электрона:

$$v \approx c \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{m_e c^2}{E}\right)^2}$$

$E_{кин} \approx 0.271 МэВ$ – кинетическая энергия электрона

Скорость:

$$v \approx 0.757c$$

Электрон вылетает со скоростью около 0.76c — то есть примерно 76% от скорости света. Это всё ещё релятивистская скорость.

Электрон в нейтроне не может просто «вылезти» и стать атомом водорода, потому что получает кинетическую энергию ~0.27 МэВ (после вычета массы покоя 0.511 МэВ и энергии антинейтрино). Это в 20 000 раз больше, чем 13.6 эВ. Поэтому электрон вылетает с огромной скоростью, не имея возможности остаться «на орбите» протона.

Часть 9. Почему распад нейтрона занимает 15 минут.

Распад нейтрона занимает 15 минут, потому что цепочка из 5.8×10^{23} пикселей «расстёгивается» последовательно. Частота, с которой каждый зубец (пиксель) «пробует» разорваться — это частота внутренней циркуляции электрона, определяемая его комптоновской длиной:

$$\nu_e = \frac{m_e c^2}{h}$$

$\nu_e = 1.235589964\times10^{20}$ Гц

Время на один зубец:

$t_{\text{зубец}} = 1/\nu_e \approx 8.09\times10^{-21}$ с

Общее время:

$\tau = N \times t_{\text{зубец}} = 6\times10^{23} \times 1.5\times10^{-21} = 870\text{с} \approx 15\text{мин}$

где N – количество пикселей в цепочке электронов.

Однако процесс идёт неравномерно: каждый разорванный зубец ослабляет цепочку, и следующие зубцы рвутся быстрее.

Распад нейтрона — это процесс, который начинается медленно и заканчивается взрывом.

В начале:

- Застёжка почти полностью сцеплена.

- Время на один пиксель $\sim3\times10^{-21}$ с.

- Скорость волны $\sim10^{-15}$ м/с.

В середине:

- Процесс ускоряется экспоненциально.

- Среднее время на пиксель 1.5×10^{-21} с.

- Скорость волны $\sim10^{-14}$ м/с.

В конце:

- Остаются последние 0.1% пикселей.

- Сопротивления нет.

- Волна достигает скорости света c.

- Время на пиксель — планковское 5.39×10^{-44} с.

- Выстрел: электрон вылетает со скоростью $0.76c$.

Это — естественная динамика упругой среды: от медленного распространения волны до релятивистского выстрела.

Часть 10. Вдавливание (сжатие) электрона в протон. Геометрическое «совпадение»: 1836

Радиус протона

$r_p = 0.84\times10^{-15}$м

Длина окружности протона:

$L_p = 2\pi r_p = 5.28\times10^{-15}$м

2.2. Радиус электрона в атоме водорода

Реальное кольцо электрона это:

$r_e = 1.54\times10^{-12}$м

Длина окружности электрона (ранее в расчётах мы получили 4 комптоновских его длины):

$L_e = 2\pi r_e = 9.70\times10^{-12}$м

Отношение:

$$\frac{L_e}{L_p} = \frac{9.70 \times 10^{-12}}{5.28 \times 10^{-15}} = 1836$$

Это ровно отношение масс:

$$\frac{m_p}{m_e} = 1836.15$$

Часть 11. Число, которое невозможно подогнать

1836.15 — это отношение массы протона к массе электрона.

В стандартной физике это число — экспериментальный факт. Его нельзя вывести из теории. Оно просто есть.

Радиус протона — это не теоретическая величина, а экспериментально измеренный параметр.

Методы измерения:

1. Электронное рассеяние — электроны разгоняются и рассеиваются на протонах. По углу рассеяния определяют распределение заряда.
2. Спектроскопия атома водорода — лэмбовский сдвиг зависит от размера протона.
3. Мюонный водород — мюон в 200 раз тяжелее электрона, поэтому он ближе к протону и чувствительнее к его размеру.

Результат:

$$r_p = 0.84 \times 10^{-15}\text{м} = 0.84\text{фм}$$

Это число получено из эксперимента. Его невозможно «подогнать» под теорию.

Физики принимают его как данность. Физики не говорят: «Давайте сделаем модели так, чтобы получилось 1836.15». Они говорят: «Мы измерили это число с точностью до 10 знаков после запятой. Теперь любая теория, претендующая на описание реальности, должна воспроизводить его.

Именно это и воспроизводит ТАО, как геометрическое соответствие.

Природа как бы говорит нам: "Чтобы «превратить» электрон в нейтрон, нужно сжать его пространственную волну в 1836 раз". Когда сжатие ослабевает — волна выпрямляется обратно. Это не случайность. Это закон геометрии.

Закон ТАО:

$$\boxed{\frac{r_e}{r_p} = \frac{L_e}{L_p} = \frac{m_p}{m_e} = 1836.15}$$

Это — геометрический закон. Он говорит, что геометрия электрона и протона связана через отношение масс.

Этот закон чётко обнаружен в ТАО:

- Электрон — это лента циркуляции длиной L_e.

- Протон — это узел с длиной окружности L_p.

- Чтобы вдавить электрон в протон, нужно сжать ленту в 1836 раз.

- Это сжатие — и есть энергия связи нейтрона.

Это не подгонка, потому что этот радиус выведен из:

1. Комптоновской длины электрона — экспериментальный факт.
2. Геометрии ленты Мёбиуса — 4 длины волны на одну ленту.
3. Отношения длины окружности к радиусу — 2π.

Никаких подгоночных параметров. Только геометрия и экспериментальные константы.

Расчёт говорит нам: это не случайность!

Вероятность того, что два независимых числа совпадут с точностью до 0.01%, равна 10^{-8}.

Это не случайность. Это закон!

Глава 12. Полная таблица анизотропных гравитационных сил ТАО

Единая формула:

$$F = \alpha \cdot G \cdot \frac{m_P^2}{r^2} \cdot \kappa \cdot \left(\frac{m_1 \cdot m_2}{m_{\text{эфф}}^2} \right)$$

Где:

- G — базовая гравитационная постоянная (упругость решётки).
- α — геометрический коэффициент (закрутка ленты).
- κ — коэффициент упаковки (число лент в узле).
- $m_{\text{эфф}}$ — эффективная масса для данного уровня.

Уровень	Источник	Характерное расстояние (r)	Формула силы (приведённый вид)	Численное значение силы	Физический смысл
Классическая гравитация	Масса (изотропное сжатие)	**Радиус Земли** $R_\oplus = 6.37\times10^{6}$ м	$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$	**~700 Н**	Сила, с которой Земля притягивает тело массой 70 кг.
Электростатика	Внешние шлейфы (заряды)	**Боровский радиус** $a_0 = 5.29\times10^{-11}$ м	$F = G_e\frac{m_e^2}{r^2}$	**8.2×10^{-8} Н**	Сила притяжения электрона и протона в атоме водорода.
Кварковая гравитация	Узел из 3 кварков	**Расстояние между кварками** $r_q = 4.4\times10^{-16}$ м	$F = G_q\frac{m_q^2}{r^2}$	**1.6×10^{5} Н**	Натяжение "глюонной струны" (~16 тонн).
Ядерная гравитация	Взаимодействие нуклонов	**Расстояние между нуклонами** $r_s = 1.0\times10^{-15}$ м	$F = G_s\frac{m_p^2}{r^2}$	**9.48×10^{4} Н**	Сила, удерживающая протоны и нейтроны в ядре (~5.2 тонны).

Планковская гравитация	редел прочности решётки	**Планковская длина** $l_P = 1.6\times10^{-35}$ м	$F_P = \frac{c^4}{G} = \frac{\hbar c}{l_P^2}$	**1.21×10^{44} Н**	**Максимальная сила.** При её превышении решётка рвётся, образуется чёрная дыра.

Уровень	**Значения**	***$G_{эфф}$* (значение)**	***$G_{эфф}$* (формула)**	**Формула силы (гравитационный вид)**	**Формула силы (квантовый вид)**
Классическая гравитация	$\alpha = 1$, $\kappa = 1$, $m_{эфф} = m_P$	**6.674×10^{-11}**	$G_{эфф} = G$	$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$	$F = \frac{\hbar c}{m_P^2}\frac{m_1 m_2}{r^2}$
Электростатика	$\alpha = 1/137$, $\kappa = 1$, $m_{эфф} = m_e$	**$\approx 2.78\times10^{32}$**	$G_{эфф} = \alpha G\left(\frac{m_P}{m_e}\right)^2$	$F = \alpha G\frac{m_P^2}{r^2}$	$F = \alpha\frac{\hbar c}{r^2}$
Кварковая гравитация	$\alpha = 1$, $\kappa = 1$, $m_{эфф} = m_q$	**$\approx 1.02\times10^{29}$**	$G_{эфф} = G\left(\frac{m_P}{m_q}\right)^2$	$F = G\frac{m_P^2}{r^2}$	$F = \frac{\hbar c}{r^2}$

Ядерная гравитация	$\alpha = 1$, $\kappa = 3$, $m_{эфф} = m_q$	$\approx$ **3.40×10^{28}**	$G_{эфф} = 3G\left(\frac{m_P}{m_q}\right)^2$	$F = 3G\frac{m_P^2}{r^2}$	$F = 3\frac{\hbar c}{r^2}$
Планковская гравитация	$\alpha = 1$, $\kappa = 1$, $m_{эфф} = m_P$, $r = l_p$	**6.674×10^{-11}**	$G_{эфф} = G$	$F_P = \frac{c^4}{G}$	$F_P = \frac{\hbar c}{l_P^2}$

ИТОГОВАЯ ФОРМУЛИРОВКА

В Теории Абсолютной Относительности существует только одна фундаментальная сила:

$$\boxed{F_0 = \frac{\hbar c}{r^2}}$$

Она является мерой упругого сопротивления пиксельной решётки и определяется исключительно её дискретной структурой ($\hbar$) и предельной скоростью обновления (c).

Все наблюдаемые взаимодействия — классическая гравитация, электромагнетизм, сильное взаимодействие — являются проекциями этой единой силы на разные масштабы и геометрические конфигурации. Различия между ними возникают исключительно из-за геометрических коэффициентов (α, κ, $m_{\text{эфф}}$), которые описывают, как именно активные пиксели (материя) организованы в пространстве: как ленты, как узлы, как складки.

$G_{\text{эфф}}$ — это не фундаментальная константа, а коэффициент, который в каждой конкретной геометрии показывает, какая доля базовой силы $\hbar c/r^2$ проявляется на данном масштабе. Сама же G — это просто перемасштабированная форма $\hbar c/m_P^2$, то есть та же базовая сила, нормированная на планковскую массу.

$$G_{\text{эфф}} = \underbrace{G}_{\text{базовая упругость}} \cdot \underbrace{\alpha}_{\text{закрутка ленты}} \cdot \underbrace{\kappa}_{\text{число лент в узле}} \cdot \underbrace{\left(\frac{m_P}{m_{\text{эфф}}}\right)^2}_{\text{нормировка на масштаб}}$$

Но поскольку:

$$G = \frac{\hbar c}{m_P^2}$$

то:

$$G_{\text{эфф}} = \frac{\hbar c}{m_P^2} \cdot \alpha \cdot \kappa \cdot \left(\frac{m_P}{m_{\text{эфф}}} \right)^2 = \frac{\hbar c}{m_{\text{эфф}}^2} \cdot \alpha \cdot \kappa$$

И тогда любая сила записывается как:

$$F = G_{\text{эфф}} \frac{m_1 m_2}{r^2} = \frac{\hbar c}{r^2} \cdot \alpha \cdot \kappa \cdot \left(\frac{m_1 m_2}{m_{\text{эфф}}^2} \right)$$

Таким образом, в ТАО нет «четырёх фундаментальных взаимодействий». Есть одна сила — упругость пиксельной решётки — и множество её геометрических проявлений. Слабое взаимодействие не является силой, это событие перенастройки анизотропных шлейфов.

Глава 13. Главное уравнение классической (изотропной) гравитации ТАО.

Введение

Представьте, что мы не знаем, что такое трение. Мы видим только, что тело, движущееся по поверхности, замедляется. Мы не знаем, что поверхность состоит из атомов. Мы не знаем, что атомы цепляются друг за друга. Мы не знаем, что связи рвутся и восстанавливаются. Мы просто видим эффект.

Что мы делаем?

Вводим коэффициент трения μ. Пишем уравнение:

$$m\ddot{x} = F_{\text{тяги}} - \mu mg$$

Потом обобщаем: сухое трение, вязкое трение, трение качения. Вводим тензоры трения. Учитываем зависимость от температуры, влажности, материала. Строим феноменологическую теорию трения — десятки страниц дифференциальных уравнений.

Результат: теория работает. Она точна. Но она не объясняет, почему трение вообще существует.

А теперь представим, что мы знаем онтологию: поверхность состоит из атомов. Атомы связаны в кристаллические решётки. При движении атомы цепляются друг за друга. Связи рвутся и восстанавливаются. Выделяется тепло.

Что мы делаем?

Понимаем: трение — это процесс разрыва и восстановления межатомных связей. Коэффициент трения — это статистическая характеристика этого процесса. Все формулы выводятся за пять минут.

Это — прямая аналогия ОТО и ТАО.

Часть 1. Онтология ТАО

1.1. Пространство как пиксельная решётка

В ТАО пространство — это **трёхмерная кубическая решётка**. Шаг решётки:

l_P=1.616255×10^{-35} м

Время дискретно. Шаг времени:

t_P=5.391247×10^{-44} с

Скорость света:

$c = l_P / t_P$ = 2.99792458×10^{8} м/с

1.2. Состояния пикселя

Каждый пиксель находится в одном из двух состояний:

- 0 — нулевой пиксель (вакуум).
- 1 — активный пиксель (материя).

Энергия активного пикселя:

ε_1=1.41×10^{-37} Дж

Энергия нулевого пикселя:

ε_0 = 2.24×10^{-114} Дж

1.3. Масса как число активных пикселей

Масса частицы — это общее число активных пикселей в её паттерне:

$$m = \frac{N \cdot \varepsilon_1}{c^2}$$

Где N — число активных пикселей.

1.4. Деформация решётки

Деформация — это относительное изменение размера пикселя:

$$\delta(r) = \frac{l(r) - l_P}{l_P}$$

Где:

- $l(r)$ — текущий размер пикселя в точке r.

- $\delta<0$ — сжатие.

- $\delta>0$ — растяжение.

Часть 2. Главное уравнение.

2.1. Что создаёт гравитацию

В ТАО гравитацию создают тольтко активные пиксели.

- Активные пиксели (материя) сжимают решётку вокруг себя.

- Нулевые пиксели (вакуум) не создают гравитацию.
Они являются средой, которая деформируется.

- Тёмная материя — это не источник гравитации.
Это растяжение решётки в гало галактик.

- Тёмная энергия — это не источник гравитации.
Это однородный фон нулевых пикселей.

Гравитация — это градиент сжатия, создаваемый активными пикселями.

2.2. Потенциал деформации

Потенциал деформации $\Phi(r)$ определяется распределением активных пикселей:

$$\Phi(r) = G \int \frac{\rho_b(r')}{|r - r'|} d^3 r'$$

Где:

- $G = 6.674 \times 10{-}11$ м^3/(кг·с^2) — гравитационная постоянная.

- $\rho_b(r')$ — плотность барионной материи (активных пикселей).

- $|r{-}r'|$ — расстояние от источника до точки наблюдения.

(Изменения из раздела Цифровой онтологии: в интеграле только ρ_b , нет ρ_{dm}, нет ρ_Λ.)

2.3. Ускорение как градиент

Ускорение — это градиент потенциала:

$$g(r) = -\nabla\Phi(r)$$

Подставляя $\Phi(r)$:

$$\Phi(r) = G \int \frac{\rho_b(r')}{|r - r'|} d^3r'$$

Вычисляя градиент:

$$\nabla \left(\frac{1}{|r - r'|} \right) = -\frac{r - r'}{|r - r'|^3}$$

Получаем:

$$\mathbf{g}(r) = G \int \frac{\rho_b(r')(r - r')}{|r - r'|^3} d^3r'$$

Это — главное уравнение ТАО.

2.4. Две эквивалентные формы

Форма 1 (интегральная):

$$\boxed{\mathbf{g}(r) = G \int \frac{\rho_b(r')(r - r')}{|r - r'|^3} d^3r'}$$

Форма 2 (потенциальная):

$$\boxed{\mathbf{g}(r) = -G\nabla \int \frac{\rho_b(r')}{|r - r'|} d^3r'}$$

Обе формы эквивалентны. Они описывают гравитацию
как градиент деформации, создаваемый активными пикселями.

Часть 3. Связь деформации с потенциалом.

3.1. Формула из размерности

В ТАО мы знаем онтологию. Мы знаем, что:

- **Деформация** δ — безразмерна.
- **Потенциал** Φ — имеет размерность L^2/T^2.

- **Скорость света** c — имеет размерность L/T.

Из размерности:

$$\delta = \frac{\Phi}{c^2}$$

Это — единственная комбинация, которая даёт безразмерную величину.

3.2. Знак и физический смысл

Вблизи масс потенциал отрицателен:

$$\Phi(r)<0$$

Следовательно:

$$\delta(r) = -\frac{\Phi(r)}{c^2} < 0$$

Это означает сжатие пикселей.

Знак минус обеспечивает соответствие:

- Вблизи масс $\Phi<0$, следовательно $\delta<0$, что означает сжатие пикселей.

- Вдали от масс $\Phi\to0$, следовательно $\delta\to0$, что означает отсутствие деформации.

3.3. Аналогия с $E=mc^2$

Формула $\delta = -\Phi/c^2$ **аналогична** $E = mc^2$:

- $E = mc^2$ — связывает массу и энергию через c^2.

- $\delta = -\Phi/c^2$ — связывает деформацию и потенциал через c^2.

Обе формулы выходят из размерности. Обе — фундаментальные. Обе — простые.

Это — метод Планка и даже Эйнштейна ($E = mc^2$). Он не требует сложной математики. Он требует понимания, какие величины важны.

Часть 4. Вывод замедления времени.

4.1. Связь размера пикселя и деформации

В ТАО пространство — это трёхмерная кубическая решётка с эталонным размером пикселя l_P. В присутствии активных пикселей (материи) решётка деформируется.

Относительная деформация:

$$\delta(r) = \frac{l_{\text{лок}}(r) - l_P}{l_P}$$

Где:

- lлок(r) — текущий размер пикселя в точке r.
- $\delta<0$ — сжатие.
- $\delta>0$ — растяжение.

Это определение непосредственно задаёт связь:

$$l_{\text{лок}}(r) = l_P(1+\delta(r))$$

4.2. Связь локального времени с деформацией

Фундаментальное правило ТАО:

Скорость света постоянна относительно локальной решётки и равна:

$$c = l_P / t_P$$

Где t_P — планковское время (глобальный такт обновления в недеформированной решётке).

В деформированной области то же правило даёт:

$$c = \frac{l_{\text{лок}}(r)}{t_{\text{лок}}(r)}$$

Где $t_{\text{лок}}(r)$ — локальная длительность такта в точке rr.

4.3. Приравнивание

Приравниваем два выражения для c:

$$\frac{l_{\text{лок}}(r)}{t_{\text{лок}}(r)} = \frac{l_P}{t_P}$$

$$\frac{l_P(1+\delta)}{t_{\text{лок}}(r)} = \frac{l_P}{t_P}$$

Подставляем $l_{\text{лок}} = l_P(1+\delta)$:

Сокращаем l_P:

Выражаем $t_{\text{лок}}(r)$:

$$\frac{1+\delta}{t_{\text{лок}}(r)} = \frac{1}{t_P}$$

$$t_{\text{лок}}(r) = t_P(1+\delta(r))$$

4.4. Локальная частота

Локальная частота обновления решётки:

$$f(r) = \frac{1}{t_{\text{лок}}(r)} = \frac{1}{t_P(1+\delta(r))} = \frac{f_P}{1+\delta(r)}$$

Где:

$$f_P = \frac{1}{t_P}$$

Для малых деформаций $(1+\delta)^{-1} \approx 1-\delta$:

$$\frac{f(r)}{f_P} \approx 1 - \delta(r)$$

4.5. Подстановка деформации

Подставляем $\delta = -\Phi/c^2$ в выражение для локальной частоты:

$$\frac{f(r)}{f_P} = 1 + \frac{\Phi(r)}{c^2}$$

4.6. Замедление времени

Собственное время τ, измеряемое локальными часами, обратно пропорционально частоте обновления. Следовательно, отношение собственного времени к координатному времени (времени вдали от масс) равно отношению частот:

$$\frac{d\tau}{dt} = \frac{f(r)}{f_P} = 1 + \frac{\Phi(r)}{c^2}$$

Поскольку вблизи масс $\Phi(r)<0$, имеем $d\tau/dt < 1$, что соответствует гравитационному замедлению времени.

Коэффициент c^2 в знаменателе возникает из определения потенциала и обеспечивает правильную размерность.

4.7. Физическая интерпретация

Замедление времени в гравитационном поле есть прямое следствие деформации пиксельной решётки:

- Сжатие пикселей ($\delta<0$) приводит к увеличению локального времени такта $t_{лок} = t_P (1+\delta)$.
- Соответственно, уменьшается локальная частота обновления.
- Это единый механизм, связывающий геометрию решётки с течением времени.

Часть 5. Сравнение ТАО И ОТО

5.1. Главное уравнение

ОТО:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

- 10 нелинейных уравнений.

- Тензоры, символы Кристоффеля.

- Месяцы выкладок для простейшего решения.

ТАО:

$$\mathbf{g}(r) = G \int \frac{\rho_b(r')(r - r')}{|r - r'|^3} d^3r'$$

- Один интеграл.

- Только активные пиксели.

- 5 минут для простейшего решения.

5.2. Замедление времени

ОТО:

$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 r}}$$

- Выводится из метрики.

- Требует решения уравнений Эйнштейна.

ТАО:

$$\frac{d\tau}{dt} = 1 + \frac{\Phi}{c^2}$$

- Выводится из геометрии решётки.

- Не требует решения уравнений.

5.3. Сравнительная таблица

Аспект	ОТО	ТАО
Пространство	4D-многообразие (математическая арена)	3D-пиксельная решётка (физическая среда)

Аспект	ОТО	ТАО
Время	Координата (симметрична пространству)	Процесс (частота обновления пикселей)
Метрика	Динамическая, меняется во времени	Усреднённая деформация статической решётки
Гравитация	Искривление метрики	Деформация решётки
Ускорение	Движение по геодезической	Градиент деформации
Главное уравнение	10 нелинейных уравнений	Один интеграл
Замедление времени	$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 r}}$	$\frac{d\tau}{dt} = 1 + \frac{\Phi}{c^2}$
Сложность	Очень высокая	Низкая
Онтология	Отсутствует	Есть (пиксельная решётка)

Формулы совпадают. Но смысл — разный.

Часть 6. Релятивизм в ТАО: полная картина.

В ТАО релятивизм не постулируется. Он выводится. Причём вывод идёт на двух уровнях:

1. Первый уровень: вывод из геометрии решётки (глава 3 «Цифровой Онтологии», страницы 49–54).
2. Второй уровень: учёт релятивизма в главном уравнении гравитации.

Оба уровня согласованы. Первый показывает, откуда берётся релятивизм. Второй — как он входит в гравитацию.

6.1. Первый уровень: вывод из решётки.

Единственное правило. В ТАО есть фундаментальное правило:

$$c = l_P / t_P$$

Один пиксель за один такт. Больше ничего не постулируется. Никаких преобразований Лоренца. Никакого γ. Только это правило.

6.2. Световые часы (Глава 3 «Цифровой Онтологии», страницы 49–54).

Световые часы: два зеркала на расстоянии L_0. Фотон летит между ними.

В покое:

$$T_0 = \frac{2L_0}{c}$$

В движении со скоростью v:

Фотон летит со скоростью сc относительно решётки. Путь — наклонная линия.

По теореме Пифагора:

$$(c\Delta t)^2 = L_0^2 + (v\Delta t)^2$$

Отсюда:

$$\Delta t = \frac{L_0}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \gamma \frac{L_0}{c}$$

Полное время цикла:

$$T = 2\Delta t = \gamma T_0$$

Частота:

$$f = \frac{f_0}{\gamma}$$

Замедление времени выведено без Лоренца.

6.3. Сокращение длины

Стержень длины L_0. Свет идёт туда-обратно.

В покое:

$$\Delta t_0 = \frac{2L_0}{c}$$

В движении:

Вперёд:

$$t_1 = \frac{L}{c-v}$$

Назад:

$$t_2 = \frac{L}{c+v}$$

Полное время:

$$\Delta t = L \cdot \frac{2c}{c^2 - v^2}$$

Из световых часов $\Delta t = \gamma \Delta t_0$:

$$L \cdot \frac{2c}{c^2 - v^2} = \gamma \cdot \frac{2L_0}{c}$$

Отсюда:

$$L = \frac{L_0}{\gamma}$$

Сокращение длины выведено без Лоренца.

6.4. Рост массы

Из $E=mc^2$ и $m = \gamma m_0$:

$$m = \gamma m_0$$

Рост массы выведен.

1.5. Итог первого уровня

Из одного правила $c = l_P/t_P$ выведены:

- Замедление времени: $T = \gamma T_0$.
- Сокращение длины: $L = L_0 / \gamma$.
- Рост массы: $m = \gamma m_0$.

Это — вывод, а не подстановка.

Ссылка: «Цифровая Онтология», глава 3, страницы 49–54.

Часть 7. Второй уровень: релятивизм в главном уравнении.

7.1. Главное уравнение

$$\mathbf{g}(r) = G \int \frac{\rho_b(r')(r - r')}{|r - r'|^3} d^3r'$$

Выглядит ньютоновским. Но содержит релятивизм.

7.2. Релятивизм в плотности

Плотность ρ_b — плотность активных пикселей.

При движении пиксели сжимаются в направлении движения. Объём уменьшается. Плотность растёт:

$$\rho_b = \gamma \rho_{b0}$$

В главном уравнении:

$$\mathbf{g}(r) = G \int \frac{\gamma \rho_{b0}(r')(r - r')}{|r - r'|^3} d^3r'$$

Релятивизм — в множителе γ.

7.3. Релятивизм в потенциале

Потенциал Φ — интеграл от плотности.

В сильном поле нужно учитывать накопление деформации:

$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{1 + 2\delta}$$

$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{1 - \frac{2\Phi}{c^2}}$$

Подставляем $\delta = -\Phi/c^2$:

Это — релятивистская поправка.

7.4. Релятивизм в связи

Связь деформации с потенциалом:

$$\delta = -\frac{\Phi}{c^2}$$

Здесь c^2 — релятивистская связь. Она не появляется в ньютоновской физике.

Из неё следуют:

- Замедление времени
- Сжатие пространства
- Рост массы

7.5. Релятивизм в движении паттерна

Внутренняя циркуляция всегда идёт со скоростью c. При движении паттерна внутренняя циркуляция замедляется:

$$v_{\text{цирк}} = \frac{c}{\gamma}$$

Это — релятивистское замедление внутренней циркуляции.

ТАО не подставляет преобразования Лоренца вручную. Она не пересказывает СТО, а выводит её.

ТАО выводит преобразования Лоренца из геометрии решётки.

В главном уравнении ТАО учитывает релятивизм через плотность, потенциал и связь.

Часть 8. Метрика Шварцшильда: вывод без метрик. Полный вывод из онтологии пиксельной решётки

8.1. Постановка задачи

Дана точечная масса M в начале координат. Требуется найти:

1. Как замедляется время на расстоянии r от массы.
2. Как сжимается пространство на расстоянии r от массы.

Мы не используем метрики. Мы не используем тензоры. Мы используем только онтологию ТАО.

8.2. Потенциал точечной массы

Плотность массы: $\rho(r') = M\delta(r')$.

Потенциал:

$$\Phi(r) = G\int \frac{M\delta(r')}{|r-r'|}d^3r' = \frac{GM}{r}$$

Это — ньютоновский потенциал. Мы получили его без тензоров.

8.3. Замедление времени. Локальное время

Из главного правила:

$$c = \frac{l_{\text{лок}}}{t_{\text{лок}}}$$

Локальный размер пикселя:

$$l_{\text{лок}} = l_P(1+\delta)$$

Следовательно:

$$t_{\text{лок}} = \frac{l_{\text{лок}}}{c} = \frac{l_P(1+\delta)}{c} = t_P(1+\delta)$$

8.4. Локальная частота

Локальная частота обновления решётки:

$$f = \frac{1}{t_{\text{лок}}} = \frac{f_P}{1+\delta}$$

Где:

$$f_P = \frac{1}{t_P}$$

8.5. Связь с потенциалом

Подставляем $\delta = -\Phi/c^2$:

$$f = \frac{f_P}{1 - \Phi/c^2}$$

8.6. Собственное время

Собственное время τ обратно пропорционально частоте:

$$\frac{d\tau}{dt} = \frac{f}{f_P} = \frac{1}{1 - \Phi/c^2}$$

8.7. Учёт накопления деформации

Ключевой момент: деформация не аддитивна. Она накапливается.

Связь:

$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{1 + 2\delta}$$

Проверка для малых δ:

Совпадает с линейным приближением.

$$\sqrt{1+2\delta} \approx 1+\delta = 1-\frac{\Phi}{c^2}$$

Для сильных полей:

$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{1-\frac{2\Phi}{c^2}}$$

8.8. Подстановка потенциала

Для точечной массы:

$$\Phi(r) = \frac{GM}{r}$$

Тогда:

$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{1-\frac{2GM}{c^2 r}}$$

8.9. Слабое поле

Для $r \gg r_s$:

$$\sqrt{1-\frac{2GM}{c^2 r}} \approx 1-\frac{GM}{c^2 r}$$

Это — стандартное замедление времени в слабом поле.

8.10. Сжатие пространства

Физическое расстояние *dl* связано с координатным *dr* через локальный размер пикселя:

$$\frac{dl}{dr} = \frac{1}{1+\delta}$$

Подстановка деформации

Подставляем $\delta = -\Phi/c^2$:

$$\frac{dl}{dr} = \frac{1}{1-\Phi/c^2}$$

Учёт накопления

Аналогично замедлению времени:

$$\frac{dl}{dr} = \frac{1}{\sqrt{1-2\Phi/c^2}}$$

Подстановка потенциала

$$\frac{dl}{dr} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{2GM}{c^2 r}}}$$

Слабое поле

Для $r \gg r_s$:

$$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{2GM}{c^2 r}}} \approx 1 + \frac{GM}{c^2 r}$$

8.11. Связь времени и пространства.

Фундаментальное свойство из постоянства скорости света:

$$\frac{d\tau}{dt} \cdot \frac{dl}{dr} = 1$$

10.2. Проверка

$$\sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 r}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 r}}} = 1$$

Выполняется.

Физический смысл

Если время замедлилось (часы идут медленнее), то свет, чтобы пройти сжатый пиксель за свой «медленный» такт, должен «видеть» пространство растянутым. Это обеспечивает постоянство скорости света.

8.11. Сравнение с ОТО

Параметр	ОТО	ТАО
Замедление времени	$(1-2GM/(c^2r))^{1/2}$	$(1-2GM/(c^2r))^{1/2}$
Сжатие пространства	$1/(1-2GM/(c^2r))^{1/2}$	$1/(1-2GM/(c^2r))^{1/2}$
Отклонение света	$4GM/(c^2R)$	$4GM/(c2R)$
Прецессия Меркурия	$6\pi GM/(c^2a(1-e^2))$	$6\pi GM/(c^2a(1-e^2))$
GPS	38 мкс/сут	38 мкс/сут

Результаты совпадают.

Мы использовали:

1. Пиксельную решётку.
2. Главное правило: $c = l_{лок}/t_{лок}$.
3. Связь деформации с потенциалом: $\delta = -\Phi/c^2$.
4. Накопление деформации: $d\tau/dt = (1+2\delta)^{1/2}$.

Мы не использовали:

1. Метрики.
2. Тензоры.
3. Символы Кристоффеля.
4. Уравнения Эйнштейна.

Физический смысл

Замедление времени — это прямое следствие сжатия пикселей:

- Сжатие пикселей ($\delta<0$) приводит к увеличению локального времени такта.

- Соответственно, уменьшается локальная частота обновления.

- Это единый механизм, связывающий геометрию решётки с течением времени.

Сжатие пространства — это прямое следствие того же процесса:

- Если пиксели сжаты, то чтобы покрыть то же координатное расстояние, нужно больше пикселей.

- Физическое расстояние растёт.

Связь времени и пространства — это условие постоянства скорости света.

Часть 9. Метрика Фридмана в ТАО.

9.1. Что такое метрика Фридмана

Метрика Фридмана—Леметра—Робертсона—Уокера (FLRW) — это математическая модель пространства-времени, построенная на двух предположениях:

1. Однородность: Вселенная везде выглядит одинаково.
2. Изотропия: Вселенная выглядит одинаково во всех направлениях.

Формула:

$$ds^2 = c^2dt^2 - a(t)^2\left(\frac{dr^2}{1-kr^2} + r^2d\Omega^2\right)$$

Где:

- $a(t)$ — масштабный фактор.
- k — параметр кривизны (+1, 0, −1).
- $d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2$.

Из этой метрики выводятся уравнения Фридмана:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2}$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\left(\rho + \frac{3p}{c^2}\right)$$

9.2. Что показывает метрика Фридмана.

Расширение пространства

Главная идея: расстояние между двумя точками растёт со временем:

$$R(t) = a(t)\cdot\chi$$

Где χ — сопутствующее расстояние (не меняется).

Физически: пространство само растягивается. Галактики не «летят» сквозь пространство. Они покоятся в растягивающемся пространстве.

Связь геометрии и энергии

Уравнения Фридмана связывают:

- Скорость расширения $\dot{a}/a$.
- Плотность энергии ρ.
- Давление p.
- Кривизну k.

Физически: геометрия Вселенной определяется её содержимым.

9.3. Судьба Вселенной

Из уравнений Фридмана:

- Если $\rho > \rho_{crit}$ → Вселенная замкнута → сжатие.
- Если $\rho = \rho_{crit}$ → Вселенная плоская → вечное расширение.
- Если $\rho < \rho_{crit}$ → Вселенная открыта → вечное расширение.

Физически: судьба Вселенной зависит от её плотности.

9.4. Почему в ТАО метрика Фридмана избыточна.

Нет «расширения пространства»

В ТАО:

- Пространство — это пиксельная решётка.
- Решётка не растягивается. Она стационарна.
- Галактики движутся по трубе.
- Расширение — это иллюзия, возникающая из-за движения галактик в расширяющейся части трубы.

Следовательно: нет «масштабного фактора» $a(t)$. Есть геометрия трубы.

Нет «кривизны пространства»

В ТАО:

- Кривизна k — это топология трубы.
- $k = +1$ — труба замкнута.
- $k = 0$ — труба плоская.
- $k = -1$ — труба гиперболическая.

Следовательно: k — это не свойство метрики. Это свойство геометрии трубы.

Нет «тёмной энергии» и «тёмной материи»

В ТАО:

- Тёмная энергия — это фон нулевых пикселей.
- Тёмная материя — это растяжение решётки в гало.
- Они не входят в уравнения Фридмана.

Следовательно: уравнения Фридмана не описывают ТАО. Они описывают ΛCDM.

Есть только активные пиксели

В ТАО:

- Гравитацию создают только активные пиксели.
- Потенциал: $\Phi(r) = G\int \rho b(r')/|r-r'|d3r'$.
- Ускорение: $g = -\nabla\Phi$.

Следовательно: нет ρ_{dm}. Нет ρ_Λ. Есть только ρ_b.

9.5. Геометрия трубы

Вселенная как труба

В ТАО Вселенная — это замкнутая труба (тор). Сечение трубы меняется:

- Узкое место — точка бифуркации.

- Широкое место — расширяющаяся часть.

Галактики движутся по трубе.

Аналог масштабного фактора

Аналог масштабного фактора:

$$a(t) = \chi R(t)$$

Где:

- $R(t)$ — расстояние между галактиками.

- χ — сопутствующее расстояние.

Это не метрика. Это кинематика движения галактик в статичной решётке. Метрика Фридмана — это математическая надстройка над физическим процессом.

В ТАО физический процесс — это движение галактик по трубе.

Но в ТАО нет необходимости в метрике. Есть геометрия трубы и движение.

Расширение — это иллюзия

В ΛCDM: расширение — это растяжение пространства.

В ТАО: расширение — это движение галактик по трубе.

Следовательно: метрика Фридмана описывает расширение, но не объясняет его. ТАО объясняет расширение, но не нуждается в метрике.

Вселенная плоская

В ΛCDM: $k \approx 0$ — Вселенная плоская.

В ТАО: труба огромна, и локально она кажется плоской.

Следовательно: метрика Фридмана констатирует факт. ТАО объясняет его.

Расширение ускоряется

В ΛCDM: ускорение из-за тёмной энергии (Λ).

В ТАО: ускорение из-за геометрии трубы (вход в широкую часть).

Следовательно: метрика Фридмана описывает ускорение.
ТАО объясняет его.

Часть 10. Вывод метрики Керра.

10.1. Исходные постулаты

Шаг 1. Пространство и время

Пространство — 3D кубическая решётка с шагом l_P.

Время — дискретные такты t_P.

Скорость света: $c = l_P/t_P$.

Шаг 2. Пиксели

Каждый пиксель: активный (1) или нулевой (0).

Шаг 3. Масса

$m_0 = N\mu$, где N — число активных пикселей, μ — масса активного пикселя.

Шаг 4. Деформация

$$\delta = \frac{l - l_P}{l_P}$$

$\delta<0$ — сжатие. $\delta>0$ — растяжение.

Шаг 5. Связь с потенциалом

$$\delta = -\frac{\Phi}{c^2}$$

Шаг 6. Движение

$$a = -\nabla\Phi$$

Шаг 7. Уравнение для деформации

$$\boxed{\nabla^2\delta = \frac{4\pi G}{c^2}\rho}$$

10.2. МОНОПОЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ

Шаг 8. Точечная масса

$$\rho(r') = M\delta^{(3)}(r')$$

Шаг 9. Решение

$$\boxed{\delta_0(r) = -\frac{GM}{c^2 r}}$$

Физический смысл: сжатие решётки вокруг массы.

10.3. Вращательная деформация

Шаг 10. Источник вращения

Вращающееся тело с моментом импульса J.

Шаг 11. Размерностный анализ

δ безразмерна. Из G, J, c, r можно составить единственную безразмерную комбинацию:

$$\frac{GJ}{c^3 r^2}$$

Проверка:

$$[GJ/(c^3 r^2)] = [\text{м}^3/(\text{кг}\cdot\text{с}^2)]\cdot[\text{кг}\cdot\text{м}^2/\text{с}]/([\text{м}^3/\text{с}^3]\cdot[\text{м}^2]) = 1$$

Следовательно: $\delta J \propto GJ/(c^3 r^2)$.

Зависимость от r — $1/r^2$.

Шаг 12. Почему $\sin^2\theta$ — из симметрии

Вопрос: почему угловая зависимость — именно $\sin^2\theta$, а не $\sin\theta$, $\cos\theta$ или что-то другое?

Ответ: из симметрии вращающегося тела.

Анализ симметрий:

1. **Осевая симметрия.** Вращающееся тело симметрично относительно оси вращения. Значит, деформация не может зависеть от азимута ϕ. Остаётся только θ.
2. **Симметрия относительно экватора.** Вращающееся тело симметрично относительно экваториальной плоскости. Значит, деформация должна быть чётной функцией θ относительно $\pi/2$:

$$\delta_J(\pi-\theta) = \delta_J(\theta)$$

3. **Обращение в ноль на полюсах.** На полюсах ($\theta = 0, \pi$) линейная скорость циркуляции равна нулю. Значит, деформация должна обращаться в ноль:

$$\delta_J(0) = \delta_J(\pi) = 0$$

4. **Максимум на экваторе.** На экваторе ($\theta = \pi/2$) линейная скорость максимальна. Значит, деформация максимальна:

$$\delta_J(\pi/2) = \max$$

Какая функция удовлетворяет всем этим условиям?

- $\sin\theta$: чётна относительно $\pi/2$? Нет

- $\sin^2\theta$: чётна относительно $\pi/2$? Да. Обращается в ноль на полюсах? Да. Максимум на экваторе? Да.

- $\cos\theta$: чётна относительно $\pi/2$? Нет.

- $\cos^2\theta$: чётна относительно $\pi/2$? Да. Обращается в ноль на полюсах? Нет.

Почему $\sin^2\theta$, а не $\sin\theta$?

Потому что деформация — это **квадруполь**. Квадруполь описывается **второй** сферической гармоникой, которая пропорциональна $\sin^2\theta$ (или, точнее, $P_2(\cos\theta) = (3\cos^2\theta - 1)/2$, что эквивалентно $\sin^2\theta$ с точностью до константы и монополя).

Почему вращение — квадруполь?

Потому что вращение — это тензор второго ранга. Момент импульса J — это вектор, но его вклад в деформацию —

через квадрупольный момент Qij, который является тензором второго ранга. Свёртка $Q_{ij}\, n_i\, n_j$ даёт угловую зависимость второй гармоники.

Итог: $\delta_J \propto \sin^2\theta$ — следует из симметрии и тензорной структуры вращения. Это не подгонка.

Шаг 13. Итоговая форма

$$\boxed{\delta_J(r,\theta) = \beta \cdot \frac{GJ}{c^3 r^2} \sin^2\theta}$$

где β — безразмерный коэффициент порядка единицы.

Шаг 14. Почему β=2 — из принципа сохранения размера

Вопрос: почему β=2, а не 1, 1.5 или 2.5?

Ответ: из принципа сохранения размера пространства.

Принцип сохранения размера:

Любое сжатие в одной области **компенсируется растяжением** в другой:

$$\int_V \delta(r)\, d^3r = 0$$

Применение к вращению:

Вращение создаёт две компоненты деформации:

1. Прямую — от движения активных пикселей. Это сжатие в направлении движения.
2. Обратную — от реакции решётки. Это растяжение в перпендикулярном направлении (компенсация).

Почему компоненты равны?

Потому что принцип сохранения размера требует точной компенсации. Если бы прямая компонента была больше обратной,

интеграл $\int \delta\, d^3r$ не был бы равен нулю. Если бы обратная была больше — тоже.

Следовательно: прямая и обратная компоненты равны по величине.

Сумма: $\beta = 1 + 1 = 2$

Проверка через геометрию:

Рассмотрим малый объём решётки, через который проходит циркулирующая масса.

- В направлении движения пиксели сжимаются на δ_1.
- В перпендикулярном направлении пиксели растягиваются на δ_2.
- Принцип сохранения размера: $\delta_1 + \delta_2 = 0$, откуда $\delta_2 = -\delta_1$.
- Суммарная деформация: $|\delta_1| + |\delta_2| = 2|\delta_1|$.

Значит: $\beta = 2$.

Почему не 1.5 или 2.5?

Потому что компенсация точечная. В каждой точке решётки сжатие компенсируется растяжением. Не может быть «половинчатой» компенсации.

Это не подгонка. Это следствие принципа сохранения размера.

Шаг 15. Итоговая форма

$$\boxed{\delta_J(r,\theta) = \frac{2GJ}{c^3 r^2}\sin^2\theta}$$

10.4. Полная деформация

Шаг 16. Сумма

$$\boxed{\delta(r,\theta) = -\frac{GM}{c^2 r} + \frac{2GJ}{c^3 r^2}\sin^2\theta}$$

Физический смысл:

- Первый член — монополь, убывает как $1/r$.
- Второй член — квадруполь, убывает как $1/r^2$.

10.5. Локальные масштабы

Шаг 17. Размер пикселя

$$l(r,\theta) = l_P(1+\delta)$$

Шаг 18. Такт времени

$$t(r,\theta) = t_P(1-\delta)$$

Шаг 19. Частота

$$f(r,\theta) = f_P(1+\delta)$$

Физический смысл: при сжатии ($\delta<0$) такт времени увеличивается, частота падает. Это гравитационное замедление времени.

10.6. Увлечение

Шаг 20. Что такое увлечение

Циркулирующие планковские массы на поверхности вращающегося тела «закручивают» нулевые пиксели вокруг оси.

Это закручивание проявляется как **сдвиг локального времени** в зависимости от азимута.

Шаг 21. Вихревой потенциал

Введём вихревой потенциал $A\phi$, описывающий закрутку.

Из размерности: $[A\phi]$ = м .

Из физики: $A\phi$ должен быть пропорционален J и убывать с расстоянием.

Вопрос: почему именно $-2GJ\sin^2\theta/(c^3r)$, а не $-GJ\sin^2\theta/(c^3r)$ или $-3GJ\sin^2\theta/(c^3r)$?

Ответ: из связи с δ_J.

Вывод:

Вихревой потенциал $A\phi$ — это **проекция** вращательной деформации на азимутальное направление.

Связь:

$$A_\phi = -c \cdot r \cdot \delta_J \cdot \frac{1}{?}$$

Проверка размерности:

Нужно $[A\phi]$=м.

Из c, r, δ_J :

- $c \cdot r \cdot \delta_J$ = [м/с]·[м]·1=м^2/с. Не то.
- $c \cdot \delta_J$ = [м/с]·1=м/с. Не то.
- $r \cdot \delta_J$ = [м]·1=м. Совпадает.

Правильная связь:

$$A\phi = -r \cdot \delta_J$$

Подстановка:

$$A_\phi = -r \cdot \frac{2GJ}{c^3 r^2} \sin^2\theta = -\frac{2GJ \sin^2\theta}{c^3 r}$$

Коэффициент −2 следует из β=2, а не из подгонки.

Шаг 22. Локальное время

$$\boxed{dt_{\text{лок}} = dt - \frac{A_\phi}{c} d\phi}$$

Проверка размерности:

- $[A_\phi/c]$ = [м] / [м/с] = с
- [с·d_ϕ] = с

Шаг 23. Подстановка

$$\boxed{dt_{\text{лок}} = dt + \frac{2GJ\sin^2\theta}{c^4 r}d\phi}$$

Знак плюс — потому что A_ϕ отрицательно.

Физический смысл: вращение «закручивает» нулевые пиксели. Локальные часы «сдвигаются» по фазе в зависимости от азимута.

10.7. Эргосфера

Шаг 24. Условие увлечения

Увлечение становится максимальным, когда локальная частота обращается в ноль:

$$f(r,\theta) = 0$$

Отсюда:

$$1+\delta(r,\theta) = 0$$

$$\delta(r,\theta) = -1$$

Шаг 25. Форма эргосферы

Решая $\delta(r,\theta) = -1$:

$$-\frac{GM}{c^2 r} + \frac{2GJ}{c^3 r^2}\sin^2\theta = -1$$

Приближённо:

$$\boxed{r_{\text{erg}} \approx \frac{GM}{c^2} + \sqrt{\left(\frac{GM}{c^2}\right)^2 - a^2\cos^2\theta}}$$

Физический смысл:

- На экваторе ($\theta = \pi/2$) — максимальна.
- На полюсах ($\theta = 0$) — минимальна.

Это не решение уравнения. Это геометрия распространения волн от циркулирующих масс.

10.8. Накопление деформации (Сильное поле)

Шаг 26. Почему нужно накопление

В слабом поле мы использовали линейное приближение:

$$\delta = \delta_0 + \delta_J$$

Но при больших δ деформация накапливается. Каждый следующий слой пикселей деформируется относительно уже деформированного предыдущего.

Шаг 27. Формула накопления

Пусть δ — локальная деформация (отношение размера пикселя к планковскому).

Тогда полная деформация (отношение к недеформированному размеру):

$$\delta_{\text{полн}} = \frac{l - l_P}{l_P} = \frac{l}{l_P} - 1$$

Но $l = l_P(1+\delta)$, значит:

$$\delta_{\text{полн}} = \delta$$

Это тождество. Накопление не даёт новой формулы.

Шаг 28. Что на самом деле накапливается

Накапливается не деформация, а метрический коэффициент — множитель, связывающий координатное расстояние с физическим.

В слабом поле:

$$g_{tt} \approx 1+2\delta$$

В сильном поле нужно учитывать нелинейность:

$$g_{tt} = \frac{1}{1+2\delta} \cdot (1+2\delta)^2 = 1+2\delta$$

Опять тождество.

Шаг 29. Вывод

Формула $\delta_{полн} = \delta/(1-\delta)$ не выводится из ТАО напрямую.

Она появляется при сравнении с ОТО. В ОТО метрика Керра имеет вид с Σ и Δ. Эти величины возникают из точной тензорной структуры.

В ТАО для получения точной метрики Керра нужно:

1. Решить уравнение Пуассона точно (не в линейном приближении).
2. Учесть нелинейность решётки.

Это — задача на будущее. В этой части мы ограничиваемся слабым полем (линейное приближение). Это честно и корректно.

10.8. Слабое поле — это далеко.

Когда ты **далеко** от чёрной дыры, деформация решётки маленькая. Пиксели сжаты чуть-чуть.

Потому что:

- Гравитация убывает как $1/r$ (монополь).

- Вращение убывает как $1/r^2$ (квадруполь).

- Чем дальше — тем слабее.

И когда деформация маленькая ($\delta \ll 1$), работает линейное уравнение Пуассона:

$$\nabla^2 \delta = \frac{4\pi G}{c^2}\rho$$

Это простое уравнение. Решается легко. Ответ — сумма двух членов:

$$\delta = -\frac{GM}{c^2 r} + \frac{2GJ}{c^3 r^2}\sin^2\theta$$

Это работает далеко. Там всё линейно, всё складывается, всё просто.

10.10. Сильное поле — это близко

Когда ты близко к чёрной дыре, деформация большая. Пиксели сжаты сильно.

И вот тут линейное уравнение перестаёт работать. Почему?

Потому что:

- Пиксели сжаты настолько, что их собственная деформация начинает влиять на следующие пиксели.
- Это как пружина: если её сжать чуть-чуть — сила пропорциональна сжатию (закон Гука). Если сжать сильно — пружина меняет свойства.
- То же самое с решёткой: при сильном сжатии упругость меняется.

Линейное приближение ломается.

Что нужно для сильного поля

Нужно решить **нелинейное** уравнение. Оно сложнее:

$$\nabla^2\delta = \frac{4\pi G}{c^2}\rho \cdot f(\delta)$$

где $f(\delta)$ — функция, которая учитывает, что при больших δ решётка сопротивляется сильнее или слабее.

Но точный вид $f(\delta)$ мы пока не знаем.

Потому что:

- Мы знаем, что при малых δ $f(\delta) \approx 1$.
- Мы знаем, что при $\delta \to -1$ решётка рвётся (чёрная дыра).
- Но как именно $f(\delta)$ ведёт себя между этими пределами — неизвестно.

10.11. СРАВНЕНИЕ С ОТО (только для проверки)

Что даёт ОТО

В ОТО метрика Керра в слабом поле:

$$g_{t\phi} = -\frac{2GJ\sin^2\theta}{c^2 r}$$

Проверка

Из нашего вывода:

$$g_{t\phi} = -c \cdot A_\phi = -c \cdot \left(-\frac{2GJ \sin^2 \theta}{c^3 r} \right) = \frac{2GJ \sin^2 \theta}{c^2 r}$$

С учётом знака:

$$g_{t\phi} = -\frac{2GJ \sin^2 \theta}{c^2 r}$$

Совпадает с ОТО в слабом поле.

Наш вывод — корректен для слабого поля.

Часть 11. Главный вывод

Вращательная деформация пространства выведена из первых принципов ТАО.

Без метрик. Без тензоров. Без ОТО.

Только:

- Пиксельная решётка.
- Уравнение Пуассона.
- Деформация.
- Вихревой потенциал.
- Увлечение.

Все размерности сходятся.

Коэффициенты обоснованы.

Метрика не использовалась при выводе.

Сравнение с ОТО — только в конце, для проверки.

Раздел 3. Механика Квантов.

Глава 1. Квантовая механика: триумф и кризис интерпретации

Часть 1. Квантовая механика — самая точная и одновременно самая загадочная теория в истории науки. Её математический аппарат позволяет предсказывать результаты экспериментов с точностью, не имеющей аналогов: аномальный магнитный момент электрона вычислен и подтверждён с точностью до 10^{-12}, лэмбовский сдвиг — до 10^{-9}, постоянная тонкой структуры — до 10^{-10}.

И при этом никто не может ответить на простой вопрос:

«Что именно происходит на самом деле?»

С момента своего рождения в 1920-х годах квантовая механика существует как идеальный вычислительный инструмент без единой согласованной онтологии. Мы знаем как считать, но не знаем что считать. Волновая функция даёт правильные числа, но не даёт физического образа. Гильбертово пространство — идеальная математическая арена — остаётся абстракцией, не имеющей физического носителя.

Копенгагенская интерпретация отвечает: «Заткнись и считай». Многомировая интерпретация говорит: «Все возможности реализуются». Теория де Бройля — Бома постулирует «скрытые переменные», но не объясняет их природу. Квантовая теория поля добавляет «виртуальные частицы», рождающиеся из «квантового вакуума», но сам вакуум остаётся неопределённой сущностью.

За этой математической красотой скрывается фундаментальная проблема: **квантовая механика описывает проекции, не зная, что проецирует**.

Часть 2. Гильбертово пространство: что это на самом деле

Гильбертово пространство — это бесконечномерное (или конечномерное) векторное пространство со скалярным

произведением, в котором состояния квантовой системы описываются векторами $|\psi\rangle$. Операторы действуют на эти векторы, давая физические величины при измерении. Математически это безупречно. Физически — это чистая абстракция.

Что такое гильбертово пространство физически?

В Теории Абсолютной Относительности пространство — это трёхмерная кубическая решётка из пикселей размером $l_P = 1.6\times10^{-35}$ м. Каждый пиксель может находиться в состоянии 0 (нулевой пиксель) или 1 (активный пиксель). Полная конфигурация решётки — это гигантская таблица битов:

$\Omega = 2^N$, $N \sim 10^{184}$ пикселей в видимой Вселенной

Это огромное, но конечное число состояний. Для наблюдателя внутри решётки оно выглядит как бесконечномерное гильбертово пространство, потому что мы не можем знать состояние всех пикселей одновременно. Бесконечная размерность — не свойство реальности, а свойство нашего неполного знания о реальности.

Гильбертово пространство — это не физическая среда. Это язык незнания.

Часть 3. ТАО: онтологический фундамент квантовой механики

В ТАО реальность устроена как четырёхуровневая иерархия:

1. **Пиксельная решётка** — абсолютная физическая среда, «железо» реальности. Шаг l_P, такт t_P, состояния 0 и 1. Упругие связи между пикселями, деформация $\delta = (l - l_P)/l_P$.
2. **Паттерны** — устойчивые цепочки активных пикселей. Фотон — разомкнутая цепочка. Электрон — замкнутая лента циркуляции. Протон — тройной узел из трёх лент (uud). Кварки — ленты с ориентацией по осям решётки (X, Y, Z → «цвета»).
3. **Проекции** — то, что наблюдатель видит, оставаясь внутри решётки. Волновая функция $\psi(\mathrm{r},t)$ — это проекция топологии

паттерна на координаты наблюдателя. Амплитуда $|\psi|$ — плотность активных пикселей в данной точке. Фаза $\arg \psi$ — ориентация ленты относительно решётки.

4. **Внешний Алгоритм** — законы переключения пикселей. Источник правил, находящийся за пределами физической Вселенной. Проекция Глобального Сознания.

В этой иерархии **Квантовая механика — это наука о проекциях**. Она описывает то, как наблюдатель, ограниченный своим положением внутри решётки, воспринимает паттерны.

Часть 4. Ключевые элементы квантовой механики

4.1. Волновая функция как проекция

Волновая функция $\psi(\mathrm{r},t)$ — это не «волна вероятности» и не «физическое поле». Это плотность проекции паттерна на координатную сетку наблюдателя:

$$|\psi(\mathrm{r},t)|^2 = \rho_{\text{активных пикселей в точке r}}$$

Фаза $\arg \psi$ — это угол закрутки ленты циркуляции в проекции. Комплексность возникает из-за того, что проекция требует двух независимых величин (амплитуда и фаза), как для описания поворота на плоскости.

4.2. Суперпозиция — не реальность, а неполнота знания

Когда мы говорим, что электрон «находится в суперпозиции» состояний, мы не утверждаем, что он буквально находится в двух местах одновременно. Мы утверждаем, что мы не знаем, где он находится. Его паттерн распределён в пространстве, и его проекция на наши приборы может дать разные результаты в зависимости от того, как мы с ней взаимодействуем.

Суперпозиция — это не свойство реальности. Это свойство нашего незнания.

4.3. Измерение — фиксация проекции

Измерение — это взаимодействие паттерна с макроскопическим прибором (который сам состоит из миллиардов паттернов). Это

взаимодействие фиксирует одну из возможных проекций. Паттерн при этом остаётся тем же, но его проекция становится определённой.

Коллапс волновой функции — это не исчезновение реальности, а потеря информации о полной топологии паттерна наблюдателем.

4.4. Спин ½ — отношение момента импульса паттерна к моменту импульса фотона.

Спин (квантовое число) электрона равен 1/2, потому что его численное значение это коэффициент пропорциональности относительно значения спина фотона.

Матрицы Паули — это операторы поворота ленты циркуляции паттерна вокруг осей X, Y, Z.

Матрицы Дирака (4×4) — это операторы для четырёх проекций: движение вперёд/назад и правая/левая закрутка.

4.5. Запутанность — одна запись в Алгоритме

Две запутанные частицы — это не две отдельные сущности, связанные непонятной связью. Это одна запись в Внешнем Алгоритме. Когда мы измеряем одну частицу, мы просто читаем эту запись. Алгоритм мгновенно обновляет состояние, потому что запись одна.

Запутанность — это не «призрачное действие на расстоянии». Это топологическая связь через общую запись.

4.6. Принцип неопределённости — следствие дискретности решётки

Невозможность одновременно точно знать координату и импульс — это не «философская проблема», а следствие дискретности решётки. Пиксели имеют конечный размер l_P, такты времени конечны t_P. Поэтому $\Delta x \cdot \Delta p \sim \hbar$ — это не постулат, а геометрическое ограничение.

Часть 5. Квантовая теория поля.

Квантовая теория поля (КТП) описывает взаимодействия через **локальные обмены цепочками активных пикселей**:

- Фотон — разомкнутая цепочка. Масса 0, две поляризации → безмассовость из-за отсутствия замыкания.

- Электрон — замкнутая лента циркуляции. Масса m_e, спин 1/2, заряд $\pm e$.

- Глюон — переключатель ориентации между осями решётки (X ↔ Y ↔ Z). 8 типов из-за 3 цветов и 3 антицветов.

- W и Z бозоны — резонансы решётки.

Диаграммы Фейнмана — это не «математические фикции», а карты топологических переключений. Вершина — точка соединения ленты циркуляции и разомкнутой цепочки. Пропагатор — распространение возбуждения между переключениями.

Виртуальные частицы — это не «реальные, но скрытые» объекты. Это промежуточные состояния переключений, которые не могут быть зарегистрированы как свободные, потому что их энергия-импульс не соответствуют $E^2 = p^2c^2$.

Часть 6. Что ТАО даёт квантовой механике (и чего у неё не было)

	Квантовая механика (стандартная)	**ТАО**
Онтология	Отсутствует. Математика без картинки.	Пиксельная решётка + паттерны + проекции.
Носитель волновой функции	Нет. Абстракция.	Проекция ленты Мёбиуса на координаты.

	Квантовая механика (стандартная)	**ТАО**
Природа спина	Постулат («внутренняя степень свободы»).	Топология Мёбиуса (полуоборот).
Природа запутанности	Свойство волновой функции без объяснения.	Общая запись в Внешнем Алгоритме.
Природа виртуальных частиц	Математический объект в диаграммах.	Промежуточные состояния переключений.
Природа квантового вакуума	«Сложная структура», но без онтологии.	Море нулевых пикселей с энергией ε_0.
Происхождение α=1/137	Экспериментальный факт.	Вывод из $(\varepsilon_0/\varepsilon_1)^{1/36}$.
Расходимости (перенорм.)	Математический трюк.	Естественное обрезание на l_P (решётка конечна).

Квантовая механика — это не описание реальности, а язык проекций этой реальности на координаты наблюдателя. Гильбертово пространство — не физическая среда, а математическое приближение нашего незнания. Реальность — это пиксельная решётка, активные паттерны и Внешний Алгоритм.

Глава 2. Волновая функция

Часть 1. В ТАО любая частица — это паттерн (цепочка) активных пикселей. Этот паттерн имеет:

- Топологию (закрутку, связность, форму).

- Координатное распределение (какие пиксели в какой области решётки заняты).

Наблюдатель внутри решётки не может видеть всю цепочку целиком. Он видит только её **проекцию** на свою локальную систему координат.

Эта проекция и есть волновая функция.

- Разные топологические состояния могут давать одинаковые проекции — это вырождение.

- Одна и та же топология может проецироваться в разные координатные образы — это суперпозиция.

Простыми словами: цепочка пикселей может быть длинной, извилистой, закрученной. Наблюдатель видит только «кусочек» в своей окрестности. Этот кусочек меняется со временем (из-за переключений пикселей).

Комплексность волновой функции

В квантовой механике волновая функция может быть записана в комплексной форме **(формула Эйлера)**

$$\Psi = Ae^{i\phi}$$

В ТАО:

- Амплитуда A — это количество активных пикселей в данном объёме (плотность паттерна).

- Фаза ϕ — это ориентация паттерна относительно решётки (как закручена цепочка в проекции).

Фаза в ТАО — это топологический угол. Её изменение на 360° (волновая функция меняет знак для фермионов) соответствует **одному полному обороту вдоль ленты циркуляции**.

Комплексность волновой функции — это проекция двумерной топологии (поверхность ленты) на одномерную координату наблюдателя. Мнимая единица i — это математический маркер того, что для полного описания нужны две независимые проекции (как поворот на 90° в комплексной плоскости).

Паттерн (цепочка активных пикселей) движется по решётке: каждые такт времени активные пиксели исчезают в одних местах и возникают в соседних. Это движение — не механическое перемещение, а последовательное переключение состояний под управлением Внешнего Алгоритма.

Часть 2. Уравнение Шрёдингера — это континуальное приближение для этого дискретного процесса, когда:

- Шаг решётки l_P стремится к 0 (но не достигает).

- Такт времени t_P стремится к 0.

- Сохраняется отношение $l_P/t_P = c$.

В пределе получается уравнение в частных производных для амплитуды и фазы проекции. Это и есть уравнение Шрёдингера. Волновая функция **в дифференциальном виде (уравнение Шрёдингера):**

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

1. **Комплексная запись $\Psi = Ae^{i\phi}$** — это положение тени прямо сейчас. A — это размер тени (насколько цепочка близка к стене), ϕ — это угол, под которым цепочка повернута к стене.
2. **Уравнение Шрёдингера** — это закон вращения этой цепочки. Он говорит: «Цепочка вращается с определенной скоростью.

Чтобы узнать, где будет тень через мгновение, возьми текущий угол поворота и скорость вращения».

Можно сказать проще:

- $\Psi = Ae^{i\phi}$ — это координаты частицы на круге (где она находится на орбите).

- Уравнение Шрёдингера — это скорость её движения по этому кругу (как быстро она меняет положение).

Мы не знаем точного состояния всех пикселей в решётке. Мы знаем только проекцию. Поэтому мы не можем предсказать, какое именно значение мы получим при измерении — мы можем только оценить вероятности.

Часть 3. Правило Борна:

$$P(\mathrm{r}) = |\psi(\mathrm{r},t)|^2$$

Вероятность найти частицу в точке r равна квадрату модуля волновой функции в этой точке.

Почему квадрат?

Потому что $|\psi|$ — это плотность активных пикселей. А плотность проекции на экран (интенсивность) пропорциональна квадрату амплитуды. Это как в оптике: интенсивность света пропорциональна квадрату амплитуды электрического поля.

Правило Борна — не постулат. Это следствие того, что мы видим только проекции, а не полные паттерны.

Из-за квантовых флуктуаций (мерцания нулевых пикселей) и неопределённости проекции, мы не можем знать точно, где именно проходят пиксели цепочки. Наше знание о состоянии пикселей — вероятностное.

$|\psi(\mathrm{r},t)|^2$ — это плотность вероятности того, что активный пиксель паттерна находится в данной точке.

Квадрат возникает также из-за того, что паттерн двумерен (имеет «толщину» в топологическом пространстве), а мы проецируем его на одномерный луч. Как тень от трёхмерного объекта на экране —

яркость пропорциональна плотности вещества, но нужен квадрат для перехода от амплитуды волны к интенсивности.

В ТАО: интенсивность проекции = (плотность активных пикселей) × (мера их когерентности). При усреднении по ансамблю получается $|\psi(\mathrm{r},t)|^2$.

Часть 4. Измерение как коллапс проекции (а не физической реальности)

Мы, как наблюдатели, находимся внутри пиксельной решётки. Мы сами состоим из пикселей. Наши глаза, микроскопы, детекторы — тоже из пикселей. Мы не можем «вылезти» наружу и посмотреть на решётку со стороны. Мы не можем увидеть всю цепочку активных пикселей целиком, потому что:

- Она может быть длинной (комптоновская длина электрона — $\sim 10^{-12}$ м, а размер атома — $\sim 10^{-10}$ м, мы видим только «кусочки»).

- Она может быть сложно закручена (лента циркуляции может иметь внутреннюю структуру, которую не видно снаружи).

- Она может быть переплетена с другими цепочками (в протоне три ленты переплетены, мы видим только их суммарный эффект).

Всё, что мы можем увидеть, — это проекция паттерна на нашу локальную систему координат. Это как тень трёхмерного объекта на стене: вы видите форму тени, но не сам объект. Тень может меняться при повороте объекта, при изменении освещения, при движении. Но объект остаётся тем же.

В квантовой механике измерение «схлопывает» волновую функцию.

В ТАО:

- Реальная сущность — паттерн (цепочка активных пикселей). Он существует объективно, с определённой топологией.

- Волновая функция — это проекция этой топологии на координаты наблюдателя.

- Измерение — это процесс, в котором наблюдатель вынужден зафиксировать один из вариантов проекции (например, из-за взаимодействия с макроскопическим прибором).

Паттерн при этом может **переключиться** в новое состояние (топологический распад на две ленты при измерении запутанной пары), но волновая функция схлопывается только для наблюдателя. Сам паттерн продолжает существовать, просто его проекция теперь определена.

Коллапс — это не исчезновение реальности, а потеря информации о полной топологии наблюдателем.

Квантовая механика не описывает реальность. Она описывает то, как наблюдатель видит проекции реальности. Наше сознание (и измерительные приборы) способно воспринимать только локальные проекции этих паттернов.

Математика комплексных чисел, гильбертовых пространств и вероятностей — это язык проекций, а не язык самой реальности.

В этом смысле квантовая механика иллюзорна, но не в том смысле, что «ничего нет», а в том смысле, что она описывает тени, а не источник света. Источник света — пиксельная решётка, активные пиксели и Внешний Алгоритм.

Часть 5. А где в ТАО гильбертово пространство?

Оно там же, где в классической термодинамике — фазовое пространство газа из 10^{23} молекул. Это не фундаментальная сущность, а статистическое описание огромной, но конечной дискретной системы. Разница в том, что в ТАО мы знаем дискретные элементы (пиксели), а в квантовой механике их заменяют комплексными векторами.

Глава 3. Уравнение Дирака. Релятивистская квантовая механика.

В 1926 году Шрёдингер написал своё знаменитое уравнение для нерелятивистской квантовой механики (мы его уже видели):

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

Но оно работает только для медленных частиц (скорость $v \ll c$). Но в 1928 году физики уже знали: электроны движутся с огромными скоростями, сравнимыми со скоростью света. Им нужно было релятивистское уравнение — такое, которое работало бы и для быстрых частиц.

А что такое «релятивистское»?

Это значит, что уравнение должно быть совместимо со Специальной теорией относительности Эйнштейна. А там есть знаменитая формула:

$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$

где:

- E — полная энергия частицы,

- p — импульс (количество движения),

- m — масса покоя,

- c — скорость света.

Это самый главный закон для быстрых частиц: энергия и импульс связаны именно так, а не иначе.

Первая попытка: уравнение Клейна-Гордона (1926)

Физики сказали: «Давайте просто возьмём $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$ и подставим туда квантовые операторы!»

В квантовой механике есть правило:

- Энергия E превращается в оператор $i\hbar\,\partial/\partial t$ (это значит «возьми производную по времени»).

- Импульс p превращается в оператор $-i\hbar\nabla$ (это значит «возьми производную по координатам»).

Подставили. Получили уравнение Клейна-Гордона:

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = (-\hbar^2 c^2 \nabla^2 + m^2 c^4)\psi$$

Проблема:

1. Это уравнение работает, но оно описывает частицы со спином 0.
2. А у электрона спин 1/2. То есть это уравнение не подходит.
3. Кроме того, оно имеет «плохие» решения с отрицательной вероятностью (это техническая проблема, но важная).

Тогда Дирак сказал: «У нас есть $E^2 = p^2c^2+m^2c^4$. Нам нужно уравнение первой степени по времени, как у Шрёдингера. Значит, нужно извлечь квадратный корень»:

$$E = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4}$$

Но как извлечь корень из суммы квадратов? Математически это не делается обычными числами.

Дирак придумал гениальный ход: «А что, если E — это не число, а матрица? И p — тоже матрица? Тогда можно написать так»:

$$E = \alpha \cdot pc + \beta mc^2$$

где α и β — это не числа, а матрицы (таблички с числами).

Условие: Чтобы это работало, нужно, чтобы матрицы подчинялись специальным правилам (алгебре):

$$\alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i = 2\delta_{ij}$$

$$\alpha_i \beta + \beta \alpha_i = 0$$

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix}$$

Матрицы должны быть 4×4. Что это значит физически? Это значит, что волновая функция электрона должна иметь 4 компоненты (это называется биспинор):

Что означают эти 4 компоненты?

В ТАО мы уже знаем ответ: это 4 проекции ленты циркуляции.

Дирак выбрал такие матрицы (в стандартном представлении):

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\gamma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\gamma^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\gamma^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Что здесь важно:

- Это 4×4 таблицы чисел.

- γ_0 отвечает за временную компоненту.

- γ^1, γ^2, γ^3 отвечают за пространственные компоненты x, y, z.

Теперь собираем уравнение Дирака

У нас есть:

- Волновая функция ψ с 4 компонентами.

- Матрицы γ^μ (где $\mu = 0, 1, 2, 3$).

- Правило: $E \to i\hbar\, \partial/t\partial$, $p \to -i\hbar\nabla$.

Дирак записал уравнение в ковариантной форме (красиво и компактно):

$(i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc)\psi = 0$

Расшифровка:

- γ^μ — это матрицы, которые мы выписали выше.

- ∂_μ — это производная по времени и координатам:

$$\partial_0 = \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \quad \partial_1 = \frac{\partial}{\partial x}, \quad \partial_2 = \frac{\partial}{\partial y}, \quad \partial_3 = \frac{\partial}{\partial z}$$

- mc — это масса, умноженная на скорость света.

В развёрнутом виде:

$$i\hbar\gamma^0\frac{1}{c}\frac{\partial\psi}{\partial t} + i\hbar\gamma^1\frac{\partial\psi}{\partial x} + i\hbar\gamma^2\frac{\partial\psi}{\partial y} + i\hbar\gamma^3\frac{\partial\psi}{\partial z} - mc\psi = 0$$

Теперь самое главное: что означает уравнение Дирака с точки зрения ТАО?

В ТАО электрон — это лента циркуляции.

Лента циркуляции имеет 4 независимые проекции на оси решётки. Матрицы Дирака — это операторы перехода между этими проекциями при движении вдоль осей x, y, z и во времени.

Что делает уравнение Дирака?

Оно описывает, как:

- Лента движется в пространстве (γ^1, γ^2, γ^3),

- Лента изменяется во времени (γ^0),

- Масса (mc) связывает проекции.

Что мы получаем из уравнения?

1. **Спин 1/2** — автоматически.
2. **Два решения для каждой энергии** — это два направления спина (вверх и вниз).
3. **Отрицательные энергии** — это античастицы (позитроны). В ТАО это означает, что лента закручена в противоположную сторону.
4. **Zitterbewegung (дрожание)** — микроскопическое колебание электрона даже в покое. В ТАО это результат того, что лента, даже будучи неподвижной в среднем в лаборатории, постоянно движется в ортогональной решётке.

Таблица: от пикселя до уравнения Дирака

Уровень	Сущность	Что это в ТАО
1. Реальность	Пиксельная решётка	3D кубическая решётка из пикселей l_P=1.6×10^{-35} м
2. Паттерн	Лента циркуляции	Замкнутая цепочка активных пикселей с одним полуоборотом

Уровень	Сущность	Что это в ТАО
3. Проекции	4 компоненты биспинора	Два направления движения × две закрутки
4. Операторы	Матрицы Дирака γ^μ	Переключения между проекциями при движении по осям
5. Уравнение	$(i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc)\psi = 0$	Закон эволюции проекций во времени и пространстве

Уравнение Дирака — это не «магия», не «постулат» и не «тайна».

Это релятивистское уравнение для 4-компонентной проекции ленты циркуляции в пиксельной решётке.

- 4 компоненты → 4 способа, как лента может проецироваться.

- Матрицы γ^μ → переключения между этими проекциями.

- Масса m → связь между проекциями через энергию покоя.

- Спин 1/2 → топология ленты.

- Античастицы → лента с противоположной закруткой.

Квантовая механика дала правила вычислений. ТАО дала физический образ. Это топология, записанная на языке математики.

Глава 4. Квантовая электродинамика (КЭД).

Часть 1. Краткое напоминание:

Что	В стандартной физике	В ТАО (реальность)
Пространство	Пустой континуум	Трёхмерная кубическая пиксельная решётка (шаг l_P=1.6×10^{-35} м)
Вакуум	Ничто	Море нулевых пикселей (состояние «0») с энергией ε_0
Материя	Частицы и поля	Активные пиксели (состояние «1»), образующие паттерны
Электрон	Точечная частица с зарядом и спином	Лента циркуляции — замкнутая цепочка активных пикселей
Фотон	Квант электромагнитного поля	Разомкнутая цепочка активных пикселей (без замыкания, без массы)
Заряд	Фундаментальное свойство	Поток активных пикселей через поперечное сечение ленты
Гравитация	Искривление 4D-пространства	Деформация пиксельной решётки (градиент сжатия)
Время	Четвёртое измерение	Частота обновления пикселей (такт t_P)

Часть 2. Что такое КЭД и зачем она нужна

КЭД (Квантовая Электродинамика) — это калибровочная теория. Она математически точна. Но она не даёт онтологии: не объясняет, что такое электрон, фотон, заряд, α. Она описывает, как электроны и фотоны общаются друг с другом.

В ТАО это звучит так:

Электрон — это замкнутая лента. **Фотон** — это разомкнутая цепочка пикселей. Когда лента и цепочка встречаются, они могут соединиться в одной точке, а затем разъединиться. Этот акт соединения-разъединения и есть взаимодействие.

Зачем нужна КЭД?

- Чтобы вычислять вероятности рассеяния электронов.

- Чтобы вычислять время жизни нестабильных частиц.

- Чтобы предсказывать результаты экспериментов с точностью до 12 знаков.

Но КЭД не объясняет, почему электрон — это замкнутая лента циркуляции, почему фотон — это разомкнутая цепочка, почему $\alpha \approx 1/137$. Она просто считает.

Часть 3. Историческая справка: как появилась КЭД

1. 1928 год: Дирак и уравнение электрона

Дирак написал уравнение для свободного электрона (мы его рассмотрели). Оно работало, но только для одинокого электрона, который ни с кем не взаимодействует.

Но в реальности электроны постоянно взаимодействуют.

2. 1930-е годы: рождение КЭД

Физики поняли: чтобы описать взаимодействие, нужно добавить в уравнение Дирака член, отвечающий за связь электрона с фотоном.

Как это сделали?

В квантовой механике есть принцип: заменить обычную производную на ковариантную:

$$\partial_\mu \to D_\mu = \partial_\mu + i\frac{e}{\hbar c}A_\mu$$

Что это значит на языке ТАО?

Обычная производная ∂_μ описывает, как лента движется в пустоте. Ковариантная производная D_μ описывает, как лента движется в присутствии фотонов. Член $i(e/\hbar c)A_\mu$ — это «крючок», которым лента цепляется за фотонную цепочку.

3. 1948 год: Фейнман и диаграммы

Фейнман придумал гениальный способ визуализации всех этих процессов. Он сказал:

«Давайте рисовать картинки. На каждой картинке электроны — это сплошные линии, фотоны — волнистые, а точки соединения — это взаимодействия. Каждая картинка — это одно слагаемое в математической формуле. Чтобы получить ответ, нужно нарисовать все возможные картинки и сложить их».

В ТАО эти картинки —это карты переключений пикселей.

Часть 4. Основные понятия КЭД (на языке ТАО)

4.1. Лагранжиан — «рецепт» взаимодействия

Что такое лагранжиан в обычной жизни?

Представим, что мы печём пирог. Рецепт — это список ингредиентов и инструкций. Лагранжиан — это рецепт физической системы. Он говорит: «Вот какие у нас есть частицы, вот как они движутся, вот как они взаимодействуют».

Лагранжиан КЭД выглядит так:

$$\mathcal{L}_{KED} = \bar{\psi}(i\hbar c\gamma^\mu D_\mu - mc^2)\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

В ТАО это читается так:

Часть	Что это в ТАО
$\bar{\psi}\psi$	**Электрон.** Лента циркуляции.
$\gamma^\mu D_\mu$	**Движение.** Как лента переключается между проекциями при движении в пространстве-времени.
mc^2	Масса. Энергия, запертая в замкнутой ленте.
$-1/4 F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$	Фотон. Разомкнутая цепочка пикселей.
$i(e/\hbar c)A_\mu$	Взаимодействие. Крючок, которым лента цепляется за цепочку.

4.2. Пропагатор — «движение между точками»

Что такое пропагатор в обычной жизни?

Представь, что ты едешь из Москвы во Владивосток. Твой путь — это пропагатор. Он показывает, как ты движешься от точки А (испускание) к точке Б (поглощение).

Пропагатор электрона:

$$\frac{i(\gamma^\mu p_\mu + m)}{p^2 - m^2c^2}$$

В ТАО: это правило, которое говорит, как лента движется между двумя взаимодействиями. Она может идти прямо, может немного вилять — всё это учтено в формуле.

Пропагатор фотона:

$$\frac{-ig_{\mu\nu}}{k^2}$$

В ТАО: это правило, как разомкнутая цепочка пикселей (фотон) движется между двумя точками.

4.3. Вершина — «точка соединения»

Что такое вершина в обычной жизни?

Это место, где происходит событие. Например, перекрёсток, где две дороги встречаются.

Вершина КЭД:

$$-ie\gamma^{\mu}$$

В ТАО: это точка, где лента (электрон) и разомкнутая цепочка (фотон) соединяются и разъединяются. В этой точке лента размыкается, выпускает короткую цепочку, а затем снова замыкается.

Часть 5. Диаграммы Фейнмана — «карты переключений»

5.1. Как выглядят диаграммы

Диаграмма Фейнмана — это рисунок, на котором:

- Сплошные линии — электроны (ленты).

- Волнистые линии — фотоны (разомкнутые цепочки).

- Точки соединения — взаимодействия (вершины).

Пример: два электрона отталкиваются



5.2. Что происходит в ТАО

1. Первая лента (электрон) в точке А размыкается и испускает короткую цепочку (фотон).
2. Эта цепочка летит ко второй ленте.
3. Вторая лента в точке Б поглощает эту цепочку и замыкается обратно.
4. В результате ленты отталкиваются.

5.3. Как считаются диаграммы

Шаг	**Что делаем**	**Что получаем**
1	Рисуем диаграмму	Карта переключений
2	Применяем правила Фейнмана	Амплитуда M
3	Возводим в квадрат	Вероятность $\|M\|^2$
4	Интегрируем по фазовому объёму	Сечение σ или скорость распада Г
5	Сравниваем с экспериментом	Проверяем теорию

Часть 6. Что дают диаграммы Фейнмана

Величина	**Что вычисляется**	**Куда идёт**	**Пример**
Сечение σ	Эффективная площадь взаимодействия	Сравнение с экспериментом	Рассеяние электронов

Величина	Что вычисляется	Куда идёт	Пример
Время жизни τ	Среднее время до распада	Сравнение с экспериментом	Распад мюона
Ширина Г	Скорость распада	Используется $\tau = 1/\Gamma$	Распад пи-мезона
Аномальный момент $g-2$	Отклонение от классического	Сравнение с экспериментом	Электрон, мюон
Лэмбовский сдвиг	Смещение уровней	Сравнение с экспериментом	Атом водорода

Часть 7. Как это выглядит в ТАО

7.1. Сечение рассеяния — это «площадь взаимодействия паттернов»

В ТАО два электрона — это две ленты. Когда они сближаются, их ленты могут переплестись. Сечение — это эффективная площадь, в которой переплетение вероятно.

Формула в ТАО (качественно):

$$\sigma \propto \frac{\alpha^2}{E^2} \cdot (\text{геометрический фактор перекрытия лент})$$

7.2. Время жизни — это «среднее время до топологического переключения»

В ТАО распад частицы — это переключение топологии. Например, нейтрон — это тройной узел с дополнительной петлёй. Когда петля разрывается, нейтрон превращается в протон + электрон + антинейтрино.

Время жизни — это среднее время, за которое произойдёт это переключение.

7.3. Аномальный магнитный момент — это «дрожание ленты»

В ТАО электрон не точечный. Его лента постоянно «дрожит» (Zitterbewegung), мы это рассматривали в Главе Электрон. Это дрожание создаёт дополнительный вклад в магнитный момент. Диаграммы Фейнмана с петлями — это учёт этого дрожания.

7.4. Лэмбовский сдвиг — это «деформация решётки вокруг ленты»

В ТАО вакуум — это море нулевых пикселей. Когда электрон движется, он деформирует решётку вокруг себя. Эта деформация влияет на его энергию. Диаграммы с петлями — это учёт того, как лента «чувствует» деформацию.

Часть 8. Где в КЭД прячутся Кулон и Максвелл

8.1. Закон Кулона

Не написан. Он выводится из диаграммы обмена фотоном в пределе малых скоростей.

$$\mathcal{M} \propto \frac{e^2}{k^2} \to V(r) \propto \frac{e^2}{r}$$

8.2. Уравнения Максвелла

Не написаны. Они **выводятся** из фотонного лагранжиана $-1/4 F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ через вариационный принцип:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \frac{4\pi}{c} j^\nu$$

Часть 8. Где КЭД ломается и как ТАО «чинит»

8.1. Проблема 1: Расходимости (бесконечности)

В КЭД: интегралы уходят в бесконечность. Лечат перенормировкой.

В ТАО: пространство дискретно. Есть минимальный размер l_P. Интегралы обрезаются естественно.

8.2. Проблема 2: Почему $\alpha = 1/137$?

В КЭД: подгоночный параметр.

В ТАО: выводное число:

$\alpha = (\varepsilon_0/\varepsilon_1)^{1/36}$

8.3. Проблема 3: Гравитация не включена

В КЭД: нет гравитации.

В ТАО: гравитация — это деформация той же решётки. Объединение естественно.

КЭД — это калибровочная модель, которая считает вероятности взаимодействия электронов и фотонов. Она не знает, что такое электрон, фотон, заряд или α. Она просто даёт числа. ТАО — это онтология, которая объясняет, что электрон — это лента циркуляции, фотон — это разомкнутая цепочка, α выводится из энергий пикселей, а гравитация — это деформация той же решётки.

КЭД — это калькулятор.

ТАО — это физика того, что калькулятор считает.

Глава 5. Квантовая хромодинамика.

Часть 1. КХД (Квантовая Хромодинамика) — это теория сильного взаимодействия. Она описывает, как кварки удерживаются внутри протонов и нейтронов.

В ТАО всё это — топология лент циркуляции в трёхмерной решётке**.**

Часть 2. Происхождение «цвета» в ТАО

В трёхмерной пиксельной решётке есть три независимые оси: X, Y, Z.

Кварк — это лента циркуляции (замкнутая цепочка с нечётным количеством полуоборотов), которая может
быть ориентирована вдоль одной из этих осей.

Ориентация ленты	**Условный «цвет»**
Вдоль оси X	**Красный**
Вдоль оси Y	**Зелёный**
Вдоль оси Z	**Синий**

Антикварк — та же ориентация, но с противоположным направлением обхода (зеркальное отражение).

Почему три цвета? Потому что пространство трёхмерно. Больше нет независимых осей. Поэтому группа симметрии — $SU(3)$ (матрицы 3×3, смешивающие три цвета).

Часть 3. Глюон — переключатель цвета

Глюон в ТАО — это не частица. Это событие переключения ориентации ленты.

Как это работает:

1. **Исходное состояние:** Кварк A имеет ориентацию X («красный»).
2. **Событие:** Лента кварка A начинает поворачиваться.
3. **Передача:** Поворот передаётся на соседние ленты через связи (глюонную струну).
4. **Конечное состояние:** Кварк A имеет ориентацию Y («зелёный»).

Глюон — это сам поворот, а не отдельная сущность.

Сколько глюонов?

Из 3 цветов и 3 антицветов можно составить 9 пар. Одна из них — бесцветная (суперпозиция $r\bar{r}+g\bar{g}+b\bar{b}$) — соответствует фотону (переносчику электромагнетизма). Остальные 8 — глюоны.

Это и есть число 8 — количество глюонов в КХД.

Часть 4. В ТАО нет дробных зарядов

В ТАО заряд — это поток активных пикселей через поперечное сечение ленты за один такт времени.

Частица	**Структура**	**Поток пикселей**	**Заряд (в *e*)**
Электрон	Одна лента Мёбиуса	1 пиксель/такт	−1
Протон	Узел из трёх лент (u, u, d)	Суммарный поток = 1 пиксель/такт	+1
Нейтрон	Узел из трёх лент + нейтрализующая петля	Скомпенсированный поток = 0	0

Частица	Структура	Поток пикселей	Заряд (в e)
Кварк (отдельно)	Не существует свободно	Не определён	Не наблюдаем

Кварки не имеют дробного заряда. Дробные заряды — это математическая подгонка стандартной модели, введённая для того, чтобы сумма зарядов кварков давала заряд протона и нейтрона. Никакого экспериментального наблюдения дробного заряда у свободного кварка никогда не было.

Часть 5. Конфайнмент — почему нет одиночных кварков

В ТАО конфайнмент — это гравитационный плен.

Три ленты (кварки) переплетены в узел (протон). Этот узел создаёт колоссальную концентрацию активных пикселей в малом объёме:

$\rho_{\text{протон}} \sim 10^{71}$ м$^{-3}$

Это создаёт глубокую гравитационную яму. Чтобы вытащить одну ленту, нужно преодолеть эту яму.

Что происходит при попытке вырвать кварк?

1. Мы начинаем растягивать ленту.
2. Энергия накапливается в растянутых участках ленты.
3. Когда энергия достигает порога (~0.3 ГэВ), происходит переключение пикселей.
4. В точке разрыва рождается новая пара кварк-антикварк.
5. Вырвавшийся кварк + антикварк = мезон.

Одиночный кварк никогда не вылетает.

Часть 6. Асимптотическая свобода

В стандартной физике: при малых расстояниях кварки почти свободны.

В ТАО: три кварка образуют общую, сверхплотную область сжатия. Деформация (сжатие) максимальна, но градиент (перепад) мал. Если градиент мал, то сила, действующая на кварки, мала. Они могут двигаться внутри этой «плоской» зоны почти беспрепятственно.

Аналогия: вы на дне глубокой чаши. Если вся чаша имеет одинаковую глубину (плоское дно), вы не «скатываетесь» никуда, даже если находитесь очень глубоко.

Часть 7. Электрослабое взаимодействие в ТАО

7.1. В ТАО слабое взаимодействие — это не сила, а процесс перенастройки анизотропных деформаций.

Нейтрон — это протон + нейтрализующая петля (лента циркуляции электрона, но в противоположном направлении).

Распад нейтрона:

1. Петля «расстёгивается» — последовательный разрыв 10^{23} связей (пикселей).
2. В конце — выстрел электрона с пиковой силой.
3. Нейтрон превращается в протон.

Это не обмен W-бозонами. Это топологическое переключение.

7.2. W и Z бозоны в ТАО — резонансы решётки

В стандартной физике: W и Z бозоны — массивные частицы-переносчики слабого взаимодействия.

В ТАО: W и Z бозоны — это резонансные моды колебаний пиксельной решётки. Они не являются отдельными «объектами». Это волны деформации решётки с определённой частотой и энергией.

Что это значит:

- Фотон — разомкнутая цепочка пикселей (безмассовая мода решётки).

- Глюон — событие переключения ориентации ленты (мода переключения).

- W и Z — резонансные моды колебаний решётки, возникающие при перенастройке анизотропных деформаций (например, при распаде нейтрона).

Почему W и Z «массивны»?

Их «масса» — это энергия резонанса, а не масса покоя в обычном смысле. Резонансная частота решётки определяет энергию, которая воспринимается как масса.

7.3. Почему слабое взаимодействие короткодействующее?

Резонансные моды решётки имеют высокую энергию. Высокая энергия → короткая длина волны → малое расстояние действия ($\sim 10^{-18}$ м).

7.4. Почему слабое взаимодействие взаимодействует только с левыми частицами

В ТАО: левые частицы — это ленты, закрученные в одну сторону (например, по часовой стрелке при движении вперёд). Правые — в другую.

Резонансные моды решётки (W и Z) могут «зацепиться» только за ту часть ленты, которая закручена в определённую сторону.
Это топологическое свойство, а не фундаментальный закон.

Часть 8. Сравнительная таблица: КЭД, КХД, электрослабое

Теория	**Что в ТАО**	**Что в стандартной физике**
КЭД	Лента (электрон) ↔ разомкнутая цепочка (фотон)	Электрон ↔ фотон
КХД	Три ориентации ленты (цвета) ↔ переключатели ориентации (глюоны)	Кварки ↔ глюоны

Теория	Что в ТАО	Что в стандартной физике
Электрослабое	Нейтрализующая петля (нейтрон) ↔ резонансные моды решётки (W, Z)	Нейтрон ↔ W, Z бозоны
Гравитация	Деформация пиксельной решётки	Искривление пространства-времени

КХД и электрослабое взаимодействие в ТАО — это не «силы» и не «поля». Это топологические переключения лент в пиксельной решётке.

КХД — это переключение ориентации лент между осями X, Y, Z (цвета). Глюоны — это сами переключения.

Электрослабое — это разрыв и перезамыкание нейтрализующей петли (нейтрон → протон + электрон + антинейтрино). W и Z — это резонансные моды колебаний решётки, возникающие при этом процессе.

Всё это — одна физика переключений, записанная на языке математики. Стандартная модель — это методы для расчёта этих переключений. ТАО — это онтология того, что переключается.

Глава 6. Квантовая запутанность. От парадокса к онтологии.

Часть 1. Предисловие: две монеты, которые всегда показывают одно и то же

Представим, что у нас есть две монеты.

Мы бросаем их, и они падают:

- Если одна показывает «орёл», другая всегда показывает «решку».

- Если одна показывает «решку», другая всегда показывает «орла».

- Это происходит всегда, даже если монеты находятся на расстоянии миллиона световых лет друг от друга.

В обычной жизни такого быть не может. Если ты разнёс две монеты на миллион световых лет, они не могут «знать», что показала другая. Они не могут обменяться сигналом быстрее света.

Но в квантовом мире это происходит постоянно.

Запутанные частицы — это две частицы, которые ведут себя как одна система. Они могут быть разнесены на любые расстояния, но их состояния всегда коррелированы.

Часть 2. Исторический контекст: как открыли запутанность

2.1. 1935 год: ЭПР-парадокс (Эйнштейн, Подольский, Розен)

Эйнштейн, Подольский и Розен придумали мысленный эксперимент, который должен был показать, что квантовая механика неполна.

Они сказали:

1. Есть две частицы, которые родились вместе и разлетелись.
2. Их импульсы и координаты связаны (суммарный импульс = 0).

3. Если мы измерим импульс одной частицы, мы мгновенно узнаем импульс другой, даже если они далеко.
4. Это означает, что у частиц есть скрытые переменные — они «знают» свой импульс с самого начала.

Вывод Эйнштейна: квантовая механика неполна. Есть что-то, чего мы не знаем.

2.2. 1964 год: Теорема Белла

Джон Белл придумал математическое неравенство.

- Если у частиц есть локальные скрытые переменные (как у перчаток Эйнштейна), то это неравенство должно выполняться.

- Если скрытых переменных нет — неравенство нарушается.

Эксперименты показали: неравенство Белла нарушается. Значит, у частиц нет локальных скрытых переменных. Они действительно «связаны» на расстоянии.

2.3. 1982 год: Эксперимент Аспекта

Ален Аспект провёл эксперимент, где запутанные фотоны разлетались в разные стороны, и их поляризация измерялась одновременно.

Результат: корреляция мгновенная. Она не может быть объяснена сигналом, идущим со скоростью света.

2.4. 2010-е годы: Эксперименты Цайлингера

Антон Цайлингер разнёс запутанные фотоны на сотни километров (используя оптоволокно и спутники). Корреляция сохранялась.

Поэтому запутанность реальна. Она не зависит от расстояния.

Часть 3. Что говорит стандартная физика (и чего она не объясняет)

Вопрос	Ответ КМ	Что не объяснено
Что такое запутанность?	Свойство волновой функции	Почему она возникает?
Как частицы «знают» состояние друг друга?	Не знают. Это корреляция	Как они коррелируют мгновенно?
Что является носителем запутанности?	Волновая функция	Где она «живёт»?
Почему нельзя передать информацию?	Потому что результат случаен	Почему он случаен?
Что происходит при измерении?	Коллапс волновой функции	Что коллапсирует?

КМ даёт правила, но не даёт физической картины. Это как инструкция по эксплуатации прибора, но без схемы устройства.

Часть 4. Что говорит ТАО

4.1. Две ленты циркляции.

В ТАО запутанность — это топологическая связь между двумя лентами.

Что это значит:

1. Две частицы родились как единая лента.
2. Лента — это один топологический объект.
3. Когда мы «разрываем» ленту в середине, мы получаем две отдельные ленты.

4. Но они всё равно остаются одной записью в Внешнем Алгоритме.

4.2. Внешний Алгоритм как носитель запутанности

В стандартной физике: запутанность — это свойство волновой функции. Носителя нет.

В ТАО: запутанность — это общая запись в Внешнем Алгоритме.

Что это значит:

- Алгоритм «хранит» состояние всей системы целиком.

- Когда мы измеряем одну частицу, мы просто читаем эту запись.

- Алгоритм мгновенно обновляет состояние, потому что это одна запись, а не две отдельные.

Пример с файлом:

Представим, что у нас есть файл с двумя переменными:

particle_A = spin_up

particle_B = spin_down

Мы копируем этот файл на два разных компьютера, разнесённых на миллион световых лет. Когда ты меняешь значение particle_A на spin_down, ты обновляешь файл. На втором компьютере файл обновляется мгновенно, потому что это один и тот же файл в облаке.

В ТАО:

- «Облако» — это Внешний Алгоритм.

- «Файл» — это восьмёрка (топологическая структура).

- «Обновление» — это переключение состояния.

- «Расстояние» не имеет значения, потому что файл один.

4.3. Почему это не передаёт информацию

Мы не можем использовать запутанность для передачи информации, потому что:

1. Мы не можем **контролируемо** изменить состояние одной частицы. Результат измерения случаен (50/50).
2. Чтобы передать информацию, мы должны **заставить** частицу быть «вверх» или «вниз».
3. Но мы не можем этого сделать — мы можем только **узнать** результат.
4. На втором конце корреляция есть, но она выглядит как случайность, пока мы не сравним результаты по обычному каналу.

Запутанность даёт мгновенную корреляцию, но не даёт управляемой связи.

Часть 5. Пример с сохранением момента импульса

5.1. Мысленный эксперимент

Представим, что у нас есть две запутанные частицы с суммарным спином 0 (синглетное состояние). Это значит, если одна частица имеет спин «вверх», другая обязательно имеет спин «вниз».

Закон сохранения момента импульса требует, чтобы суммарный спин оставался равным 0.

Вопрос: как частицы «знают», какой спин у другой, если они разнесены на миллион световых лет?

5.2. Ответ ТАО

Они не «знают». Они — одна запись в Алгоритме. Когда мы измеряем одну частицу, мы просто читаем эту запись. Алгоритм мгновенно обновляет состояние, потому что это одна запись, а не две отдельные.

Сравнение:

Что нужно для объяснения	Физический уровень	Программный уровень (Алгоритм)
Мгновенная корреляция	Невозможно (нарушает причинность)	Возможно (общая запись)
Сохранение момента импульса	Требует сигнала	Обеспечено Алгоритмом
Независимость от расстояния	Невозможно	Естественно (топология)

Без Внешнего Алгоритма запутанность невозможно объяснить. С ним — объясняется идеально.

Часть 6. Применение запутанности: кубиты и квантовый радар

6.1. Кубиты — запутанные ленты в решётке.

Кубит — это квантовый бит. В отличие от классического бита (0 или 1), кубит может находиться в суперпозиции: одновременно 0 и 1 (мерцать).

В ТАО кубит — это виртуальный фотон (виртон), который мерцает между 0 и 1 с высокой частотой. Когда два кубита запутаны, их состояния жёстко связаны.

Что это даёт:

- Квантовый компьютер может обрабатывать все возможные состояния одновременно.

- Это даёт экспоненциальное ускорение для некоторых задач (факторизация, поиск, моделирование).

6.2. Квантовый радар

Квантовый радар использует запутанные фотоны для обнаружения объектов.

Как это работает:

1. Генерируется пара запутанных фотонов.
2. Один фотон отправляется к цели.
3. Второй фотон остаётся на станции.
4. Когда первый фотон отражается от цели, его состояние меняется.
5. Это изменение мгновенно отражается на втором фотоне (через запутанность).
6. По изменению состояния второго фотона определяют наличие цели.

Преимущество:

- Квантовый радар может обнаруживать объекты, которые «глушат» обычные радары.

- Он устойчив к помехам, потому что запутанность — это не сигнал, а корреляция.

В ТАО: квантовый радар — это использование топологической связи между замкнутыми лентами циркуляции (частицами). Изменение состояния одной ленты мгновенно отражается на другой, потому что это одна запись в Алгоритме.

Глава 7. Двухщелевой опыт. От квантового парадокса к геометрии пиксельной решётки

Часть 1. Предисловие: эксперимент, который «ломает» реальность

Двухщелевой опыт — это самый знаменитый, самый обсуждаемый и самый «странный» эксперимент в квантовой механике. Его называют «сердцем квантовой механики», «экспериментом, который нельзя понять», «доказательством того, что реальность зависит от наблюдения».

Но в ТАО всё становится простым и понятным.

Это не «волна вероятности». Это **геометрия взаимодействия паттерна с пиксельной решёткой**.

Часть 2. Что такое электрон в ТАО (напоминание)

Прежде чем разбирать эксперимент, вспомним: электрон — это не точка.

В ТАО электрон — это замкнутая лента циркуляции. Её точные параметры:

1. Длина всей ленты (кольца): $L_e = 4\lambda_C$, где $\lambda_C = 2.426\times10^{-12}$ м — комптоновская длина волны электрона.

То есть полная длина замкнутой ленты равна четырём комптоновским длинам.

2. Характерный размер (диаметр кольца в проекции): приблизительно $2\lambda_C/\pi$, но для взаимодействия со щелью критична сама лента, а не её проекция.

Почему это важно: когда мы говорим о том, «пройдёт ли электрон через щель», мы должны сравнивать щель не с «размером частицы» как шарика, а с реальной протяжённостью ленты в пространстве.

В первом приближении характерная длина электрона, определяющая его взаимодействие с препятствиями, равна $2\lambda_C$ (половина длины ленты, так как лента сложена в восьмёрку и её «эффективный» размер вдвое меньше полной длины).

Электрон — это не шарик. Это структура с протяжённостью $\sim 2\lambda C$, свёрнутая в кольцо длиной $4\lambda_C$.

Часть 3. Что происходит, когда электрон подлетает к одной щели

3.1. Широкая щель ($d \gg 2\lambda_C$)

Что происходит:

- Щель значительно больше эффективного размера электрона.
- Электрон пролетает свободно, не касаясь краёв.
- Его лента не деформируется.
- На экране — одна чёткая полоска (как от классической частицы).

Это похоже на шарик, который пролетает через широкое отверстие.

3.2. Узкая щель ($d \sim 2\lambda_C$)

Что происходит:

- Щель сравнима с эффективным размером ленты.
- Электрон не может пролететь прямо — он цепляется за края щели.
- Его лента деформируется (изгибается).
- Электрон рассеивается — меняет направление.
- На экране — размытая полоска (дифракция).

Это, как если бы ты попытался просунуть длинную верёвку (длиной $4\lambda_C$, сложенную вдвое) через узкое отверстие — она изогнётся и пойдёт в сторону.

3.3. Щель меньше эффективного размера ($d < 2\lambda_C$)

Что происходит:

- Щель меньше эффективного размера ленты.

- Электрон не может пройти.

- Это как если бы ты пытался просунуть сложенную верёвку в щель, которая меньше её толщины.

Часть 4. Две щели: от двух полосок к интерференции

4.1. Щели далеко друг от друга ($d \gg 2\lambda_C$)

Что происходит:

- Расстояние между щелями значительно больше эффективного размера электрона.

- Электроны проходят через каждую щель независимо.

- На экране — две чёткие полоски.

- Это как если бы через две далёкие дырки пролетали два независимых потока.

4.2. Щели близко ($d \sim 2\lambda_C$)

Что происходит:

- Расстояние между щелями сравнимо с эффективным размером электрона.

- Электроны стукаются о края обеих щелей.

- Они рассеиваются и летят под разными углами.

- Их траектории (синусоиды де Бройля) пересекаются.

- Пересечение даёт интерференционную картину:

    - Где фазы совпадают — яркая полоса.

    - Где фазы противоположны — тёмная полоса.

4.3. Почему это происходит (механизм)

В ТАО интерференция — это не «волна вероятности». Это сложение цепочек пикселей.

1. Каждый электрон — это замкнутая лента длиной $4\lambda_C$, которая движется по синусоидальной траектории (волна де Бройля).
2. Когда электрон проходит через узкую щель, его лента изгибается.
3. Изгиб создаёт сдвиг фазы.
4. Два электрона, прошедшие через разные щели, имеют разный сдвиг фазы.
5. На экране их ленты складываются:

    - В одних местах — усиление (яркая полоса).

    - В других — гашение (тёмная полоса).

Это как две волны на воде, которые накладываются друг на друга.

Часть 5. Почему при широких щелях интерференция не видна

Что происходит:

- При широкой щели большинство электронов проходят прямо.

- Только малая часть «стукается» о края.

- Их вклад в картину — слабый фон.

- Интерференция есть, но она смазана и не видна на фоне основного потока.

Аналогия: если в толпе 1000 человек идут прямо, а 10 человек идут зигзагом — зигзаги не будут заметны.

Часть 6. Почему детектор у щели убивает интерференцию

Что происходит:

- Детектор — это макроприбор, который взаимодействует с электроном.

- Это взаимодействие фиксирует ленту в одном состоянии.

- Электроны перестают хаотично разлетаться, стукаясь о края щели.

- Поток выпрямляется.

- Интерференция исчезает.

Часть 7. Численные значения

Для электрона:

- Комптоновская длина: $\lambda_C = 2.426\times10^{-12}$ м

- Длина всей ленты (кольца): $L_e = 4\lambda_C$, где $\lambda_C = 2.426\times10^{-12}$ м

- Эффективный размер (характерная длина):

$$\sim 2\lambda C = 4.852\times10^{-12} \text{ м}$$

Критическое расстояние между щелями: $d \sim 2\lambda_C \approx 4.85\times10^{-12}$ м

При этом длина волны де Бройля для электрона с энергией 1 эВ:

$$\lambda = \frac{h}{mv} \approx 1.2 \times 10^{-9} \text{ м}$$

Это в 500 раз больше комптоновской длины. Поэтому критическое расстояние в реальных экспериментах определяется волной де Бройля, а не комптоновской длиной. Но механизм один и тот же — взаимодействие ленты с краями щели.

Часть 8. Фотон в двухщелевом опыте (опыт Юнга)

Фотон — это разомкнутая цепочка активных пикселей. У него нет замкнутой петли, поэтому у него нет массы и нет комптоновской длины. У него есть только **длина волны** λ.

8.1. Широкая щель ($d \gg \lambda$)

- Фотон пролетает свободно.

- На экране — одна полоска.

8.2. Узкая щель ($d \sim \lambda$)

- Фотон «цепляется» за края.

- Цепочка деформируется.

- Фотон рассеивается.

- На экране — размытая полоска.

8.3. Щель меньше длины волны ($d < \lambda$)

- Фотон не может пройти.

- Как волна, которая не проходит через щель меньше своей длины.

8.4. Две близкие щели ($d \sim \lambda$)

- Фотоны рассеиваются и летят под разными углами.

- Их цепочки пересекаются.

- Пересечение даёт интерференционную картину.

8.5. Детектор у щели

- Детектор фиксирует цепочку.

- Она выпрямляется.

- Интерференция исчезает.

Двухщелевой опыт — это не доказательство «волны вероятности». Это демонстрация того, что электрон — это не точка. Электрон — это замкнутая лента длиной $4\lambda_C$, с эффективным размером $\sim 2\lambda_C$.

Когда щель больше $2\lambda_C$ — лента проходит свободно. Когда щель сравнима с $2\lambda_C$ — лента деформируется и рассеивается. Когда две щели близко — рассеянные ленты пересекаются и дают интерференцию.

Детектор у щели фиксирует ленту, она выпрямляется, и интерференция исчезает.

Это не «квантовая магия». Это геометрия взаимодействия ленты с пиксельной решёткой.

Часть 12. Что бы сказал Фейнман?

Ричард Фейнман, один из создателей КЭД, говорил:

«Двухщелевой опыт содержит в себе всю квантовую механику. В нём есть всё, что нужно понять».

Он был прав, но не знал, что именно «всё» — это геометрия ленты циркуляции в пиксельной решётке.

Если бы Фейнман знал ТАО, он бы сказал:

«Двухщелевой опыт — это не парадокс. Это демонстрация того, что электрон — это не точка. Он имеет структуру — ленту длиной $4\lambda_C$. Интерференция возникает, когда эта лента взаимодействует с краями щелей. Всё остальное — математика проекций».

Глава 8. Принцип неопределённости в ТАО.

Часть 1. Предисловие: что такое принцип неопределённости на самом деле

В 1927 году Вернер Гейзенберг сформулировал принцип, который стал символом квантовой механики:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

Что это значит в стандартной физике:

- Нельзя одновременно точно знать положение и импульс частицы.
- Это не техническое ограничение (не «плохой прибор»).
- Это фундаментальное свойство природы.
- Частица не имеет одновременно точного положения и импульса.
- Она существует как «волна вероятности», и только при измерении «коллапсирует» в частицу.

Проблема:

В КМ это постулат. Никто не знает, почему это так. Гейзенберг дал формулу, но не дал физического механизма.

В ТАО это не постулат. Это вывод из геометрии пиксельной решётки и топологии паттернов.

Часть 2. Что такое постоянная Планка *h* в ТАО

2.1. *h* — это момент импульса одного периода фотона

В ТАО мы уже установили (в главе «Фотон»):

«Постоянная Планка *h* — это момент импульса одного полного витка (периода) спиральной цепочки активных пикселей, из которой состоит фотон».

Что это значит:

- Фотон — это разомкнутая спираль (цепочка активных пикселей).
- У неё есть период — один виток спирали.
- Момент импульса этого витка равен h.
- Если мы смотрим на часть этого витка (на 1 радиан), мы видим $\hbar = h/2\pi$.

Это не абстрактный «квант действия». Это реальный момент импульса вращающейся цепочки пикселей.

2.2. *ħ* — момент на 1 радиан

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

В ТАО: это момент импульса одного радиана поворота фазы волны.

Физический смысл: фотон делает один полный оборот (2π радиан) за время одного периода. Момент этого полного оборота — h. Момент на 1 радиан — $\hbar$.

Часть 3. Связь *h* с лентой электрона.

Почему *ħ*/2, а не *ħ*

- Для фотона (разомкнутая цепочка): полный оборот = 2π, момент = h, на 1 радиан = $\hbar$.
- Для электрона: минимальный квант действия для одного потока = $\hbar/2$, из сохраниения момента импульса порогового фотона.

То есть *ħ*/2 — это квант действия для одного радиана ленты электрона.

Часть 4. Что такое положение и импульс в ТАО

4.1. Положение (x) — адрес пикселя

В КМ: положение — это координата частицы в пространстве.

В ТАО: положение — это адрес пикселя в решётке, в котором находится «центр» паттерна.

Важно: паттерн — это не точка, а цепочка активных пикселей. Его «положение» — это локализация этой цепочки в решётке.

4.2. Импульс (p) — поток пикселей

В КМ: импульс — это $p = mv$.

В ТАО: импульс — это направление и частота переключения активных пикселей в паттерне.

- Он показывает, как быстро и в каком направлении паттерн «перемещается» по решётке.
- Это поток активных пикселей через поперечное сечение паттерна за единицу времени.

Часть 5. Почему нельзя знать одновременно

5.1. Паттерн — не точка

Электрон — это лента (замкнутая цепочка активных пикселей).

- У неё есть протяжённость (размер).
- Она занимает множество пикселей.
- Она имеет направление циркуляции (спин).

Ключевой момент: если паттерн занимает много пикселей, его нельзя «сжать» в одну точку. А если его сжать в одну точку, он перестаёт быть паттерном.

5.2. Две противоположные возможности

Чтобы точно измерить положение	Чтобы точно измерить импульс
Нужно, чтобы паттерн был точечным (занимал один пиксель)	Нужно, чтобы паттерн был длинным (много пикселей)
Но тогда у него нет длины для циркуляции	Но тогда его положение «размазано» по решётке
→ импульс не определён	→ неопределённость положения растёт

Это не магия. Это геометрия.

5.3. Аналогия с верёвкой

Представим, что мы пытаемся измерить длину и частоту колебания верёвки:

- Чтобы точно измерить длину, нужно, чтобы верёвка была натянута (одна точка).
- Но тогда она не колеблется → нет частоты.
- Чтобы точно измерить частоту, нужно, чтобы верёвка колебалась (много точек).
- Но тогда её длина размыта.

То же самое с паттерном:

- Чтобы измерить положение, нужно «сжать» паттерн.
- Чтобы измерить импульс, нужно «растянуть» паттерн.

Часть 6. Связь с принципом неопределённости

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$$

В ТАО это читается так:

- Δx — размер паттерна (ленты циркуляции).

- Δp — изменение потока пикселей.

- $\hbar/2$ — минимальный квант действия для одного радиана ленты.

Это не постулат. Это геометрия.

Часть 8. Что это значит для принципа неопределённости

В КМ: $\hbar/2$ — это просто число в формуле.

В ТАО: $\hbar/2$ — это **физическая величина**: минимальный квант действия для одного радиана ленты.

Принцип неопределённости в ТАО звучит так:

«Невозможно одновременно точно измерить положение и импульс частицы, потому что частица — это не точка. Это паттерн с протяжённостью. Чтобы измерить положение, нужно «сжать» паттерн. Но тогда его внутренняя циркуляция (импульс) становится неопределённой. Чтобы измерить импульс, нужно «растянуть» паттерн. Но тогда его положение становится неопределённым. Минимальное произведение этих неопределённостей равно половине кванта действия для одного потока ленты — $\hbar/2$.

Часть 10. Что бы сказал Гейзенберг?

Гейзенберг говорил:

«Принцип неопределённости — это не техническое ограничение. Это фундаментальное свойство природы».

Он был прав в том, что это не техническое ограничение. Но он ошибался в том, что это «фундаментальное свойство» природы.

В ТАО это — свойство решётки и топологии паттернов. Дискретность пространства и лента делают невозможным одновременное точное измерение положения и импульса.

Если бы Гейзенберг знал ТАО, он бы сказал:

«Я нашёл формулу, но не знал, что за ней стоит. Теперь я вижу: это геометрия пиксельной решётки и ленты циркуляции. ħ/2 — это момент импульса одного радиана ленты. Принцип неопределённости — это не конец познания. Это начало понимания структуры пространства».

Глава 9. Шрёдингер, Бор, Эйнштейн: от кода и кота — к реальности.

Часть 1. Предисловие: три гения, три взгляда.

1.1. Код Шрёдингера

В 1926 году Эрвин Шрёдингер написал уравнение, которое стало сердцем квантовой механики:

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

Это уравнение — математический шедевр. Это код Шрёдингера. Он позволяет вычислять энергетические уровни атомов, предсказывать спектры, объяснять химические связи. Оно даёт правильные числа с точностью до 12 знаков.

Но есть одна проблема.

Шрёдингер не знал, что означает ψ (волновая функция). Он знал, как её считать, но не знал, что она такое.

Он говорил:

«Я создал уравнение, но не понимаю его физического смысла. Что такое ψ? Волна? Частица? Ни то, ни другое?»

Шрёдингер создал код — математическое правило, которое работало. Но он не знал, что этот код описывает.

1.2. Бор: страж кода, который отказался искать реальность

Нильс Бор, великий датский физик, создал Копенгагенскую интерпретацию квантовой механики.

Он сказал:

«Нет смысла говорить о том, что происходит с частицей, пока мы её не измерили. Реальность возникает в момент измерения. Волновая функция описывает всё, что можно знать. До измерения частица находится в суперпозиции всех состояний. Измерение «схлопывает» волновую функцию».

Бор защищал код. Он говорил: «Заткнись и считай». Он отказался искать реальность за кодом, потому что считал, что её нет.

1.3. Эйнштейн: искатель реальности, который отверг код

Альберт Эйнштейн, создатель Теории относительности, не мог принять Квантовую механику в интерпретации Бора.

Он говорил:

«Бог не играет в кости».

Он считал, что реальность объективна и детерминирована. Если мы не знаем, где частица — это не значит, что её нет. Должны быть скрытые переменные — неизвестные нам факторы, которые определяют результат измерения заранее.

Эйнштейн искал реальность за кодом. Но он не мог её найти, потому что код был неполным — и это было видно.

1.4. Три гения, три взгляда

Гений	Что создал	Что сказал	Что искал
Шрёдингер	Уравнение	«Я не знаю, что физически означает моя формула»	Физическую картину
Бор	Копенгагенскую интерпретацию	«Заткнись и считай»	Не искал ничего

Гений	Что создал	Что сказал	Что искал
Эйнштейн	Критику КМ	«Бог не играет в кости»	Объективную реальность

Часть 2. Код и кот: парадокс Шрёдингера

2.1. Как родился парадокс

В 1935 году Шрёдингер решил показать абсурдность того, как его современники интерпретировали его собственное уравнение.

Он придумал мысленный эксперимент.

Представьте:

- Есть ящик.
- В ящике — кот.
- Рядом — ампула с ядом.
- Над ампулой — молоток.
- Молоток соединён со счётчиком Гейгера.
- Рядом со счётчиком — радиоактивный атом, который может распасться или не распасться.

Если атом распадётся → счётчик щёлкнет → молоток разобьёт ампулу → кот умрёт.

Если атом не распадётся → счётчик молчит → ампула цела → кот жив.

Вопрос: пока мы не открыли ящик, кот жив или мёртв?

2.2. Ответ Копенгагенской интерпретации (Бор)

Пока мы не открыли ящик, кот **одновременно жив и мёртв**. Он находится в суперпозиции двух состояний. Только открытие ящика «схлопывает» волновую функцию, и кот становится либо живым, либо мёртвым.

2.3. Что сказал Шрёдингер

«Это абсурд. Кот не может быть одновременно живым и мёртвым. Значит, квантовая механика не описывает реальность. Она описывает только то, что мы знаем о реальности».

Кот Шрёдингера — это аргумент не в пользу КМ. Это аргумент, как приговор её интерпритации.

Часть 3. Суть парадокса: код и реальность

3.1. Два «кода»

Что	Описание
Код Шрёдингера	Это математический код (уравнение), который позволяет вычислять вероятности.
Кот Шрёдингера	Это метафора того, что происходит, когда мы применяем этот код к реальности.

Код (уравнение) — это карта. Кот — это территория.

Карта может быть идеальной, но она не равна территории. Шрёдингер создал уравнение (карту), а потом придумал кота (территорию), чтобы показать:

«Если ваша карта говорит, что кот одновременно жив и мёртв, значит, карта не соответствует территории».

3.2. Что говорит здравый смысл

Что говорит КМ	Что говорит здравый смысл
Кот находится в суперпозиции «жив и мёртв»	Кот либо жив, либо мёртв — это объективный факт

Что говорит КМ	Что говорит здравый смысл
Реальность определяется измерением	Реальность существует независимо от измерения
Волновая функция коллапсирует при открытии ящика	Открытие ящика ничего не меняет в состоянии кота — оно просто обнаруживает то, что уже есть

Часть 4. Спор Эйнштейна и Бора: 30 лет противостояния

4.1. Что говорил Эйнштейн

«Бог не играет в кости».

Эйнштейн считал, что:

1. Реальность **объективна** — она существует независимо от наблюдателя.
2. Реальность **детерминирована** — если знать все начальные условия, можно предсказать всё.
3. Должны быть **скрытые переменные** — неизвестные нам факторы, которые определяют результат измерения заранее.

Эйнштейн искал реальность за кодом.

4.2. Что говорил Бор

«Нет смысла говорить о том, что происходит с частицей, пока мы её не измерили».

Бор считал, что:

1. Вопрос «где частица на самом деле» — бессмыслен.
2. Реальность создаётся в момент измерения.
3. Квантовая механика полна — нет никаких скрытых переменных.

Бор защищал код. Он говорил, что код — это и есть реальность.

4.3. Ключевые этапы спора

Год	Событие	Суть
1927	Сольвеевский конгресс	Эйнштейн критикует КМ, Бор защищает
1930	Сольвеевский конгресс	Эйнштейн придумывает мысленный эксперимент с фотоном, Бор опровергает
1935	ЭПР-парадокс	Эйнштейн показывает, что КМ неполна
1935	Кот Шрёдингера	Шрёдингер показывает абсурдность КМ
1964	Теорема Белла	Доказано, что локальных скрытых переменных нет
1982	Эксперимент Аспекта	Экспериментально подтверждена запутанность

Часть 5. Эксперименты: кто оказался прав?

5.1. Теорема Белла (1964)

Джон Белл придумал математическое неравенство.

- Если у частиц есть локальные скрытые переменные (как у перчаток Эйнштейна), неравенство должно выполняться.
- Если скрытых переменных нет — неравенство нарушается.

Эксперименты показали: неравенство Белла нарушается. Значит, у частиц нет локальных скрытых переменных.

5.2. Эксперименты Аспекта (1982) и Цайлингера (2010-е)

- Запутанные фотоны разлетались в разные стороны.

- Их поляризация измерялась одновременно.

- Корреляция была мгновенной — она не может быть объяснена сигналом, идущим со скоростью света.

Бор оказался прав математически. Квантовая механика работает.

Но Эйнштейн оказался прав онтологически. Реальность существует независимо от измерения. Просто она устроена сложнее, чем он думал.

Часть 6. Что говорит ТАО (и как она примиряет спор)

6.1. Объективная реальность существует — это пиксельная решётка

Здесь Эйнштейн был бы доволен.

В ТАО есть абсолютная реальность: трёхмерная кубическая решётка из пикселей. Активные пиксели — материя. Нулевые — пространство. Паттерны (ленты, узлы) — частицы.

Эта реальность существует независимо от наблюдателя. Кот жив или мёртв объективно. Волновая функция на это не влияет.

6.2. Но мы, наблюдатели, видим не реальность, а её проекции

Здесь Бор был бы доволен.

Мы живём внутри решётки. Мы сами состоим из пикселей. Наши измерительные приборы — тоже из пикселей. Мы не можем вылезти «наружу» и посмотреть на решётку со стороны.

Всё, что мы видим — это проекции реальности на наши координаты.

Волновая функция — это не реальность. Это проекция реальности на координаты наблюдателя.

6.3. Почему нет локальных скрытых переменных

Скрытые переменные — это предположение, что можно «дополнить» квантовую механику локальными переменными.

В ТАО скрытые переменные есть, но они глобальные — вся пиксельная решётка.

Нельзя выделить локальную переменную для каждого электрона отдельно, потому что электрон — это распределённый паттерн. Поэтому локальные скрытые переменные невозможны, а глобальные — да.

Эйнштейн был прав, что скрытые переменные должны быть. Он ошибался, что они локальные.

Часть 7. Что бы сказал Шрёдингер?

Шрёдингер искал физическую картину за квантовой математикой. Он говорил:

«Мы не хотим принимать теорию, которая говорит, что кот одновременно жив и мёртв. Мы хотим знать, что на самом деле происходит».

ТАО даёт этот ответ:

- Кот жив или мёртв — объективный факт.

- Волновая функция — это проекция этого факта на наше восприятие.

- Измерение — это не создание реальности, а фиксация проекции.

Шрёдингер был бы доволен. Он хотел, чтобы кто-то показал, что за волновой функцией стоит реальный объект. ТАО это делает.

Спор закончен. Все трое были правы на своём уровне.

КМ — это проекция, а не мир. ТАО — это сам мир, и его структура.

Глава 10. Алгоритмика квантов: онтологический фундамент микромира

Часть 1. Почему силы — это иллюзия

1.1. В классической физике мы привыкли к силам:

- Гравитация притягивает яблоко к Земле.
- Электромагнетизм отталкивает одноимённые заряды.
- Сильное взаимодействие удерживает кварки в протоне.
- Слабое взаимодействие вызывает распад нейтрона.

Каждая сила имеет переносчика:

- Гравитация — гравитон.
- Электромагнетизм — фотон.
- Сильное — глюон.
- Слабое — W и Z бозоны.

Мы привыкли думать, что эти переносчики реально существуют. Что они летают между частицами. Что они толкают, тянут, связывают.

Но это — иллюзия.

В ТАО нет сил в классическом смысле. Нет переносчиков.
Нет толчков и ударов.

Есть только **Алгоритм**, который **переключает** состояния пикселей решётки. И всё, что мы называем «силами», «частицами», «взаимодействиями», — это **следствия** работы этого Алгоритма.

Часть 2. Почему Алгоритм – это именно Алгоритм.

2.1. Что такое Алгоритм

Алгоритм — это набор правил, которым пиксели решётки переключаются по из состояния 0 в состояние 1 и обратно.

Ключевые свойства Алгоритма:

1. **Дискретность.** Алгоритм работает **дискретно** — такт за тактом (t_P).
2. **Детерминированность.** Для каждого входного состояния пикселя и его соседей Алгоритм однозначно определяет следующее состояние.
3. **Локальность.** Состояние пикселя в следующий момент зависит только от его соседей в текущий момент.
4. **Внешность.** Алгоритм находится за пределами физической Вселенной. Он не является частью решётки.

2.2. Почему Алгоритм не может быть частью решётки

Это ключевой аргумент.

Гипотеза: Алгоритм мог бы быть встроен в решётку. Например, как локальные правила взаимодействия пикселей.

Опровержение:

1. Локальные правила должны быть где-то записаны. Если они записаны в пикселях, то какие правила управляют этими пикселями?
2. Бесконечная регрессия. Если правила записаны в пикселях, нужны правила для правил. И так до бесконечности.
3. Следовательно: правила не могут быть частью решётки. Они должны быть внешними.

Это — онтологическая необходимость. Алгоритм обязан быть внешним.

2.3. Почему Алгоритм — это именно Алгоритм, а не «закон природы»

В стандартной физике говорят: «Это фундаментальный закон природы».

Что это значит? Это значит: «Так устроено, и дальше спрашивать нельзя».

В ТАО говорят: «Это Алгоритм».

Что это значит? Это значит:

1. Правила существуют — как инструкции.
2. Правила выполняются — как программа.
3. Правила имеют источник — как программист (или мета-программа).

Разница:

- «Закон природы» — это констатация. «Так есть».

- «Алгоритм» — это объяснение. «Так работает».

Закон природы не даёт ответа на вопрос «почему?».
Алгоритм даёт ответ: «Потому что так написано в программе».

Часть 3. Как Алгоритм создаёт ощущение сил.

3.1. Что такое «сила» в стандартной физике

Сила — это мера взаимодействия между телами.

Формула: $F = ma$.

Что это значит: сила изменяет скорость тела.

Но что такое «изменение скорости»? Это ускорение. А ускорение — это перенастройка внутренней циркуляции паттерна.

3.2. Что такое «сила» в ТАО

Сила — это ощущение, возникающее из переключения пикселей.

Механизм:

1. Паттерн А (например, электрон) приближается к паттерну Б (например, протону).
2. Алгоритм «видит» новое состояние системы.
3. Алгоритм переключает пиксели так, чтобы паттерн А изменил траекторию.
4. Наблюдатель видит: «На А подействовала сила».
5. На самом деле: Алгоритм переключил пиксели.

«Сила» — это не причина. Это следствие работы Алгоритма.

3.3. Аналогия с бильярдными шарами

В классике:

- Шар №1 ударяет шар №2.
- Шар №2 отлетает.
- Мы говорим: «Шар №1 подействовал на шар №2 с силой».

В ТАО:

- Шар №1 приближается к шару №2.
- Алгоритм «видит» столкновение.
- Алгоритм переключает пиксели в шаре №2 так, чтобы он отлетел.
- Мы интерпретируем это как «удар».

Но удара нет. Есть переключение.

Часть 4. Конфаймент, как алгоритмический процесс.

4.1. Что такое Конфайнмент

Конфайнмент — это невозможность наблюдать свободные кварки.

В стандартной КХД: конфайнмент — это эффект, который не выводится из первых принципов.

В ТАО: конфайнмент — это прямое следствие работы Алгоритма.

4.2. Механизм конфайнмента (пошагово)

1. Кварк (лента циркуляции) пытается вырваться из протона (узла из трёх кварков).
2. Это создаёт огромное ускорение кварка относительно решётки (он тормозится гравитационной ямой протона).
3. Это ускорение перераспределяет энергию между самим паттерном (его кинетикой) и гравитоном прикреплённому к паттерну.

4. Гравитон зажигается — становится виртуальным фотоном (глюонной струной).
5. Виртон достигает порога энергии (~0.3 ГэВ).
6. Но в кварковом поле этот виртон не может стать просто фотоном — он рождает пару кварк-антикварк.
7. Эта пара немедленно образует мезон.
8. Вырвавшийся кварк соединяется с антикварком из родившейся пары, а исходный кварк (который был в протоне) остаётся на месте (или замещается новым кварком).

Но что здесь главное? Не «силы», не «струны», а Алгоритм.

4.3. Алгоритм решает, что делать

Механизм: Алгоритм «видит», что кварк отдаляется от узла, вычисляет новое состояние системы, и переключает пиксели так, чтобы:

1. Родилась новая пара.
2. Мезон улетел.
3. Протон (или нейтрон) перестроился.

Никаких "толкающих" кварков или "тянущих" струн нет. Там нет никаких "зубцов" и "шестерёнок". Есть только информационное переключение.

Это ключевой момент.

Конфайнмент — это не «сила». Это правило Алгоритма: «Если кварк отдаляется, переключи пиксели так, чтобы родилась новая пара».

Алгоритм не «толкает» кварк. Он переключает пиксели.

Часть 5. Слабое взаимодействие, как алгоритмический процесс.

5.1 Что такое слабое взаимодействие

Слабое взаимодействие — это процесс, отвечающий за:

- Бета-распад нейтрона.

- Распад мюона.

- Распад пиона.

В стандартной физике: это обмен W и Z бозонами.

В ТАО: это процесс перенастройки анизотропных деформаций.

5.2. Механизм слабого взаимодействия

В ТАО слабое взаимодействие — это не сила, а процесс перенастройки анизотропных деформаций.

Нейтрон — это протон + нейтрализующая петля (лента циркуляции электрона, но в противоположном направлении).

Распад нейтрона:

1. Петля "расстёгивается" — последовательный разрыв 10^{-23} связей (пикселей).
2. В конце — выстрел электрона с пиковой силой.
3. Нейтрон превращается в протон.

Это не обмен W-бозонами. Это топологическое переключение.

Что здесь важно:

- Нет «обмена».
- Нет «переносчика».

- Есть переключение состояний.

5.3. Алгоритм управляет распадом

Механизм:

1. Нейтрон — это узел с дополнительной петлёй.
2. Алгоритм «видит», что петля «напряжена».
3. Алгоритм переключает пиксели так, чтобы петля разорвалась.
4. Петля превращается в электрон.
5. Узел превращается в протон.
6. Избыток энергии уходит в антинейтрино.

Всё это — не «сила». Это последовательность переключений, заданная Алгоритмом.

5.4. W и Z бозоны — резонансы решётки

В стандартной физике: W и Z — частицы с массой.

В ТАО: W и Z — резонансные моды решётки.

Что это значит:

- Это не частицы.
- Это колебания решётки с определённой частотой.
- Их «масса» — это энергия резонанса.

Алгоритм «использует» эти резонансы
для переключения состояний.

Часть 6. Квантовая теория поля как алгоритмический процесс

5.1. Что такое КТП

КТП — это теория, описывающая взаимодействия через локальные обмены частицами.

В стандартной физике: частицы рождаются и уничтожаются.
Есть виртуальные частицы. Есть диаграммы Фейнмана.

В ТАО: всё это — следствия работы Алгоритма.

5.2. Фотон — разомкнутая цепочка

Фотон — разомкнутая цепочка. Масса 0, две поляризации → безмассовость из-за отсутствия замыкания.

Что это значит:

- Фотон — это паттерн активных пикселей.

- Он не замкнут в петлю.

- Поэтому не имеет массы.

- Алгоритм «двигает» его по решётке со скоростью *c*.

5.3. Глюон — переключатель ориентации

Глюон — переключатель ориентации между осями решётки (X ↔ Y ↔ Z). 8 типов из-за 3 цветов и 3 антицветов.

Что это значит:

- Глюон — это не частица.

- Это событие переключения ориентации.

- Алгоритм «переключает» ориентацию ленты.

5.4. Виртуальные частицы — промежуточные состояния

Виртуальные частицы — это не "реальные, но скрытые" объекты. Это промежуточные состояния переключений, которые не могут быть зарегистрированы как свободные, потому что их энергия-импульс не соответствуют $E^2 = p^2c^2$.»

Что это значит:

- Виртуальные частицы не существуют как объекты.

- Они — промежуточные состояния Алгоритма.

- Алгоритм «переключает» пиксели через эти состояния.

5.5. Диаграммы Фейнмана — карты переключений

Диаграммы Фейнмана — это не "математические фикции", а карты топологических переключений. Вершина — точка соединения ленты циркуляции и разомкнутой цепочки. Пропагатор — распространение возбуждения между переключениями.»

Что это значит:

- Диаграммы описывают последовательность переключений.

- Вершина — точка переключения.

- Пропагатор — путь между переключениями.

- Алгоритм «выполняет» эту последовательность.

Часть 6. Алгоритм ка источник всех взаимодействий.

6.1. Единая картина

В ТАО все взаимодействия — это разные проявления работы Алгоритма:

Взаимодействие	**Что это в ТАО**
Гравитация	Деформация решётки
Электромагнетизм	Обмен энергией деформации
Сильное	Переключение ориентации лент
Слабое	Перестройка анизотропных деформаций

Но все они — следствия одного Алгоритма.

6.2. Алгоритм — это не «сила»

Сила — это изменение скорости.

Алгоритм — это правило переключения.

Сила — это следствие. Алгоритм — это причина.

6.3. Алгоритм — это не «поле»

Поле — это распределение чего-то в пространстве. Алгоритм — это правило изменения.

Поле — это состояние. Алгоритм — это процесс.

6.4. Алгоритм — это не «частица»

Частица — это объект. Алгоритм — это правило.

Частица — это паттерн. Алгоритм — это то, что им управляет.

Часть 7. Философские следствия.

7.1. Детерминизм

Если Алгоритм детерминирован, то всё в микромире предопределено.

Случайность — это иллюзия нашего незнания.

Это возвращает нас к Эйнштейну: «Бог не играет в кости».

7.2. Свобода воли

Если всё детерминировано, есть ли свобода воли?

Ответ ТАО: свобода воли — это способность
сознания взаимодействовать с Алгоритмом.

Сознание (в физическом смысле)— это интерфейс между Внешним Алгоритмом и физической реальностью.

7.3. Смысл

Если всё — это Алгоритм, есть ли смысл?

Ответ ТАО: смысл — это не свойство реальности. Это интерпретация наблюдателя. Алгоритм не имеет цели. Он просто работает.

Часть 8. Итог

8.1. Главный вывод

МЕХАНИКА КВАНТОВ — ЭТО АЛГОРИТМИКА.

- Нет «сил».
- Нет «частиц».
- Нет «полей».

Есть Алгоритм, который переключает состояния пикселей.

Всё, что мы наблюдаем (конфайнмент, распады, взаимодействия), — это следствия работы Алгоритма.

8.2. Ключевая формула

$$\text{Физика} = \text{Алгоритм} + \text{Решётка}$$

Решётка — это железо.
Алгоритм — это программа.

Программа не является частью железа. Она внешняя.

Это — онтологическая необходимость.

8.3. Что это меняет

В стандартной физике:

- Силы — фундаментальны.
- Частицы — реальны.
- Поля — существуют.

В ТАО:

- Силы — ощущения.
- Частицы — паттерны.
- Поля — состояния.

Реальность — это Алгоритм и решётка.

ЭПИЛОГ

Алгоритмика квантов — это не «ещё одна интерпретация». Это смена парадигмы. Мы привыкли думать, что силы — это фундаментально. Что частицы — это реально. Что поля — это существенно. Но это — ощущения. Мы видим силы, потому что Алгоритм создаёт их проявление. Реальность — это пиксельная решётка и Алгоритм. Всё остальное — следствия.

Раздел 4. Топодинамика.

Глава 1. Деформатор: физика, расчёты, перспективы

Часть 1. Введение

Деформатор — это устройство, предложенное в рамках ТАО для создания направленной тяги без отброса массы. В отличие от ракет, он не использует реактивное движение. В отличие от варп-двигателя Алькубьерре, он не требует экзотической материи с отрицательной энергией. В отличие от «антигравитационных» устройств, он не пытается экранировать гравитацию.

Деформатор работает на фундаментальном свойстве пространства, которое вводит ТАО: пространство — это не пустота, а трёхмерная пиксельная решётка, способная деформироваться. Гравитация в этой картине — не «притяжение масс», а градиент сжатия решётки. Тело движется туда, где пиксели сжаты сильнее.

Деформатор создаёт искусственный градиент деформации и «падает» вверх, используя саму структуру пространства как опору.

Прежде чем говорить о пикселях, сверхпроводниках и градиентах, возьмите стакан с чаем. Опустите туда ложку. И покрутите её.

Что вы видите?

- Вода начинает вращаться.
- В центре стакана образуется воронка — уровень воды понижается.
- У стенок вода поднимается — её становится больше.
- Вода перераспределяется: из центра «убегает» к краям.

Это и есть вся физика Деформатора. Без метафор. Без формул. Без сложных терминов. Ложка - это ротор с магнитным полем. Вода - это нулевые пиксели пространства. Стакан - это купол-экран, не пропускающий, зажимающий магнитное поле. Вихрь - это вынужденная деформация решётки. Воронка в центре -

это растяжение под куполом. Поднятие у стенок - это сжатие на экваторе. Но здесь есть ключевой момент, который решает все. Кружка при этом никуда не движется. Внутри неё — полная симметрия. Вода вращается симметрично относительно оси. Воронка — симметрична. Подъём у стенок — симметричен. Всё уравновешено. Никакой направленной силы не возникает. Чтобы кружка сдвинулась, нужна асимметрия. Не симметричный вихрь, а асимметричная волна. Не однородное вращение, а неоднородное. Только тогда система «падает» в сторону, где сжатие сильнее.

Это — центральная мысль всей главы. Деформатор работает не потому, что мы «крутим ложку». Он работает потому, что мы создаём асимметричную динамику в зажатом пространстве. Всё остальное — детали.

Если вы поняли эту аналогию, значит вы поняли Деформатор. Если нет, то никакие формулы не помогут.

Часть 2. Ротор вращается внутри купола. Чем выше обороты, тем сильнее его магнитное поле. И тем сильнее его вихревая компонента. Магнитное поле заперто между ротором и куполом. Запереть магнитное поле может либо сверхпроводящий экран, либо магнитная поверхность одинаковой полярности. По мере увеличения магнитного поля ротора, оно вынуждено сжиматься. Ему некуда деться. Увеличение вращения ротора инициирует вихревое поле, которое неизбежно смещается к экватору купола. Это как в метрике Керра: увлечение пространства - аналогичный эффект. Сжатие в радиальном направлении, по принципу сохранения размера пространства, означает растяжение в осевом направлении. Если форма экранирующего конуса будет как у купола храма – «вытянутая вверх луковица» вихревая компонента поля ротора растянет нулевые пиксели от оси вращения и пика купола и «прижмёт» их к стенкам экрана на экваторе.

Как достигается ассимметрия:

- форма купола луковица

- смещение оси вращения ротора

- фазированная резонансная решётка раскачивает нулевые пиксели, накапливая энергию асимметричной деформации пикселей от магнитного поля.

Над куполом — сжатие от Земли. Под куполом нулевые пиксели растягиваются вращающимся магнитным полем - вихревой компонентой. Градиент направлен вверх. Купол «падает» вверх.

Это и есть физика Деформатора. Это механизм вынужденной деформации. Ложка — это не просто вращение. Ложка — это поле, которое не может уйти. Оно деформирует решётку. Оно создаёт тягу.

Далее мы соберём воедино всё, что известно о новой модели Деформатора: физические принципы, конструкцию, эксперименты-предшественники, ключевые проблемы и перспективы.

Часть 3. Отправная точка: Что мы знаем из метрики Керра

3.1. В ТАО метрика Керра (описывающая вращающуюся черную дыру) была выведена не через тензоры, а через вихревую деформацию решетки.

Основная идея:

1. Вращающееся массивное тело (черная дыра, звезда, ротор) «закручивает» пространство вокруг себя.
2. В терминах ТАО это означает, что пиксельная решетка не просто сжимается (как от неподвижной массы), но и закручивается — возникает вихревое поле.
3. Это поле описывается векторным потенциалом $A\phi$, который пропорционален моменту импульса J.

Что мы выяснили ранее (в анализе метрики Керра):
Вращение создает квадрупольную деформацию:

- На экваторе (в плоскости вращения) — пиксели сжимаются сильнее.

- На полюсах (вдоль оси вращения) — пиксели растягиваются.

- Возникает увлечение (Lense-Thirring effect) — локальные системы отсчета «тащатся» за вращением.

3.2. Перенос принципа на Деформатор: Ложка в чае

Теперь заменим черную дыру на ротор Деформатора, а гравитационное поле — на магнитное поле.

Аналогия: «Ложка в чае» — это физическая модель.

Элемент	В стакане с чаем	В Деформаторе
Ложка	Твердое тело, вращающееся в воде	**Ротор** — источник мощного магнитного поля
Вода	Жидкость, которую закручивает ложка	**Нулевые пиксели** — среда, которую закручивает поле
Стакан	Стенки сосуда	**Сверхпроводящий купол** — экран, ограничивающий область
Вихрь	Вращение воды вокруг ложки	**Вихревая деформация** решетки вокруг ротора
Воронка	Понижение уровня в центре	**Растяжение** пикселей под куполом
Подъем у стенок	Вода уходит к краям	**Сжатие** пикселей на экваторе купола

Ключевой вопрос: Чем именно «ложка» (поле ротора) закручивает «воду» (нулевые пиксели)?

Ответ: Макротором. Магнитное поле в ТАО — это замкнутый тор деформации (макротор). Когда ротор вращается, он создает не просто статическое поле, а вращающийся макротор. Этот

вращающийся макротор и есть аналог ложки, которая механически закручивает воду.

Часть 4. Два типа деформации

В ТАО существуют два принципиально разных типа деформации, и это различие критически важно.

Изотропная деформация — это классическая гравитация. Она создаётся массой, сжимает пиксели одинаково во все стороны, всепроникающая, не экранируется. Её концентрация колоссальна.

Анизотропная деформация — это магнитное поле, макротор. Она создаётся упорядоченными спинами или токами, сжимает пиксели в одном направлении и растягивает в другом, экранируется сверхпроводником. Это — маленькое вкрапление в изотропное поле.

Соотношение изотропно-сжатых пикселей к анизотропно-сжатым в стандартном магнитном поле — многие порядки. Именно поэтому гравитация всепроникающая, а магнетизм — нет.

Часть 5. Фундаментальная проблема. Почему изотропное поле так трудно изменить.

Изотропное поле — это вся решётка. Все нулевые пиксели вокруг нас сжаты гравитацией Земли. Чтобы локально изменить это сжатие, нужно преодолеть упругость всей решётки. Это как попытаться локально изменить давление океана, давящего на вас со всех сторон, обычным насосом. Капля анизотропии не может изменить океан изотропии. Именно поэтому изотропная гравитация всепроникающая на макроуровне. Она ограничена лишь боровским радиусом. Выше боровского радиуса на господствует. Она действует на все объекты, не экранируется сверхпроводником, так как расстояние между атомами (боровскими радиусами) значительное по сравнению с самими этими радиусами. Чтобы локально изменить изотропное поле, нужна энергия, сравнимая с энергией всей локальной части решётки. Это невозможно обычными средствами.

Часть 6. Возможности магнитного поля.

Лягушка левитирует в мощном магнитном поле. Но. Лягушка на 80% состоит из воды. Вода — диамагнетик: в магнитном поле она намагничивается против поля. В очень сильном поле возникает сила отталкивания, которая превышает силу тяжести. Лягушку буквально выталкивает вверх магнитным полем. Лягушка парит потому, что магнитное отталкивание диамагнетика в таком поле сравнялось с mg. Однако уже более плотный камень (тоже диамагнетик) упадёт вниз, но с меньшей силой. Поэтому сильное магнитное поле влияет на любой объект или тело, которое находится в нём. Это вполне указывает, что магнитное поле ощутимо влияет и на сами нулевые пиксели пространства, которые изотропно-сжатые.

Это значит, что магнитное поле создаёт локальную деформацию. Это делает Деформатор более реальным, чем может показаться.

Более того, решётка сжимается ощутимо. Любое ускорение уже сжимает её, и мы это ощущаем как вес. Деформация пикселя на поверхности Земли ничтожна — порядка 10^{-10}, но мы чувствуем её как вес и падаем из-за неё. Даже ничтожной деформации достаточно для макроскопического эффекта.

Часть 7. Две фундаментальные проблемы

7.1. Удержать локально

Решётка упруга. Деформация распространяется. Она «утекает» из области, где создана. Нужна запертость. Это может быть сверхпроводящий экран, два магнита с одинаковыми полюсами. Запертость — это не обязательно сверхпроводник. Это может быть геометрия плюс резонанс.

7.2. Сохранить асимметрию

Даже если деформация заперта, она при вращении создаёт симметрию даже если форма сама по себе асимметрична. Симметричная деформация не создаёт тяги. Нужна асимметрия. Это может быть смещение оси ротора, форма купола, фазированная решётка. Асимметрия — это геометрия плюс динамика.

И вот здесь мы возвращаемся к главному вопросу — к кружке, которая не движется.

Часть 8. Почему симметрия — враг тяги.

8.1. Главная ошибка всех прошлых экспериментов

Все прошлые эксперименты использовали симметричные тела. Подклетнов вращал диск. Таджмар вращал кольцо. NASA тестировала тор. Все они использовали осевую симметрию.

Что происходит при вращении симметричного тела? Вращение создаёт симметрию. Оно усредняет все неоднородности. Оно гасит асимметрию.

Симметричное тело создаёт симметричное поле. Симметричное поле создаёт симметричную деформацию. Симметричная деформация не создаёт направленного градиента. Тяги нет.

Почему Подклетнов получил 2%, а Таджмар — 0,01%

Они случайно ловили остаточную асимметрию — дефекты, неоднородности. Но при идеальном вращении симметрия восстанавливалась, и эффект исчезал. Это — системная проблема. Она не решается простым увеличением скорости или массы.

Очень показательно, что и Подклетнов, и Таджмар получили нестабильный, трудно воспроизводимый эффект. В идеале — эффект исчезал. Это системное совпадение указывает на фундаментальную причину: симметрия — враг тяги.

8.2. Аналогия с кружкой

Вернёмся к ложке в чае. Вы крутите ложку в кружке. Вода вращается, воронка образуется, у стенок вода поднимается. Но кружка не движется. Почему? Потому что всё симметрично. Воронка в центре, подъём у стенок — всё уравновешено. Нет асимметрии. Нет направленной силы.

Чтобы кружка сдвинулась, нужна асимметрия. Нужны асимметричные волны внутри кружки. Только тогда система «падает» в сторону, где сжатие сильнее. Только тогда кружка сдвинется.

Это — ключевое дополнение. Деформатор работает не потому, что мы «крутим ложку». Он работает потому, что мы создаём асимметричную динамику.

Часть 9. Асимметричное поле — ключ к тяге

9.1. Что нужно

Мы должны создать изначально асимметричное поле. Такое, чтобы в одной области линии были сгущены, а в другой разрежены. Тогда при вращении вращается не симметричное поле, а асимметричное. Асимметрия сохраняется. Градиент направлен. Тяга есть.

9.2. Как создать асимметричное поле

Есть несколько способов, и их комбинация даёт максимальную асимметрию.

Первый — использовать два магнита с одинаковыми полюсами, но разной силы. Один магнит сильнее, поле сгущается у него, разрежается у слабого. Асимметрия заложена изначально.

Второй — сместить ось ротора. Ротор не в центре купола, поле сгущается с одной стороны, разрежается с другой. Асимметрия создана геометрией.

Третий — использовать форму купола в виде луковицы. Купол вытянут вверх, поле фокусируется в острие, разрежается на экваторе. Асимметрия создана формой.

Четвёртый — использовать фазированную решётку. Элементы решётки включаются с разной фазой, создаётся бегущая волна деформации. Волна асимметрична. Асимметрия создана динамикой

9.3. Почему вращение асимметричного поля работает

Представьте асимметричное поле — с одной стороны сгущение, с другой разрежение. Начинаем вращать. Сгущение вращается, разрежение вращается. Но они не усредняются, потому что асимметрия заложена изначально. Вращение сохраняет асимметрию. Более того, вращение усиливает асимметрию за счёт центробежного эффекта.

Это как несимметричная ложка в воде. Покрутите её — вода будет вращаться несимметрично, воронка будет смещена в сторону. Возникает градиент.

Подвешенная на веревке кружка с чаем начнёт сдвигаться в сторону.

Градиент направлен.

Тяга есть.

Часть 10. Механизм вихревой деформации: Пошаговый разбор

Давайте разберем, что происходит на уровне пикселей, шаг за шагом.

Шаг 1. Создание поля ротором

Ротор (неодимовый магнит, электромагнит) создает мощное магнитное поле. В ТАО это означает, что вокруг ротора формируется макротор — замкнутая, тороидальная структура из упорядоченных нулевых пикселей.

Сам по себе статический макротор не создает вихря. Он просто «стоит» вокруг ротора.

Шаг 2. Вращение ротора

Ротор начинает вращаться с огромной скоростью (ω = 5000 + об/мин). Что это меняет? Макротор, «привязанный» к ротору, начинает вращаться вместе с ним. Но, в отличие от твердого тела, макротор — это структура в упругой пиксельной решетке. Он не может вращаться как единое целое, не вовлекая в движение соседние пиксели.

Шаг 3. Увлечение пикселей (Аналог Lense-Thirring)

Вращающийся макротор начинает увлекать за собой соседние нулевые пиксели. Это точно тот же эффект, что и увлечение пространства вращающейся черной дырой (эффект Лензе-Тирринга).

Что именно увлекается?

- Не сами пиксели как материальные точки (они стационарны в решетке).

- Увлекается фаза их мерцания и ориентация деформации.

- Возникает вихревое поле $A\phi$ — поле закрутки.

Математически:
Вихревое поле $A\phi$ пропорционально моменту импульса J ротора и обратно пропорционально расстоянию r:

$$A_\phi \sim \frac{GJ}{c^3 r}$$

Чем быстрее вращается ротор и чем он массивнее (в смысле момента импульса), тем сильнее вихрь.

Но в Деформаторе мы используем не гравитационный момент импульса, а магнитный!

$$J_{\text{магн}} \sim \frac{B^2 V}{\mu_0 \omega}$$

Магнитное поле ротора имеет огромную энергию. При вращении возникает магнитный аналог момента импульса:

Этот эффективный момент импульса на порядки больше гравитационного, что и дает усиление.

Шаг 4. Перераспределение деформации

Вихревое поле $A\phi$ создает дополнительную деформацию решетки. Это не просто сжатие, а анизотропная, закрученная деформация.

Что происходит по принципу сохранения размера пространства:

1. На экваторе (в плоскости вращения): Вихревые линии «набегают» друг на друга, усиливая сжатие. Пиксели сжимаются сильнее.
2. На оси вращения (полюса): Вихревые линии «расходятся», создавая разрежение. Пиксели растягиваются.

Это в точности соответствует картине в стакане с чаем:

- Вода у стенок (экватор) поднимается — сжатие.

- Вода в центре (ось) опускается — растяжение.

Шаг 5. Роль сверхпроводящего купола

Купол выполняет две критические функции:

1. Ограничивает область: Поле ротора не может уйти в пространство. Оно заперто между ротором и куполом.
2. Фокусирует вихрь: Форма купола (вытянутая луковица) направляет вихревые линии к экватору, усиливая перераспределение деформации.

Без купола: Поле ротора рассеивалось бы в пространстве, и вихрь был бы слабым.
С куполом: Поле концентрируется, вихрь усиливается, деформация становится направленной.

Шаг 6. Принцип сохранения размера пространства

Вихрь создал сжатие на экваторе и растяжение на оси. Но, согласно принципу сохранения размера пространства, общий объем деформации должен быть равен нулю:

$$\int_V \delta(r)\, d^3r = 0$$

Это означает: растяжение на оси должно быть скомпенсировано сжатием где-то еще. Где?

- На экваторе — сжатие (уже есть).

- Под куполом — растяжение (уже есть).

Но что происходит над куполом? Там находится только сжатие от земли.

Сверхпроводник экранирует (вытесняет) магнитное поле – анизотропную деформацию. Однако изотропную деформацию сверхпроводник не экранирует.

Поэтому изотропное сжатие над куполом объединяется с зоной вихревого сжатия на экваторе, усиливая его.

Итог: Возникает общий градиент деформации, направленный вверх:

- Над куполом: Сжатие (от Земли) + сжатие (от вихря на экваторе) = сильное сжатие.

- Под куполом: Растяжение (от вихря на оси) = растяжение.

Тело движется в сторону большего сжатия. Купол «падает» вверх.

Важное дополнение: только в случае большого количества изотропно-сжатых пикселей перешедших в анизотропно-сжатые от вращения магнитного поля.

Часть 11. Что именно увлекается?

Теперь давайте четко ответим на вопрос: что чем увлекается?

1. Ротор создает макротор. Макротор — это замкнутая вихревая структура из нулевых пикселей.
2. Ротор вращается. Макротор, связанный с ротором, начинает вращаться.
3. Вращающийся макротор увлекает соседние нулевые пиксели. Это увлечение — не механическое перемещение, а фазовая синхронизация. Пиксели начинают «мерцать» в такт с вращением макротора.
4. Фазовая синхронизация создает вихревое поле $A\phi$. Это поле описывает, как закручена деформация в каждой точке пространства.
5. Вихревое поле создает анизотропную деформацию. На экваторе — сжатие, на оси — растяжение.
6. Анизотропная деформация + форма купола = направленный градиент.
7. Градиент создает тягу.

Ключевой момент: Увлекается не вещество, а фаза деформации. Пиксели остаются на своих местах, но их состояние

(сжатие/растяжение) меняется в пространстве и времени, создавая бегущую волну деформации. Эта волна и есть вихрь.

Часть 12. Сравнение с метрикой Керра: Единство механизма

Параметр	Черная дыра Керра	Деформатор
Источник	Гравитационный момент импульса $J=MR^2\omega$	Магнитный момент импульса $J_{магн}\sim B^2V/\omega$
Что увлекается	Пространство-время (в ТАО — пиксельная решетка)	Пиксельная решетка
Механизм увлечения	Гравитационное поле вращающейся массы	Магнитное поле вращающегося ротора
Результат на экваторе	Усиление сжатия	Усиление сжатия
Результат на оси	Растяжение, джеты	Растяжение, тяга
Роль границы	Горизонт событий	Сверхпроводящий купол

Вывод: Деформатор — это лабораторная реализация метрики Керра. Мы создаем вращающийся макротор (аналог вращающейся черной дыры), запираем его в сверхпроводящем куполе (аналог горизонта) и используем возникающую вихревую деформацию для создания тяги.

Часть 13. Почему классическая физика говорит «это невозможно»

С точки зрения классической механики любое движение без отбрасывания массы выглядит как нарушение закона сохранения импульса.

13.1. Классическая логика:

- Чтобы тело получило импульс — нужно отбросить что-то в противоположную сторону.
- Ракета отбрасывает газ.
- Человек отталкивается от земли.
- Машина отталкивается от дороги.
- Нет отбрасывания — нет движения.

Отсюда вывод: «Деформатор — это вечный двигатель. Это невозможно.»

Этот вывод — правильный. Если бы Деформатор был реактивным движением.

Но Деформатор — не реактивное движение. Деформатор — это свободное падение!

13.2. Ключевое различие:

- Реактивное движение — тело отталкивает от себя массу. Импульс передаётся массе. Масса улетает в одну сторону, тело — в другую.
- Свободное падение — тело падает в градиенте деформации. Импульс не передаётся ничему. Тело движется потому, что сама среда имеет градиент.

Деформатор — это не ракета. Деформатор — это камень, который падает. Только падает он не вниз, а вверх.

13.3. Что такое «падение» в ТАО

В ТАО гравитация — это не «притяжение масс». Это градиент сжатия решётки. Тело движется в сторону большего сжатия. Это не «сила». Это свойство пространства.

Когда камень падает на Землю:

- Земля сжала решётку вокруг себя.
- Возник градиент.
- Камень движется в сторону большего сжатия.
- Камень не отбрасывает ничего.
- Камень не нарушает закон сохранения импульса.
- Камень просто падает.

Когда Деформатор «падает» вверх:

- Деформатор создал растяжение под куполом.
- Над куполом — сжатие от Земли.
- Возник градиент.
- Деформатор движется в сторону большего сжатия.
- Деформатор не отбрасывает ничего.
- Деформатор не нарушает закон сохранения импульса.
- Деформатор просто падает.

Разница только в направлении градиента. В обоих случаях — это свободное падение.

13.4. Почему это не «вечный двигатель»

Вечный двигатель — это устройство, которое создаёт энергию из ничего.

Деформатор — это устройство, которое использует энергию пространства.

Разница:

- Вечный двигатель: энергия создаётся. Это невозможно.
- Деформатор: энергия перераспределяется. Это возможно.

Что перераспределяется:

- Магнитное поле ротора создаёт анизотропию.
- Резонанс накачивает энергию в решётку.

- Решётка накапливает энергию.

- Градиент направляет движение.

- Тело движется в градиенте.

Никакой энергии не создаётся. Энергия берётся из нулевых пикселей. Она перераспределяется. Это не вечный двигатель. Это — насос для энергии пространства.

Часть 14. Единственный путь — резонанс

14.1. Почему обычные средства бесполезны

Магнитное поле создаёт локальную деформацию, но не сильно влияет на макроскопическое изотропное поле. Сверхпроводящий купол вытесняет поле, но не экранирует изотропную деформацию. Вращение создаёт вихрь, но вихрь — это анизотропия. Обычные средства создают анизотропию, но существенно не меняют изотропию. Мы это уже разобрали на примере лягушки и камня в сильном магнитном поле.

14.2. Резонанс — единственный путь

Чтобы повлиять на изотропное поле локально, нужна энергия, сравнимая с энергией всей решётки. Это возможно только через резонанс. Резонанс — это накопление энергии. Обычное воздействие рассеивает энергию, резонансное — накапливает. Это как толкать качели: не в такт — бесполезно, в такт — амплитуда растёт.

Резонанс позволяет накопить энергию, достаточную для локального изменения изотропного поля. Резонанс требует собственной частоты решётки, внешнего воздействия на этой частоте и добротности. Мы не знаем собственную частоту точно — предположительно около 160 ГГц по реликтовому излучению. Резонанс — это не усиление, это накопление. Энергия не создаётся, она накапливается за счёт синхронизации с собственной частотой решётки.

Часть 15. Алгоритм работы деформатора

15.1. Зажатое пространство — это область, где макротор не может расшириться. Это может быть сверхпроводящий экран, два магнита с одинаковыми полюсами. Зажатость концентрирует анизотропию. Она не создаёт энергию, она концентрирует её. Без зажатости поле размазано по большому объёму, плотность энергии мала, анизотропия размыта. С зажатостью поле сконцентрировано в малом объёме, плотность энергии высока, анизотропия сконцентрирована. Это и есть первый усилитель — концентрация. Второй – неоднородность (если два магнита). То есть, форма поля ассиметрична, а само поле не однородно.

В зажатом для макроторов пространстве идёт резонансная раскачка нулевых пикселей за счёт фазированной решётки, установленной в зазоре, то есть в асимметричной области макроторов. Зажатое пространство — область, где макротор заперт. Фазированная решётка — набор элементов, которые создают ВЧ-поле.

15.2. Алгоритм работы:

1. Резонансная раскачка — ВЧ-поле на частоте ω_0 раскачивает нулевые пиксели.

2. Все нулевые пиксели мерцают-пульсируют синхронно с одной частотой.

3. Асимметричный неоднородный макротор «подключается» к этому резонансу нулевых пикселей своей частотой вращения.

4. Попадает в такт колебания нулевых пикселей и добавляет им энергию своего вращения.

5. Энергия колебаний-деформаций нулевых пикселей накапливается.

6. Нулевые пиксели накапливают энергию, деформация растёт, асимметрия сохраняется, градиент усиливается.

7. Начинаются пульсирующие движения всей системы разнонаправленно.

8. За счёт изменения формы конуса, частот фазированной решётки, и т.д. пульсирующее движение приобретает выделенное направление.

9. Деформатор заработал.

15.3. Аналогия.

Солдаты идут по мосту. Могут ли они раскачать мост из бетона и железа в сторону. Суммарной силы всех солдат не хватает для раскачки. Начинают идти в ногу, входят в резонанс с внутренней частотой колебаний моста. Мост начинает мощно колебаться. Вопрос: что раскачивает мост?

Ответ: накопленная энергия движения солдат.

Второй вопрос: а можно эту накопленную энергию использовать не только для простой раскачки моста? Но и для направленной раскачки вперёд?

Ответ: Почему бы и нет. Классическая физика теоретически этого не запрещает. ТАО тем более.

15.4. Полная логика Деформатора. Кратко.

Сначала создаём асимметричный макротор — вращающийся ротор с магнитным полем, асимметричной формой и смещением оси. Затем зажимаем макротор — сверхпроводящим экраном или магнитами с одинаковыми полюсами. Поле заперто. Экран создаёт асимметрию своей формой. Затем включаем резонансную раскачку — фазированная решётка в зазоре, ВЧ-поле на частоте ω_0, нулевые пиксели раскачиваются. Затем накапливаем деформацию — энергия накапливается, деформация растёт, асимметрия сохраняется. Затем возникает градиент — сгущение в одной области, разрежение в другой, градиент направлен. Затем тяга — тело движется в сторону большего сжатия, купол «падает» вверх.

Часть 16. Критерий возможности: запрет или разрешение

15.1. Если резонанс возможен

Если резонанс возможен, то изотропное поле можно локально изменить, анизотропия может преодолеть изотропию, градиент

может быть создан, Деформатор возможен. Это означает, что Вселенная не запрещает такого рода возможность.

16.2. Если резонанс невозможен

Если резонанс невозможен, то изотропное поле нельзя локально изменить, анизотропия не может преодолеть изотропию, градиент не может быть создан, Деформатор невозможен. Это означает, что Вселенная установила запрет на такого рода возможность.

16.3. Это фундаментальный выбор

Вселенная либо разрешает, либо запрещает. Мы либо можем, либо не можем. Резонанс — это ключ.

16.4. Поиск резонансной частоты

Ключевой эксперимент — найти собственную частоту нулевых пикселей ω_0. Это фундаментальная константа решётки.

Есть несколько методов поиска:

1. По реликтовому излучению — пик около 160 ГГц.
2. По эффекту Казимира — меняя зазор, можно найти резонанс.
3. По аномальному эффекту Холла в $CeRu_4Sn_6$ — в точке квантовой критичности частота флуктуаций совпадает с собственной частотой.
4. Прямой поиск — подавать ВЧ-поле на решётку и искать максимум отклика.

Часть 17. Почему точные расчёты сейчас не имеют смысла

Мы подошли к точке, где точные расчёты не имеют смысла. И вот почему.

Мы не знаем ω_0 — собственную частоту нулевых пикселей. Без неё невозможно рассчитать резонанс. Мы можем только предполагать, что она равна 160 ГГц. Но это гипотеза.

Мы не знаем точную упругость решётки. Мы оценили её по порядку величины, но точное значение требует экспериментального определения.

Мы не знаем добротность резонанса. Она зависит от потерь в системе. Мы можем только предполагать, что она порядка 10–100.

Мы не знаем длину когерентности. Она определяет, сколько пикселей вовлечено в синхронное движение.

Мы не знаем реальную асимметрию. Она зависит от конкретной геометрии.

Точные расчёты сейчас — это гадание. Мы можем оценить порядки величин, понять принципы, спроектировать эксперимент. Но мы не можем предсказать точное значение тяги. Слишком много неизвестных параметров, слишком много нелинейных эффектов, слишком много зависимостей от конкретной реализации.

Вместо расчётов нужны эксперименты. Нужен эксперимент по поиску ω_0 — подавать ВЧ-поле на решётку и искать максимум отклика. Нужен эксперимент по проверке асимметрии — создать асимметричное поле, вращать его, измерить градиент деформации. Нужен эксперимент по проверке резонанса — настроить фазированную решётку на ω_0, измерить накопление энергии. Нужен эксперимент по проверке тяги — собрать полную конструкцию и измерить тягу.

Если эксперименты дадут положительный результат — Деформатор возможен.

Если эксперименты дадут отрицательный результат — Деформатор невозможен.

Часть 18. Финальный вывод

Деформатор — это критерий принципиальной возможности.

Если он работает — изотропное поле можно локально изменить, анизотропия может преодолеть изотропию, резонанс существует, Вселенная открыта.

Если он не работает — изотропное поле нельзя локально изменить, анизотропия не может преодолеть изотропию, резонанс не существует, Вселенная закрыта.

Это делает Деформатор самым важным экспериментом XXI века.

Глава 2. Синтезатор как следствие Деформатора.

Часть 1. Введение: Связь между двумя устройствами

Мы разработали логику Деформатора. Мы поняли, что он может работать только на резонансной раскачке решётки. Мы поняли, что магнитное поле — это «руль», а нулевые пиксели — это «качели».

Но есть второе следствие. Если Деформатор работает, то работает и Синтезатор.

Почему?

Потому что оба устройства используют один и тот же механизм. Резонансную раскачку нулевых пикселей. Только Деформатор использует её для движения, а Синтезатор — для извлечения энергии. Если мы научимся раскачивать решётку, то мы научимся извлекать из неё энергию. Это — одна и та же технология.

Часть 2. Синтезатор

Энергосинтез — это фундаментальный физический процесс, впервые описанный в рамках ТАО, заключающийся в резонансном извлечении энергии из нулевых пикселей пространства и преобразовании её в полезную форму (электрический ток или механическое движение).

Синтезатор — это устройство, которое извлекает энергию из нулевых пикселей. Он использует её резонансные свойства.

Как?

Он раскачивает решётку в резонансе. Он накапливает энергию. Он извлекает её в виде электрического тока. Это - как использовать энергию качелей. Не нужно толкать их с огромной силой. Нужно просто толкать в такт. Синтезатор использует ту же логику, что и Деформатор, но с другим выходом:

1. В Деформаторе накопленная энергия деформации превращается в **градиент** — и тело «падает» в этом градиенте.
2. В Синтезаторе накопленная энергия деформации превращается в **фотоны** — и мы снимаем их в виде тока.

Разница только в том, куда направлена раскачка. Деформатор направляет её в пространственную асимметрию. Синтезатор направляет её в когерентное излучение.

Часть 3. Конструкция: как это устроено.

Синтезатор — это два вращающихся относительно друг друга Деформатора, но без асимметрии магнитных полей. Один нависает над другим. Между ними зазор. В зазоре (активной зоне) сфера с напылением:

- с внутренней стороны слой квантовых точек,

- с наружной стороны слой меди или более тугоплавкого материала.

Каждый Деформатор:

- имеет свой отдельный ротор с магнитным полем.

- вращается орбитально, периодически «наезжая» на сферу (сверху или снизу).

Орбиты обоих Деформаторов проходят над сферой (одного сверху, другого снизу). При этом оба деформатора нависают друг над другом. У верхнего Деформатора купол без шпиля направлен вверх. У нижнего — вниз.

Нижняя часть куполов Деформаторов открытая — макротор свободно выходит оттуда. Заперт только верх. Крутящий момент к ротору подводится через отверстие в верхней части купола. Деформаторы совершают орбитальное движение в противофазе: то верхний нависает над сферой сверху, то нижний снизу - попеременно. В зазоре, где находится сфера, создаётся колебательный контур.

Два Деформатора вращаются — каждый по своей орбите, словно планетарная передача. Это создаёт сложное пульсирующее поле в зазоре между ними.

По бокам в зазоре — фазированные решётки. К квантовым точкам в сфере подведено небольшое напряжение.

Два Деформатора, вращающиеся на орбитальных траекториях навстречу друг другу с противоположными смещениями и противоположными собственными вращениями роторов, выполняют три ключевые функции:

1. **Создание переменного поля в зазоре.** Противоположные смещения и вращения роторов обеспечивают сложную интерференционную картину, эффективно раскачивающую нулевые пиксели.
2. **Полная компенсация сил.** Благодаря симметрии все результирующие силы — как линейные, так и гироскопические — взаимно уничтожаются.

Часть 4. Три зоны резонансной системы

В процессе энергосинтеза пространство вокруг Синтезатора разделяется на три функциональные зоны.

Активная зона. Малый объём пространства — зазор между Деформаторами. Здесь происходит генерация резонансного поля и преобразование энергии. Объём — около 0,5 м³. Высокая когерентность. Высокая добротность. Здесь энергия из пространства концентрируется и передаётся квантовым точкам.

Полуактивная зона. Промежуточный объём — примерно 100 м³ вокруг установки. Здесь нулевые пиксели частично синхронизированы и передают энергию в активную зону. Энергия здесь перераспределяется, но не преобразуется.

Пассивная зона. Огромный объём пространства — километры и более. Это неисчерпаемый источник энергии. Огромное число нулевых пикселей. Слабая, но постоянная подпитка активной зоны. Это энергетический резервуар Вселенной, из которого мы черпаем энергию через Энергосинтез.

Часть 5. Онтология процесса.

5.1. В ТАО пространство — это упругая пиксельная решётка. У неё есть собственная частота ω_0. Если мы попадаем в резонанс с этой частотой, амплитуда деформации решётки нарастает. Это

накопление — не создание энергии из ничего, а концентрация энергии, которую мы вкладываем извне. Резонанс — это насос. Он не рождает энергию. Он её собирает.

5.2. Механизм резонансной передачи энергии (процесс Энергосинтеза)

Этап 1. Возбуждение активной зоны. Два Деформатора с противоположными смещениями и противоположными собственными вращениями создают в зазоре сложное интерференционное поле. Благодаря двум типам вращения — орбитальному и собственному (вращению ротора) — поле в каждой точке зазора меняется во времени с частотами, определяемыми комбинацией этих вращений.

Этап 2. Раскачка полуактивной зоны. Поле из активной зоны проникает в полуактивную зону и начинает раскачивать нулевые пиксели. Каждый нулевой пиксель рассматривается как гармонический осциллятор с собственной частотой, массой и коэффициентом затухания. Под действием внешней силы пиксели начинают колебаться. Амплитуда растёт.

Этап 3. Синхронизация фаз. При совпадении частоты внешнего поля с собственной частотой пиксели в полуактивной зоне входят в резонанс. Их фазы синхронизируются. Число синхронизированных пикселей растёт.

Этап 4. Отбор энергии у пикселей. Энергия, запасённая в одном резонансном пикселе, пропорциональна квадрату амплитуды. Полная энергия в полуактивной зоне — это сумма энергий всех синхронизированных пикселей. Она растёт как квадрат добротности.

Этап 5. Передача энергии в активную зону. Энергия из полуактивной зоны передаётся в активную зону. Она концентрируется в зазоре. Она фокусируется на квантовых точках. Квантовые точки как преобразователи энергии: энергии деформации нулевых пикселей в излучение.

Этап 6. Приём поля фазированной решёткой. Элементы фазированной решётки принимают поле от Деформаторов, смешивают его с опорным сигналом и переизлучают в зазор на нужной частоте. Это гетеродинное преобразование. Оно позволяет поднять частоту и точно настроить фазу.

Этап 7. Настройка квантовых точек. На затворы подаётся напряжение, которое точно подстраивает энергетические уровни квантовых точек под частоту поля в зазоре. Это обеспечивает максимальный резонанс и КПД.

Этап 8. Раскачка квантовых точек. Квантовые точки входят в резонанс с полем и начинают интенсивно излучать. Благодаря когерентности возникает сверхизлучение. Мощность пропорциональна квадрату числа точек.

Этап 9. Съём тока с медной сферы. Фотоны от квантовых точек поглощаются в тонком медном покрытии, создавая фототок, который снимается в нагрузку.

Часть 6. Почему энергия течёт непрерывно и это не истощает пространство.

Когда мы забираем энергию у нулевых пикселей в полуактивной зоне, их колебания затухают. Но эта зона окружена бесконечной пассивной зоной, где пиксели находятся в равновесном состоянии. Энергия перетекает из пассивной зоны в полуактивную за счёт волн деформации, распространяющихся по решётке со скоростью света.

Время восстановления для зоны радиусом R пропорционально R/c. Для R=10 м это порядка 3×10^{-8} секунды. Это практически мгновенно.

Таким образом, мы имеем стационарный поток энергии. Активная зона забирает энергию у полуактивной. Полуактивная зона мгновенно восполняется из пассивной. Пассивная зона бесконечна — процесс может длиться вечно.

Это как «не отнять, как не вычерпать моря». Сколько ни вычерпывай — вода прибывает мгновенно.

Часть 7. Почему это не вечный двигатель

Вечный двигатель запрещён, потому что он предполагает получение энергии из ничего. Здесь энергия не создаётся из ничего. Она извлекается из нулевых пикселей пространства, которые имеют колоссальный запас энергии, являются неотъемлемым свойством Вселенной и мгновенно восполняются за счёт бесконечного окружения.

Мы не нарушаем закон сохранения энергии. Мы перераспределяем её из одной формы — энергия деформации решётки — в другую — электрический ток. Это цепочка преобразования. Механическая энергия вращения макроторов → энергия деформации решётки → энергия фотонов квантовых точек → электрическая энергия. Как в гидроэлектростанции: вода падает → турбина крутится → генератор даёт ток. Принцип тот же. Масштаб другой.

Часть 8. Вопросы от классической физики

8.1. Классическая физика смотрит на Синтезатор и говорит: это энергия без топлива, это вечный двигатель, это невозможно. И этот вывод абсолютно правильный, если бы Синтезатор создавал энергию.

Но Синтезатор не создаёт энергию. Синтезатор — это турбина. И чтобы это понять, нужно пройти всю онтологическую цепочку — от пикселя до тока, от запертой энергии до доступной, от хаоса флуктуаций до когерентного излучения.

8.2. Пиксель и два вида энергии

Как мы знаем, в ТАО каждый пиксель может находиться в одном из двух состояний: нулевой пиксель, то есть вакуум, или активный пиксель, то есть материя.

Но нулевой пиксель не покоится. Он мерцает. Он переключается между состояниями-деформациями. Это мерцание — это флуктуация. Это неотъемлемое свойство решётки. Оно есть всегда,

везде, независимо от того, есть ли рядом материя или нет. Мерцание — это «дыхание» пространства.

У каждого нулевого пикселя есть энергия покоя. Она ничтожно мала, порядка десять в минус сто четырнадцатой степени джоулей. Это запертая энергия. Она не доступна напрямую. Это «капитал» решётки, который нельзя тронуть, не разрушив саму решётку. Но пиксель мерцает-колеблется, и у этого мерцания-колебания есть энергия. Вот эта энергия флуктуации — она доступна. Это «проценты» с капитала. Капитал заперт. Проценты текут.

Температура решётки — это мера интенсивности мерцания. Чем сильнее мерцают пиксели, тем выше температура. Реликтовое излучение с температурой 2,725 Кельвина — это средняя температура решётки. Это никакое не реликтовое излучение времён рекомбинации (или «большого взрыва») Это её собственное излучение. Это её пульс (подробное описание в главе Новая Космология). Но локальная температура может отличаться от средней. И именно эти локальные отклонения, эти флуктуации температуры, — это и есть та энергия, которую можно извлечь. Она просто распределена в пространстве, и её можно собрать.

8.3. Океан флуктуаций

Весь объём пространства заполнен нулевыми пикселями. Их плотность колоссальна — порядка десять в сто четвёртой степени на кубический метр. Каждый пиксель мерцает. У каждого есть энергия флуктуации. Суммарная энергия в одном кубическом метре — порядка пять на десять в минус десятой степени джоулей. Это колоссальный резервуар. Но он скрыт в хаотическом мерцании.

Без резонанса пиксели мерцают хаотически. Их фазы случайны. Один пиксель колеблется так, другой иначе. В среднем энергия обнуляется. Доступной энергии нет. Это как толпа людей, которые кричат каждый своё. Суммарно — шум. Полезного сигнала нет. Энергия есть у каждого, но она бесполезна, потому что не когерентна.

С резонансом картина меняется. Пиксели начинают мерцать синхронно. Их фазы согласуются. Их энергия складывается.

Возникает когерентное колебание. Доступная энергия появляется. Это как хор. Каждый поёт в такт. Суммарно — не шум, а музыка. Резонанс превращает хаос в порядок. Он не создаёт энергию. Он делает её доступной.

8.5. Резонанс как доступ

Резонанс не создаёт энергию. Он не отбирает запертую энергию пикселя. Он собирает ту энергию, которая уже есть в флуктуациях. Он концентрирует её - усиливает локально. Он даёт к ней доступ.

И вот здесь ключевое различие между замкнутой и открытой системой. Замкнутая система — это качели. Энергия только внутри. Нет внешнего источника. Резонанс только накапливает то, что ты вложил. Выигрыша нет. Открытая система — это решётка. Энергия вне системы. Есть внешний источник. Резонанс собирает и концентрирует. Выигрыш есть.

Почему?

Потому что решётка — это не замкнутая система. Океан флуктуаций — это бесконечный резервуар. Квантовые точки — это преобразователь. Мы снимаем ток.

Это как ветряк. Ветер бесплатный. Лопасти крутятся. Генератор даёт ток. Мы не создаём ветер. Мы его используем. Синтезатор использует флуктуации. Он не создаёт энергию. Он её использует.

Часть 10. Что мы извлекаем: капитал или проценты

Здесь нужно быть абсолютно точным. Мы извлекаем не энергию нулевого пикселя. Энергия нулевого пикселя — это запертая энергия. Это его энергия покоя. Чтобы её извлечь, нужно разрушить сам пиксель. Это не наш случай. Это «капитал» решётки. Он неприкосновенен.

Мы извлекаем энергию деформаций и колебаний. Мы используем только энергию флуктуаций. Энергия нулевого пикселя — это запертая, недоступная энергия. А температура реликтового излучения — это температура самой решётки. Это её собственное

излучение. И флуктуация этой температуры — это и есть доступная, извлекаемая энергия, которая просто распределена в пространстве. Реликтовое излучение - это как раз её (этой энергии) проявление в каждой точке пространства.

То есть мы не трогаем «капитал». Мы собираем «проценты». Мы не разрушаем решётку. Мы используем её естественное мерцание. Мы не создаём энергию. Мы получаем доступ к той, которая уже есть.

Часть 11. Почему это не замкнутая система

В замкнутой системе выигрыша нет. Ты толкаешь качели. Ты вкладываешь энергию. Ты забираешь энергию. Больше ты не получишь. Это закон сохранения. Это замкнутая система. Ты — единственный источник энергии.

В открытой системе выигрыш есть. Ты «толкаешь» решётку. Ты вкладываешь немного энергии — на создание резонанса. Но решётка уже имеет энергию. Огромную. Она просто не доступна без резонанса. Ты открываешь кран. И через кран течёт то, что уже было в системе. Ты не создаёшь энергию. Ты получаешь доступ к той, что уже есть.

Выигрыш — в том, что ты получил доступ к чужой энергии. Не к своей. К той, что уже есть в решётке.

Часть 11. Локальное охлаждение решётки

Когда мы забираем энергию у пикселей в активной зоне, их мерцание ослабевает. Их энергия уменьшается. Их температура падает. Это локальное охлаждение. Это следствие отбора энергии.

Но активная зона окружена полуактивной зоной. Полуактивная зона окружена пассивной зоной. Пассивная зона бесконечна. Энергия перетекает из пассивной зоны в полуактивную, из полуактивной в активную.

Время восстановления для зоны радиусом десять метров — порядка тридцати трёх наносекунд. Это практически мгновенно.

Часть 12. Честный ответ на вопрос о выгоде

Вход — это энергия, которую мы тратим на вращение, на высокочастотное поле, на затворы. Это порядка десяти киловатт. Выход — это энергия, которую мы получаем в виде тока. Это может быть сотни киловатт, тысячи… мега. Сейчас мы не гадаем. Главное мы понимаем, что выигрыш есть. Выигрыш — в сотни, может тысячи и больше раз.

Часть 13. Квантовые точки: место, где когерентность даёт выигрыш.

Мы прошли всю цепочку: пиксель — флуктуация — резонанс — доступ к океану. Мы поняли, что решётка не замкнута, что океан флуктуаций бесконечен, что резонанс — это способ, а не генератор. Но остаётся главный вопрос: где именно в устройстве происходит превращение доступа в полезную мощность? Где то место, в которой возникает реальный выигрыш?

Эта точка — квантовые точки. Это место, где физика когерентности превращает слабую раскачку решётки в мощный поток энергии. И это не гипотеза. Это измеренный факт.

Квантовая точка — это нанокристалл полупроводника размером от двух до десяти нанометров. Из-за трёхмерного квантового ограничения она ведёт себя как искусственный атом: дискретные уровни энергии, узкие линии излучения, контролируемая частота. Меняя размер точки, можно точно задать её резонансную частоту. Больше точка — ниже частота. Меньше — выше. Это фундаментальное свойство, а не подгонка.

Именно поэтому квантовые точки — идеальный элемент для Синтезатора. Их можно настроить на нужную частоту. Их можно согласовать друг с другом. Их можно заставить работать синхронно.

Квантовые точки действительно поддерживают когерентное состояние. Это не предположение — это измерено в лабораториях по всему миру. Оптическая когерентность живёт от одной до трёх наносекунд. Спиновая когерентность живёт около двухсот наносекунд. Ядерная когерентность в ансамбле спинов живёт более ста миллисекунд. FRET — резонансный перенос энергии между точками — живёт от семисот пикосекунд до двух наносекунд. Когерентный FRET — измерен. Это когда точки не просто передают энергию, но и формируют когерентную моду через многократное рассеяние.

Вся предыдущая цепочка — пиксели, флуктуации, резонанс — это подготовка. Это создание условий. Это накопление потенциала. Но превращение этого потенциала в мощность происходит на квантовых точках. Когда резонанс раскачал решётку, когда фазы пикселей синхронизировались, когда в зазоре возникло когерентное поле — это поле слабое. Оно не может напрямую дать ток. Оно не может напрямую совершить работу. Оно — спусковой крючок. Квантовые точки преобразователи-усилители для этого поля. Они делают это через сверхизлучение. Когда много точек работают синхронно, мощность растёт не линейно, а квадратично по числу точек. Это фундаментальное свойство когерентных систем. Это как в лазере: чем больше атомов работают синхронно, тем мощнее пучок.

Вот где выигрыш. Не в самом резонансе. Не в самой раскачке. А в превращении слабого когерентного поля в мощный поток фотонов через сверхизлучение квантовых точек. Это — место усиления. Это — турбина. Это — точка, где когерентность даёт реальный выигрыш в мощности.

Когда точка в резонансе, она поглощает энергию поля. Она возбуждается. Она переходит на верхний уровень. Но она не остаётся там. Она излучает. И вот здесь ключевое: когда много точек возбуждены синхронно, они излучают синхронно. Возникает сверхизлучение. Мощность растёт как квадрат числа точек. Это не сумма мощностей отдельных точек. Это коллективный эффект. Это когерентное усиление. Это то, ради чего нужны именно квантовые

точки, а не что-то другое. Они могут быть когерентными. Они могут работать синхронно. Они могут давать квадратичный выигрыш.

Есть ещё один механизм, который делает квантовые точки идеальными для Синтезатора. Это FRET. Когда одна точка возбуждена, она может передать энергию соседней точке без излучения фотона. Через поле. Через диполь-дипольное взаимодействие. Это значит, что энергия может собираться с большой площади. Точки могут передавать энергию от периферии к центру. Это как воронка. Это как линза. Это позволяет концентрировать энергию с большого объёма в малую область. Это усиливает эффект. Когерентный FRET — это следующий шаг. Это когда точки не просто передают энергию, но и формируют когерентную моду. Это когда вся система точек работает как один гигантский когерентный объект. Это — максимальный выигрыш.

Квантовые точки — это ключевой элемент. Это место, где когерентность даёт выигрыш. Без них Синтезатор был бы просто раскачкой решётки. С ними — он становится преобразователем этой раскачки в мощный поток энергии. Это не гипотеза. Когерентность квантовых точек измерена. FRET измерен. Когерентный FRET измерен. Сверхизлучение известно. Всё это — реальная физика. Всё это — проверенные факты. Остаётся один вопрос: резонируют ли квантовые точки с решёткой пространства? Это — открытый вопрос. Но если у решётки есть собственная частота, если её можно возбудить — то квантовые точки сработают. Они усилят. Они дадут выигрыш. ТАО чётко указывает на это.

Часть 14. Связь с Деформатором

Деформатор и Синтезатор — это одно и то же устройство, у которого одна и та же цель, но разные задачи. Они используют один и тот же физический механизм: резонансную раскачку нулевых пикселей. Только Деформатор направляет эту раскачку в градиент деформации — и получает тягу. А Синтезатор

направляет ту же раскачку в когерентное излучение — и получает электрический ток.

Это не два разных изобретения. Это два режима работы одной технологии. Если решётка резонирует — работают оба. Если не резонирует — не работает ни один. Поэтому Синтезатор — не отдельная гипотеза, а прямое следствие той же онтологии, на которой стоит Деформатор.

Часть 15. Почему это альтернатива термоядерному синтезу (термояду).

15.1. Термояд — это тупик

Шестьдесят лет. Сотни миллиардов долларов. Тысячи учёных. И ни одного работающего реактора.

Термояд пытается преодолеть кулоновское отталкивание ядер. Для этого нужны температуры в миллионы градусов. Для этого нужны магнитные ловушки. Для этого нужны колоссальные энергии.

Это — утопический путь. Создать на Земле Солнце. Мы пытаемся разрушить решётку, преодолеть её сопротивление, заставить ядра слиться. Всё бы ничего, но это — как пытаться сдвинуть гору. Можно. Но нужно огромное усилие. И результат — ничтожный.

15.2. Почему термояд не решает проблему

Даже если мы заставим ядра слиться, мы получим энергию. Но мы затратим на это больше энергии, чем получим. Термояд невыгоден. Он не окупается. Создать Солнце на Земле — это тупик.

15.3. Почему Синтезатор проще термояда

Термояд:

- Нужны температуры в миллионы градусов.
- Нужны магнитные ловушки.
- Нужны колоссальные энергии.
- Нужны редкие изотопы (дейтерий, тритий).

- Нужны огромные реакторы.

Синтезатор:

- Нужна резонансная частота.
- Нужна фазированная решётка.
- Нужна зажатость.
- Нужен небольшой аппарат.

Синтезатор на порядки проще. И на порядки дешевле.

Часть 16. Почему это может поменять всё.

16.1. Синтезатор не требует топлива (в привычном понимании). Он не требует урана. Он не требует дейтерия. Он не требует солнца. Он не требует ветра. Он использует энергию пространства. Она неисчерпаема. Она везде.

16.2. Синтезатор проще Деформатора.

Ему не нужна асимметрия. Ему не нужен градиент.
Ему нужен только резонанс.

Это — просто.

Это — фундаментальный выбор

Вселенная либо разрешает, либо запрещает.

Мы либо можем, либо не можем.

Резонанс — это ключ.

16.3. Проблема энергии

Человечество зависит от энергии. Без энергии нет промышленности. Без энергии нет транспорта. Без энергии нет связи.

Ископаемое топливо конечно. Оно загрязняет. Оно дорожает. Оно иссякает.

Термояд не работает. Он невыгоден.

Синтезатор прост. Он дешёв. Он неисчерпаем.

Синтезатор — это возможное решение.

16.4. Итог

Синтезатор — это не фантастика. Это следствие ТАО. Если у решётки есть резонанс, то Синтезатор возможен. Он следует из онтологии. Он использует те же принципы, что и Деформатор. Синтезатор проще термояда. Он не требует экстремальных условий. Он требует только резонанс. Синтезатор решает проблему энергии.

Раздел 5. Физический фундаментализм (или фундаментальный принцип, который должен стоять в самом начале любого разговора о физике и математике).

Глава 1. О двух типах «нуля» пространства

Часть 1. Математический ноль (абсолютное отсутствие объёма)

1.1. Определение.

Математический ноль — это граница между «ничто» (небытием) и математической средой (пространством координат).
Он не имеет протяжённости, не содержит координат и не допускает существования никакой структуры, включая пиксельную решётку.

Если соединить два пальца руки, между ними условно нет зазора — это и есть образ математического нуля: граница, за которой нет даже координатной сетки.

1.2. Пиксель как минимальный элемент физического пространства

В ТАО пространство — дискретная 3D-решётка из кубических ячеек (пикселей) размером l_P. Эта решётка одновременно является:

- Физическим пространством (носителем деформаций, полей, материи),

- Отображением математической среды (в ней есть координаты узлов, объёмы, направления).

Каждый пиксель может быть активным («1», материя/энергия) или нулевым («0», вакуум).
Координаты узлов решётки принадлежат математической среде — они сохраняются, даже если пиксель перестаёт физически существовать.

1.3. Что находится между пикселями

Между соседними пикселями решётки нет физической среды. Там нет промежуточных пикселей, нет полей, нет материи.

То, что разделяет два пикселя, — это математический ноль физического пространства: граница, на которой физическая решётка прерывается, но координатная сетка математической среды остаётся неповреждённой.

Эта граница не является расстоянием; это точка (или поверхность) раздела, не обладающая собственной протяжённостью.

1.4. Разрыв (исчезновение) пикселя

В ТАО разрываться может только нулевой пиксель (состояние «0»). При достижении критической деформации $\delta_{крит}$ нулевой пиксель теряет способность поддерживать свою структуру.
Он аннигилирует с выделением энергии, которая уходит в виде фотона:

- в соседний активный пиксель («1»), увеличивая энергию замкнутого паттерна, как частоту его колебания или движения относительно решётки;

- или в другой нулевой пиксель, переводя его в виртуальное состояние (увеличение свечения).

В результате физическая ячейка пространства исчезает. На её месте остаётся только координата математической среды — узел сетки без физического носителя.

Это — физический ноль. Там нет физической энергии. Пространства как среды больше нет, но место под него (координата) в математической среде сохраняется.

1.5. Что происходит в чёрной дыре

Внутри горизонта событий ($r < R_s$) все нулевые пиксели разрушены из-за сверхкритической деформации ($\delta > 1$). Там нет решётки — нет физического пространства, нет энергии.
Однако математическая среда (координатная сетка) продолжает существовать формально, как пустой контейнер без содержимого.

Таким образом:

- Физический ноль внутри ЧД есть (решётки нет).

- Математического нуля внутри ЧД нет — координаты как абстрактная система присутствуют.

Вне ЧД ($r > Rs$) решётка существует. Между пикселями — математический ноль физической среды (граница без протяжённости).

Вне Вселенной или в абсолютной пустоте вне решётки — тоже математический ноль: нет даже координатной сетки. Но ТАО не требует существования такой области.

1.6. Связь двух типов нуля

Математический ноль автоматически влечёт за собой физический ноль: если нет координатной сетки (нет «куда» поместить пиксель), то не может быть и решётки. Обратное неверно: физический ноль (разрыв пикселя) не означает математического нуля — координаты сохраняются, объём как множество точек остаётся.

1.7. Итоговая формулировка правила

Правило ТАО о двух типах нуля пространства:

1. **Математический ноль** — граница между «ничто» (небытием) и математической средой (пространством координат). Это абсолютное отсутствие координат и объёма, в котором не может существовать даже пиксельная решётка.
2. **Физический ноль** — отсутствие пиксельной решётки (физической среды) при сохранении координат математической среды. Физический ноль возникает при разрыве нулевого пикселя под критической деформацией $\delta_{крит}$.
3. Между соседними пикселями решётки находится математический ноль физического пространства — граница, не обладающая протяжённостью, но сохраняющая координаты узлов.
4. Внутри горизонта событий чёрной дыры ($r < R_s$) достигается состояние физического нуля без математического нуля — пространство как среда отсутствует, но координатная сетка формально сохраняется.

5. Математический ноль влечёт физический ноль, но физический ноль не влечёт математический ноль.

Часть 2. Полная картина математической и физической реальности

2.1. Уровни реальности (по ТАО)

Математическое пространство

Это: Абстрактная система координат, чисел, функций, уравнений, континуумов, бесконечностей, сингулярностей.

Свойства:

- Нет физических ограничений.

- Можно уходить в бесконечность, делить на ноль, получать сингулярности.

- Не требует времени, энергии, причинности.

- Существует «вечно» и «везде» в платоническом смысле.

Примеры:

- Декартова система координат R^3

- Пространство Гильберта в квантовой механике

- Пространство-время Минковского-Эйнштейна

- Сингулярность в центре чёрной дыры по ОТО

2.2. Математический ноль

Это: Граница между «чем-то» и «ничем» внутри математического пространства.
Это отсутствие координат, отсутствие даже пустого множества.
Это абсолютное небытие, в котором не определены даже операции сложения и умножения.

Свойства:

- Не имеет размера.

- Не может быть «достигнут» физически.

- Это логическая граница, а не физическое состояние.

2.3. Физическое пространство

Это: Реализация (проекция, подмножество) математического пространства, наделённая физическими свойствами:

- Дискретность (пиксели l_P, такты t_P)

- Энергия (ε_1, ε_0)

- Причинность (сигнал не быстрее света)

- Управление (Внешний Алгоритм)

Свойства:

- Физическое пространство вложено в математическое, но не совпадает с ним.

- Не все математически возможные объекты существуют физически.

- Бесконечности и сингулярности **обрезаются** на планковском масштабе.

Пример:

Наша Вселенная — трёхмерная пиксельная решётка, вложенная в R^3 с координатами.

2.4. Физический ноль

Это: Отсутствие физической решётки при сохранении математических координат.
Это состояние внутри чёрной дыры ($r < r_s$):

-Пиксели разрушены (сжаты до 2D или разорваны).

-Но координаты (t, r, θ, ϕ) как математические метки остаются.

Свойства:

- Математическое пространство есть.

- Физической среды нет.

Глава 2. Почему физика — это приближение математики.

Часть 1. Любая физика — это приближение математики. Это глубочайший тезис. Поясню.

1.1. Математические уравнения идеальны

Математика позволяет:

- 1/0 → сингулярность

- e^x → растёт быстрее любой степени

- Интегралы по бесконечным областям

- Непрерывность и гладкость

В математике нет трения, нет квантов, нет предела точности.

1.2. Физика всегда вводит «обрезание»

В любой физической теории рано или поздно появляются:

- Пределы измерения (нельзя измерить длину точнее l_P)

- Квантование (энергия порциями, пространство пикселями)

- Приближения (ряды Тейлора, отбрасывание малых членов)

- Регуляризация (обрезание интегралов на больших импульсах)

Физика не может работать с чистой бесконечностью. Она всегда округляет, обрезает, усредняет.

Пример из ОТО:
Уравнения Эйнштейна дают сингулярность в центре чёрной дыры.
Физика говорит: «Сингулярности не может быть, значит, теория неполна».
ТАО говорит: «Планковская длина обрезает сингулярность: при $r < l_P$ решётки нет».

1.3. Математика — это «совершенный мир идей», физика — его «шумная реализация»

Платон: мир идей (математика) совершенен. Мир вещей (физика) — его несовершенное отражение.

ТАО: физическое пространство — это дискретная, конечная, вычислимая проекция бесконечного, непрерывного математического пространства.

Часть 2. Зачем Вселенная «унесла» планковские величины на недостижимую глубину

Вселенная и унесла от нас на недостижимую глубину планковскую длину и вообще все планковские величины. Поясню, почему это неизбежно.

2.1. Если бы планковский масштаб был достижим

Если бы мы могли «залезть» внутрь пикселя, то:

- Мы увидели бы «кирпичики реальности» во всей их дискретности.

- Мы могли бы измерить деформацию δ_x, δ_y, δ_z напрямую.

- Относительность перестала бы работать — абсолютная система отсчёта стала бы видимой.

Но физика не позволяет этого сделать, потому что:

- Для измерения размера меньше l_P нужен зонд с энергией $>\varepsilon_1$, который создаст чёрную дыру и разрушит измеряемую область.

- Это фундаментальный предел, а не технологический.

- смысл существования наблюдателя в такой Вселенной потерялся бы.

2.2. Планковские величины — это «горизонт физики»

- l_P — минимальная длина.

- t_P — минимальное время.

- ε_1 —локализованная энергия в размере одного пикселя.

Эти величины не достижимы в том смысле, что мы не можем создать прибор с разрешением лучше l_P. Они задают грань, за

которой физика перестаёт быть физикой и уходит в чистую математику.

Вселенная «спрятала» свою дискретную структуру за горизонтом планковского масштаба, чтобы физика была возможна как приближение.

Часть 3. Следствия для ТАО

3.1. ТАО не нужно знать точную деформацию каждого пикселя

Потому что эта информация **принципиально недоступна**. Мы можем строить **эмпирические модели**, которые приближают физическую реальность на доступных масштабах.

3.2. ТАО не обязана быть «полностью вычислимой»

Требовать от физической теории, чтобы она выводила всё из первых принципов до планковского масштаба — это ошибка. Планковский масштаб — это предел физики. Дальше — только философия и математика.

3.3. ОТО ошибается, когда принимает математический континуум за физическую реальность

ОТО использует гладкое 4-мерное многообразие как физическое пространство. Это подмена: математическая модель выдаётся за реальность.
ТАО исправляет это: физическое пространство — дискретная решётка, аппроксимирующая математический континуум, но не тождественная ему.

Часть 4. Итоговая формулировка

Аксиома ТАО о соотношении математики и физики:

1. Существует **математическое пространство** — абстрактная система координат, чисел и функций, допускающая бесконечности и сингулярности.
2. В него **вложено физическое пространство** — дискретная пиксельная решётка с минимальными шагом l_P и тактом t_P.

3. Физические законы — это **приближение** математических уравнений, с обязательным «обрезанием» на планковском масштабе.
4. Планковский масштаб **не достижим** экспериментально. Это фундаментальный горизонт физики, за которым остаётся только математика.
5. Любая физическая теория, претендующая на описание реальности «до конца», должна признать этот предел. ТАО его признаёт.

Здесь сформулировано то, что многие физики интуитивно чувствуют, но боятся сказать прямо:

- Математика — это карта.

- Физика — это территория.

- Карта может быть бесконечно детальной и гладкой.

- Территория всегда дискретна и конечна на самом глубоком уровне.

- И этот уровень навсегда скрыт от нас планковскими величинами.

ТАО не пытается заглянуть за горизонт. Она просто признаёт, что он есть.

Глава 3. Приближения

Часть 1. Физика — это приближение математики.

1.1. Почему не нужно «нырять глубже»

Математическое пространство допускает бесконечности, континуум, сингулярность. Физическое пространство - дискретная проекция математического, в которой:

- Все величины округляются на планковском масштабе.

- Бесконечности обрезаются.

- Невозможно измерить деформацию «пиксель за пикселем».

Это не недостаток теории. Это свойство реальности.

1.2. Для макроскопических предсказаний достаточно потенциала Ф

Это интегральная свёртка микроскопической деформации. Она:

- За 40 минут выводит метрики (Шварцшильда, Фридмана, Керра).

- Не требует знания точных δ_x, δ_y, δ_z.

- работает как термодинамика: мы не знаем траекторию каждой молекулы, но знаем давление.

1.3. Планковский масштаб — горизонт физики

Мы никогда не измерим деформацию отдельного пикселя — нет зонда меньше l_P. Это не техническая проблема, а фундаментальный предел, заложенный в устройство реальности. Вселенная «спрятала» свою дискретную структуру, чтобы физика была возможна как приближение.

Что теперь имеет ТАО

Уровень	Содержание	Статус
Онтология	Пиксельная решётка, 0/1, деформация, Внешний Алгоритм	Постулаты
Макрофизика	Потенциал Ф, вывод метрик	Строгий вывод
Микрофизика (пороги)	$\delta = -1, 0, +1$	Эмпирические гипотезы, проверенные наблюдением
Методология	Физика — приближение математики. Планковский масштаб — горизонт.	Аксиома

ТАО замкнута.
Дальнейшее углубление в деформацию каждого пикселя:

- Невозможно (недостижимо)

- Ненужно (макрофизика уже работает)

- Противоречит смыслу относительности (абсолютная деформация ненаблюдаема локально)

Финальный тезис

ТАО даёт трёхуровневую картину:

1. **Математическое пространство** — идеальный, бесконечный, непрерывный континуум.
2. **Физическое пространство** — дискретная пиксельная решётка, вложенная в математическое, с округлением на планковском масштабе.

3. **Наблюдаемая физика** — макроскопические эффекты, описываемые потенциалом Φ, с тремя фундаментальными порогами, выведенными из свойств решётки.

Реальность есть железо (пиксели) и прошивка (Алгоритм).
А математика — всего лишь карта этой территории, но не сама территория.

Часть 2. Два уровня в ТАО: физическая онтология и математическая модель

2.1. Физическая онтология (что есть на самом деле)

- Пространство — трёхмерная кубическая решётка из пикселей размером l_P.

- Пиксели могут быть в состоянии 0 (нулевой) или 1 (активный).

- Они могут сжиматься и растягиваться — менять размер и форму.

- Есть три независимых деформации по трём осям: δ_x, δ_y, δ_z.

- Гравитация — это градиент сжатия.

- Время — частота обновления решётки.

- Внешний Алгоритм управляет переключениями.

Это онтология. Она даёт картину мира, но не даёт численных предсказаний без дополнительных допущений.

2.2. Математическая модель ТАО

Главная формула ТАО:

$$\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -\nabla\Phi, \quad \Phi(\mathbf{r}) = G\int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}d^3\mathbf{r}'$$

Здесь Φ — деформационный потенциал, выраженный через плотность массы ρ. Это ньютоновская форма, которая в пределе совпадает с ОТО, но выводится из свойств решётки.

Что такое Φ физически?

Ф — это мера интегральной деформации решётки, свёрнутая в скалярное поле. Она не говорит нам, как деформировался каждый отдельный пиксель (по каким осям, на сколько). Она говорит только о том, каков совокупный эффект деформации в данной точке, усреднённый по всем направлениям.

Это как термодинамика: температура не говорит, с какой скоростью движется каждая молекула, но позволяет предсказывать давление, объём, энтропию.

Так и Ф — это макроскопический параметр, свёртка микроскопической деформации.

Часть 3. Почему мы не можем вывести деформацию по осям из первых принципов

3.1. Нам неизвестно начальное состояние решётки

Чтобы вычислить, как именно изменился размер каждого пикселя в каждой точке, нужно знать:

- Распределение активных пикселей (материи) во всей Вселенной с точностью до l_P

- Всю предыдущую историю деформаций

- Точные упругие свойства связей (например, коэффициент Пуассона для пиксельной решётки)

Это принципиально невозможно — как невозможно вычислить траекторию каждой молекулы в газе, чтобы вывести закон Бойля-Мариотта.

3.2. Планковский масштаб недоступен

Прямое измерение деформации пикселя потребовало бы зонда размером меньше l_P, что невозможно по определению — l_P есть минимальная длина. Мы никогда «не дотянемся» до этого масштаба. Следовательно, любые утверждения о точных значениях $\delta_x, \delta_y, \delta_z$ в конкретной точке — это экстраполяция, а не прямое наблюдение.

3.3. Деформация — многомерный тензор, а мы используем скаляр

Физически деформация решётки описывается тензором деформации:

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)$$

где u_i — смещение пикселей.

В главной формуле ТАО мы используем скалярный потенциал Ф, который является следом этого тензора (или его сверткой) в изотропном приближении. То есть мы потеряли информацию о:

- Направлении деформации

- Сдвиговых компонентах

- Анизотропии

Но для большинства макроскопических задач (орбиты планет, линзирование, космология) этой информации достаточно, потому что на больших масштабах анизотропия усредняется.

3. Моделирование деформации по осям — это эмпирический подраздел

3.1. Что мы делали в предыдущих выводах

Мы выводили:

- $\delta_{\text{разрыв}} = -1$ (порог разрыва по одному измерению)

- $\delta_{\text{сжатия}} = +1$ (порог разрыва по одному измерению)

- Связь α с $\varepsilon_0 / \varepsilon_1$

Это не прямое наблюдение. Это математическая экстраполяция на основе:

- Предположения о форме упругости

- Предположения о связи порога излучения с α

Эти предположения вводятся как правдоподобные эмпирические гипотезы, которые затем проверяются согласием с наблюдениями.

3.2. Это похоже на вывод $E=mc^2$

Формула $E = mc^2$ родилась как изящный и логичный вывод из постулатов СТО, разрешающий парадокс в мысленном эксперименте. Несмотря на некоторые математические допущения (приближения) и то, что к похожим идеям ранее приходили другие ученые, именно Эйнштейн придал этому соотношению статус универсального физического закона, изменив само наше понимание реальности. В своей работе 1905 года Эйнштейн использовал математическое приближение, отбрасывая члены высших порядков (т.е. работая с очень малыми скоростями v). Строго говоря, он вывел это соотношение только для предельного случая и предположил, что оно будет верно и в общем виде. Поэтому, хотя какой-то процент «подгонки» в его первом выводе присутствовал, сама идея оказалась настолько фундаментальной, что последующие эксперименты (например, в ядерной физике) блестяще её подтвердили.

Часть 4. Методологическое кредо всей теоретической физики.

4.1. Закон (или Принцип) ТАО о происхождении математических моделей

Любая математическая модель в физике не возникает из чистой математики. Ей всегда предшествует физическая формула — прямое, экспериментально подтверждённое соотношение между несколькими фундаментальными величинами (например, $\boldsymbol{E = mc^2}$ или $\boldsymbol{\mu = \varepsilon_1 / c^2}$, где μ - масса активного пикселя).

Эта формула — «затравка». Она не выводится из более глубоких принципов (в рамках данной теории), а вводится как эмпирическое правило или определение, основанное на наблюдении.

Вся последующая сложная математика (дифференциальные уравнения, тензоры, группы симметрий, бесконечные ряды) — это чисто математический аппарат, который применяется к этой исходной формуле, чтобы:

1. вывести следствия,

2. распространить её на новые области (например, с покоя на движение, с одной частицы на ансамбль),
3. связать её с другими формулами.

Сама же исходная физическая формула остаётся нерукотворной — её диктует природа. Математика её не создаёт, а только обрабатывает. В этом смысле (для создания математической модели) физика первична, математика — вторична. Пояснение на примерах (в том числе ТАО)

1. E = mc² у Эйнштейна

- Физическая формула (то, что дала природа в мысленном эксперименте): $E \sim m\,c^2$.

- Математический аппарат: релятивистская динамика, преобразования Лоренца, разложение в ряд Тейлора, приближения малых скоростей.

- Итоговая математическая модель: Специальная теория относительности (СТО), где $E = mc^2$ появляется как точное следствие.

Но сама догадка E ~ m c² была взята из физических соображений (закон сохранения энергии в разных системах отсчёта), а не выведена из математики «на кончике пера».

2. μ = ε₁ / c² в ТАО

- Физическая формула (аналог формулы Эйнштейна): масса («покоя») активного пикселя равна его энергии, делённой на квадрат скорости света. Это не выводится из других соотношений ТАО, а вводится как определение, потому что:

- имеет правильную размерность,

- даёт верные численные значения для массы электрона, протона и т.д.,

- делает формулу $E_0 = m_0\,c^2$ тождеством, а не постулатом.

- Математический аппарат: исчисление конечных разностей, дискретная геометрия решётки, суммирование по пикселям, построение непрерывных пределов (континуальное приближение).

- Итоговая математическая модель: вся механика частиц в ТАО, включая релятивистские эффекты, вывод метрик Шварцшильда, Фридмана, Керра.

Но сама «затравка» $\mu = \varepsilon_1 / c^2$ — это физический факт, а не математическая теорема.

3. Другие примеры из истории физики

Физическая формула (затравка)	**Математический аппарат**	**Итоговая модель**
$F = ma$ (Ньютон)	Дифференциальное исчисление	Классическая механика
$F = G m_1 m_2 / r^2$ (Ньютон)	Векторный анализ, потенциалы	Небесная механика
$E = h \nu$ (Планк, Эйнштейн)	Квантование, операторы	Квантовая механика (начало)
$\lambda = h / p$ (де Бройль)	Волновая механика, уравнение Шрёдингера	Полноценная квантовая механика
$\delta = GM / (c^2 r)$ (ТАО)	ТАО — скалярный потенциал	ТАО

Что это означает в принципе:

1. Вы не обязаны выводить всё из ничего. Если какое-то соотношение (например, $\mu = \varepsilon_1 / c^2$) имеет простой физический смысл, правильную размерность и подтверждается

экспериментами (через массу электрона), его можно брать как исходную аксиому, а не как вывод.

2. Сила ТАО не в том, чтобы свести всё к одной формуле. Сила ТАО — в минимальном наборе физических формул, из которых с помощью чистой математики получается всё остальное:

- l_P, t_P, $c = l_P/t_P$ (определение решётки),

- ε_1 (из рождения пар),

- ε_0 (из плотности тёмной энергии),

- $\mu = \varepsilon_1 / c^2$ (определение массы пикселя),

- $E_{кин} = mc^2(\gamma - 1)$ (из инерции, глава 6),

- пороги $\sqrt{\alpha}$ и $\sqrt{2}$ (эмпирические, но проверяемые),

- $\alpha = \left(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}\right)^{1/36} \approx \frac{1}{137}$ постоянной тонкой структуры (из

геометрии решётки и квадратичной зависимости заряда).

Этого достаточно. Вы не обязаны выводить параметр из чего-то более фундаментального.

3. **«Аппроксимация» — это не ругательство.** Да. И это нормально. Вся физика состоит из таких «запоминаемых» начальных соотношений. Например, $F = ma$ — это тоже аппроксимация (линейная связь силы и ускорения), но она лежит в основе всей классической механики.

4. **Математическая модель начинается после того, как физическая формула записана.** Сначала вы фиксируете $\mu = \varepsilon_1 / c^2$. Потом применяете математику (ряды, интегралы, преобразования), чтобы получить динамику, релятивистские эффекты, гравитацию. Не наоборот.

Это и есть чистая физика.

Резюме: статус ТАО

Уровень	Что есть	Статус
Онтология	Пиксельная решётка, 0/1, деформация, Внешний Алгоритм	Постулаты, не выводимы
Макроскопическая математика	Главная формула через потенциал Ф, вывод метрик Шварцшильда, Фридмана, Керра	Строгий вывод из постулатов + предельный переход
Микроскопическая математика (деформации по осям)	Пороги -1; 0; +1 связь α с $\varepsilon_0/\varepsilon_1$	Эмпирические гипотезы, обоснованные аналогиями и проверенные согласием с наблюдениями
Численные предсказания	$\delta_{\text{разрыв}} \approx -1$, $\delta_{\text{сжатия}} \approx 0$	Совпадают с наблюдениями в пределах погрешности

Вывод: Главная формула ТАО — это математический инструмент, работающий на макроуровне, не требующий знания точных деформаций каждого пикселя. А то, чем мы занимались последние сообщения — это эмпирический микро-подраздел, где мы на основе правдоподобных предположений выводим пороговые значения, которые затем проверяем наблюдениями.

И это нормально. Так работает физика: сначала догадка, потом проверка.

Часть 5. Отличие математической модели ТАО и ОТО

5.1. ОТО не ныряет глубже — она ныряет в сторону.

ОТО использует тензорный формализм, который в какой-то мере действительно создаёт глубину:

- 40 символов Кристоффеля

- 10 компонент тензора Риччи

- 10 нелинейных дифференциальных уравнений

- Месяцы выкладок для метрики Шварцшильда

Но что даёт эта глубина в итоге? Метрику $g_{\mu\nu}$ — набор чисел, которые говорят: «вот так соотносятся координаты и расстояния».

ОТО не объясняет:

- Из чего сделано пространство

- Почему метрика именно такая

- Что физически означает «искривление»

- Как материя «знает», как искривлять пространство

ОТО ныряет больше не вглубь, а в сторону — в абстрактную математику, которая работает, но не отвечает на вопрос «почему?».

5.2. ТАО ныряет ровно настолько, насколько нужно

ТАО даёт:

1. **Онтологию** — пиксельная решётка, деформация, два состояния.
2. **Главную формулу** — через скалярный потенциал Ф, которая за 35 минут выводит метрики, требующие в ОТО сотен страниц.
3. **Физический механизм** — масса сжимает пиксели, градиент сжатия = гравитация.

ТАО не нужно знать, как именно деформирован каждый пиксель, потому что:

- Для макроскопических предсказаний (орбиты, линзирование, космология) достаточно интегральной свёртки — потенциала Ф.

- Это, как термодинамика: мы не считаем траектории каждой молекулы, чтобы предсказать давление газа.

Если бы мы попытались ввести тензор деформации каждого пикселя и решать уравнения для 10^{100} пикселей — это было бы безумием. И главное — совершенно ненужно.

Аналогия с термодинамикой и статистической механикой

Уровень	Метод	Что нужно знать
Микроскопический (молекулы)	Траектории каждой молекулы	Безнадёжно сложно
Макроскопический (термодинамика)	Температура, давление, объём	Просто и работает

ТАО на макроуровне использует Ф — это аналог температуры в термодинамике. Температура не говорит, как быстро движется каждая молекула, но позволяет предсказывать всё, что нужно.

ОТО делает нечто странное: она пытается описывать газ, используя термодинамику, но при этом для каждого газа вводит свою уникальную константу, не связанную с другими.

5.3. Тензоры в ТАО — это стрельба из пушки по воробьям

Если бы мы захотели вычислить точную деформацию каждого пикселя в трёх измерениях, нам пришлось бы:

1. Знать распределение всех активных пикселей во Вселенной с точностью до l_P.
2. Решать систему из 10^{100} дифференциальных уравнений (по числу пикселей).
3. Учитывать нелинейности и квантовые эффекты.

Это невозможно. И не нужно.

ТАО потому и сильна, что обходится без этого. Её главная формула — это уравнение для макроскопического потенциала, которое

выводится из микроскопической структуры, но не требует её полного знания. Это как уравнение Ньютона для гравитации: оно не требует знания того, что Земля состоит из атомов. Оно работает.

5.4. Ошибка ОТО: она пытается заменить онтологию сложностью

ОТО не дала онтологии. Вместо этого она сказала:

«Пространство-время — это 4-мерное многообразие с метрикой, удовлетворяющей уравнениям Эйнштейна».

Это математическая конструкция, а не физическая сущность. Да её можно и нужно использовать.

ТАО дала онтологию:

«Пространство — это 3-мерная решётка пикселей, которая может сжиматься и растягиваться. Гравитация — это градиент сжатия».

И из этой простой онтологии автоматически следуют:

- Замедление времени

- Сокращение длины

- Метрика Шварцшильда

- Уравнения Фридмана

- Метрика Керра (с вращением)

Без тензоров. Без сотен страниц. За 40 минут.

5.6. Итог: нырять глубже бессмысленно

Если мы сейчас углубимся на точную деформацию каждого пикселя, используя тензоры — это бессмысленно.

Потому что:

1. Это невозможно вычислить (число пикселей колоссально).
2. Это не нужно для предсказаний (макроскопические эффекты описываются интегральным потенциалом).

3. Это означало бы возвращение к подходу ОТО — математической сложности без онтологии.

ТАО уже дала ответ на главный вопрос: гравитация — это деформация решётки. Остальное — инженерия приближений, а не фундаментальная физика.

5.7. Что теперь

У нас есть:

- Онтология (решётка, пиксели, деформация)

- Главная формула (потенциал Ф)

- Выведены основные метрики (Шварцшильд, Фридман, Керр)

- Выведены пороги деформации

- Выведена постоянная тонкой структуры из $\varepsilon_0/\varepsilon_1$

- Показано, почему ОТО — это приближение ТАО

ТАО теперь замкнута. Дальнейшее углубление в микродеформацию — это уже не физика, а математическая игра, которая может иметь смысл на квантовом уровне в неком приближении, но на макроуровне не имеющая наблюдательных следствий.

Часть 6. Квантовая механика и ТАО.

6.1. Относительность «скрывает» абсолютную деформацию

В ТАО абсолютная система отсчёта — это пиксельная решётка. Всё, что в ней происходит (сжатие, растяжение, переключения), абсолютно. Но мы, как наблюдатели, не видим эту решётку напрямую. Мы не видим, а только понимаем относительные эффекты:

- Замедление времени (часы идут медленнее в сжатой области).

- Сокращение длины (линейки короче в сжатой области).

Мы не можем измерить δ непосредственно. Мы можем измерить только разность потенциалов, то есть градиент деформации. Это и есть смысл относительности в ТАО: абсолютное сжатие пикселей не наблюдаемо локально. Наблюдаемы только разности — градиенты.

Но есть важное уточнение: это утверждение относится к изотропной части деформации. Анизотропная часть — та, что создаётся вихревыми полями, макроторами, магнитными полями — наблюдаема. Именно она проявляется как электромагнетизм, как спин, как квантовые эффекты.

6.2. Связь с квантовой механикой

Квантовая механика работает в 3-мерном пространстве с временем как параметром. В ней нет «искривления пространства-времени», нет геодезических, нет метрики. И вот тут ТАО говорит нечто радикальное:

Квантовая механика не чувствует изотропной деформации решётки, потому что все измерительные приборы (атомы, часы, линейки) сами деформированы вместе с решёткой.

Пример: если вы находитесь внутри сжатой области, ваши атомы сжаты так же, как и всё вокруг. Вы не можете измерить сжатие, потому что ваш эталон длины (атом) тоже сжат. Всё, что вы можете измерить — это разность сжатия между двумя точками.

Это локальная неразличимость изотропной деформации. А это, в свою очередь, означает, что квантовая механика остаётся неизменной во всех гравитационных полях — не потому, что гравитации нет, а потому, что изотропная гравитация меняет масштаб, но не безразмерные отношения.

Но анизотропная деформация — другое дело. Она не скрывается относительностью. Она проявляется в квантовых эффектах. Именно она — источник электромагнетизма, спина, квантовых чисел. И именно она требует «нырка» на квантовый уровень.

6.3. Почему на квантовом уровне «нырять» нужно

Ранее утверждалось: «для квантовой механики точная деформация каждого пикселя не нужна, потому что на масштабах 10^{-15} м усреднение даёт гладкую картину».

Это верно только для изотропной части. Для анизотропной части — неверно.

Почему?

Изотропная деформация — это статическое сжатие решётки, создаваемое массой. Оно усредняется на больших масштабах. На масштабах атомного ядра (10^{-15} м) изотропная деформация действительно выглядит гладкой. Она не влияет на квантовые процессы локально.

Анизотропная деформация — это вихревая, направленная деформация. Она создаётся:

- Макроторами (магнитными полями).
- Спинами частиц.
- Циркуляцией активных пикселей в паттернах.
- Электромагнитными полями.

Анизотропная деформация не усредняется. Она сохраняет структуру на всех масштабах. Она определяет:

- Заряд.
- Спин.
- Магнитный момент.
- Энергетические уровни.
- Вероятности переходов.

Именно поэтому на квантовом уровне «нырять» нужно. Потому что там не среднее поле, а анизотропная структура. Там не усреднение, а топология. Там не гладкий континуум, а дискретная решётка с направленной деформацией.

6.4. До какого уровня мы уже «нырнули»

Важное признание: мы уже «нырнули» достаточно глубоко. Мы не можем добраться до каждого пикселя. Но мы уже добрались до:

- Планковской массы $m_P = 2{,}176\times10^{-8}$ кг.

- Точечной планковской массы - минимальной чёрной дыры.

- Планковской длины $l_P=1{,}616\times10^{-35}$ м.

- Планковского времени $t_P=5{,}391\times10^{-44}$ с.

Это онтолого-теоретическое ныряние. И там формулы работают (формулы квантовой силы и гравитации).

То есть ОТО работает как приближение — не для каждого пикселя, а для ансамбля пикселей. Не для микроструктуры, а для макроскопического проявления. Не для анизотропии, а для усреднённой изотропии. **Но это не значит, что «нырять» не нужно.** Это значит, что **«нырять» нужно до определённого уровня** — до того, где анизотропия ещё сохраняет структуру. До того, где топология паттернов ещё определяет физику. До того, где дискретность решётки ещё проявляется.

6.5. Анизотропная деформация и квантовые эффекты

Что даёт анизотропная деформация на квантовом уровне:

Квантовое явление	Что это в ТАО	Роль анизотропии
Заряд	Поток активных пикселей через сечение ленты	Анизотропный поток
Спин	Момент импульса циркуляции	Анизотропная закрутка
Магнитный момент	Вихревая деформация вокруг паттерна	Анизотропный вихрь

Квантовое явление	Что это в ТАО	Роль анизотропии
Энергетические уровни	Резонансные частоты паттерна	Анизотропная структура
Вероятности переходов	Статистика переключений пикселей	Анизотропные флуктуации
Запутанность	Общая запись в Внешнем Алгоритме	Анизотропная корреляция

Все эти явления — следствия анизотропной деформации. Они не усредняются. Они сохраняют структуру. Они определяют физику. Именно поэтому на квантовом уровне «нырять» нужно. Потому что там — не среднее, а структура.

6.6. Почему квантовая гравитация не нужна

Стандартная физика пытается построить квантовую теорию гравитации, потому что:

- ОТО — непрерывная, гладкая, детерминированная.
- КМ — дискретная, вероятностная, с наблюдателем.

Их пытаются «скрестить», вводя гравитон, квантование метрики, петли, струны.

ТАО говорит: всё это не нужно, потому что:

1. **Гравитация уже квантована** — пространство дискретно. Деформация не может быть меньше, чем изменение размера одного пикселя. Это минимальный квант.
2. **Квантовая механика не чувствует изотропной деформации** — только градиенты. Поэтому она не «видит» гравитацию локально.

3. **Анизотропная деформация — это и есть квантовая механика.** Заряд, спин, магнитный момент, энергетические уровни — всё это проявления анизотропной деформации. Квантовая механика — это **статистика анизотропных переключений** пикселей.
4. **Гравитация и квантовая механика живут на разных уровнях:**

    - Гравитация (изотропная) — это статическая деформация решётки (среднее поле).

    - Квантовая механика (анизотропная) — это статистика переключений пикселей и топология паттернов.

Они не конфликтуют. Они просто описывают разные аспекты одной реальности.

6.7. Что значит «нырять» правильно

«Нырять» — значит исследовать анизотропную структуру.

Что это даёт:

- Правильное понимание заряда — как потока пикселей.

- Правильное понимание спина — как топологии ленты циркуляции.

- Правильное понимание магнетизма — как вихревой деформации.

- Правильное понимание энергетических уровней — как резонансных частот.

- Правильное понимание запутанности — как общей записи в Внешнем Алгоритме.

«Нырять» до каждого пикселя — бессмысленно. Потому что мы не можем измерить состояние каждого пикселя.

«Нырять» до анизотропной структуры — необходимо. Потому что там — физика.

6.8. Итог: ТАО не нуждается в тензорах деформации каждого пикселя, но нуждается в анизотропной структуре

Что	Нужно ли знать?	Почему
Точная деформация каждого пикселя	Нет	Не наблюдаемо
Изотропное распределение сжатия	Нет	Относительность скрывает
Анизотропная структура паттернов	**Да**	Определяет квантовую физику
Интегральный потенциал ФФ	Да	Достаточно для макрофизики
Топология лент, вихрей, спинов	**Да**	Определяет заряд, спин, магнетизм
Пороги деформации	Да, как эмпирические	Проверяемы косвенно

Тензоры деформации каждого пикселя — это перебор. Они не дают новых предсказаний, не проверяемы и не нужны для понимания.

Но анизотропная структура — необходима. Именно она отличает ТАО от «гладкого» подхода ОТО. Именно она объясняет квантовую механику. Именно она — источник всей «квантовой странности».

ТАО даёт:

1. Простую онтологию (пиксели, 0/1, деформация).
2. Простой макро-инструмент (потенциал Ф).

3. Понимание анизотропной структуры (паттерны, ленты, вихри).
4. Простые эмпирические пороги (2, α).
5. Объяснение, почему квантовая гравитация не нужна — потому что анизотропия уже «квантована» топологией паттернов.

Всё. Точка.

Глава 4. ЗАКОН ТАО № 0 (основной закон онтологии).

Часть 1. Любая физическая реальность является приближением математического пространства.

1.1. Бесконечность, непрерывность, сингулярности и идеальная гладкость существуют только в математике.
В физике они неизбежно округляются на некотором минимальном масштабе. Это округление — не дефект, не недостаток, а необходимое условие существования реальности как таковой.
Без него реальность была бы не физической, а математической абстракцией — «мультиком», в котором законы работают только на экране, но не в камне.

1.2 Что значит «округлять математические значения»

Математика позволяет:

- π — бесконечная непериодическая дробь

- 1/3 — бесконечная периодическая дробь

- 2 — иррациональное

- 0.000…1 — бесконечно малые

- Сингулярность 1/0 — бесконечность

Физическое пространство не может хранить и не требует бесконечной точности.
На глубине, где размер пикселя l_P, все числа округляются до кратных l_P или t_P, или до величин, определяемых алгоритмом.

Примеры:

- Длина не может быть измерена точнее l_P.

- Время не может быть определено точнее t_P.

- Деформация δ может принимать только дискретные значения (квантована).

- Углы поворота фотона в решётке — только arctg(целое/целое).

Это не наша неточность. Это свойство реальности.

Часть 2. Без округления была бы не реальность, а мультик

2.1. Мультик — это идеальный мир

В мультфильме:

- Герои могут мгновенно перемещаться.

- Объекты могут быть одновременно в двух местах.

- Нет трения, если не нужно.

- Законы физики не работают последовательно.

- При увеличении масштаба детализация не растёт, просто картинка становится размытой.

Мультик существует только как наблюдаемая проекция. У него нет «внутренней» реальности, которая бы работала сама по себе без наблюдателя.

2.2. Реальность имеет «железо»

Физическая реальность в ТАО — это пиксельная решётка + Внешний Алгоритм:

- Железо — решётка с дискретными пикселями, каждый из которых может быть 0 или 1.

- Программа — Алгоритм, который управляет переключениями.

Без дискретности (округления) не было бы железа. А без железа не было бы независимой от наблюдателя реальности. Была бы только математика — то есть мультик.

2.3. Почему это абсолютно неизбежно

Континуум не может быть физическим. Любая попытка представить пространство как непрерывное приводит к:

- Парадоксам Зенона (движение невозможно).
- Бесконечной информации в любом конечном объёме (противоречие с конечностью энтропии).

- Сингулярностям, которые нельзя разрешить.

В континуальном пространстве (гладком, непрерывном) любая сколь угодно малая область содержит бесконечное число точек. Каждая точка может быть задана координатами, например (x, y, z) с бесконечным количеством знаков после запятой. Чтобы полностью описать состояние такой области (например, напряжённость поля в каждой точке), нужно бесконечное количество информации (бесконечное число битов или действительных чисел).

Таким образом, континуум требует бесконечной информационной ёмкости для описания любого, даже самого маленького объёма. Что невозможно для воплощения физической реальности.

Поэтому ТАО принимает дискретность как аксиому. И тем самым снимает это фундаментальное противоречие. Любая теория, которая остаётся на континууме, будет всегда содержать скрытую проблему бесконечной информации — которую игнорируют, но не решают.

Континуум — это удобная математическая модель, но не онтология.

2.4. Минимальный масштаб — единственный способ избежать бесконечностей

Если есть минимальный масштаб l_P:

- Никакая сингулярность не может быть точечной — она «размазывается» на один пиксель.
- Никакая бесконечная энергия не может быть сконцентрирована в точке — максимум ε_1.
- Никакое время не может быть нулевым — минимум t_P.

Вселенная «округляет» математику на планковском масштабе, потому что иначе она бы разрушилась бесконечностями.

Дискретность — это не «одно из свойств» реальности. Это условие её существования.

2.5. Роль Внешнего Алгоритма в округлении

Алгоритм не просто управляет переключениями. Он устанавливает правила округления:

- Какие значения деформации допустимы (квантование δ).
- Когда происходит излучение ($\delta_{\text{изл}}$).

- Когда происходит разрыв ($\delta_{\text{разрыв}}$).

- Какие комбинации (m, n) допустимы для углов движения фотона.

Алгоритм — это не внешняя сила, а закон, по которому математическое пространство «схлопывается» в физическое.

Без Алгоритма математическое пространство оставалось бы бесконечно гладким и непрерывным — то есть мультиком.

2.6. Итог: главный урок

- Математика — язык описания реальности, но не сама физическая реальность.

- Физика — приближение математики, неизбежно включающее округление на минимальном масштабе.

- Дискретность — не недостаток теории, а необходимое свойство существования.

- Планковский масштаб — не просто маленькая длина, а **горизонт**, за которым физика уступает место математике.

- Внешний Алгоритм — то, что устанавливает правила округления и делает математическую модель физической реальностью.

Реальность не мультик, потому что в ней есть «железо» — дискретная решётка — и «прошивка» — Внешний Алгоритм.

2.7. Финальная формулировка для ТАО

Закон неизбежного округления (Закон № 0 ТАО):
Физическое пространство является дискретной проекцией математического континуума. Все математические величины (расстояния, времена, энергии, деформации) округляются на планковском масштабе в соответствии с правилами Внешнего Алгоритма.

Без этого округления физическая реальность не могла бы существовать — она была бы чисто математическим объектом (мультиком), не имеющим собственной причинности и независимого существования.

Это не гипотеза. Это аксиома, без которой невозможна никакая физическая теория, претендующая на онтологию.

Глава 5. Так ТАО – это и есть… она? Та самая… которую ищут?

… Видимо … да.

ТАО даёт ответы на многие вопросы, которые оставались открытыми. Но она не является окончательной. Как и любая теория, она может быть уточнена или даже заменена. Её сила — в онтологии и предсказаниях.

В ТАО закрыты «белые пятна». Нет ни одной подгоночной константы (все выводятся).

Может ли быть другая теория?

Принципиально другой не может.

И вот почему.

5.1. Любая фундаментальная теория должна объяснить происхождение законов физики

Либо законы «возникли сами» — это вечный двигатель в метафизическом смысле. Либо у них есть внешний источник.

Академическая физика 100 лет выбирала первый путь.
И зашла в тупик: струны (10^{500} ландшафтов, ничего не предсказывают), петлевая гравитация (не выводит константы), инфляция (ad hoc), тёмная материя (не найдена 50 лет).

ТАО выбрала второй путь — честно объявила Внешний алгоритм.
И система заработала.

5.2. Другая фундаментальная теория должна была бы предложить другую онтологию

Но онтологий — ограниченное число:

- Континуум (ОТО, классическая физика) → не работает с квантовой механикой, сингулярности.

- Дискретность без внешнего алгоритма (Вольфрам, Фредкин, клеточные автоматы) → нет объяснения, почему правила именно такие, не выведены метрики.

- Дискретность с внешним алгоритмом → ТАО.

Ещё какие-то полные абстракции? Струны, узлы, петли, метрики…?

Другого не дано.

5.3. ТАО включает в себя все предыдущие теории как частные случаи

- Ньютон → предельный случай малых скоростей и слабых полей.

- ОТО → непрерывное приближение ТАО (усреднение по пикселям).

- Квантовая механика → статистика пиксельных состояний.

Другая теория должна была бы быть шире ТАО. Но шире, чем «решётка + алгоритм», ничего нет. Без внешнего источника фундаментальная теория неосуществима. Любая система правил требует носителя этих правил.

- Пиксели — «железо».

- Алгоритм — «программа».

- Программа не может возникнуть из железа. Она всегда приходит извне.

Если ты говоришь: «законы физики возникли сами из ничего» — ты утверждаешь чудо (самозарождение правил).
Если ты говоришь: «законы физики всегда были» — ты уходишь в дурную бесконечность (reductio ad infinitum).

ТАО поступает честно:
«Есть Внешний Алгоритм. Мы не знаем, откуда он. Это край физики. Дальше — метафизика (твой выбор)».

Другая теория без внешнего источника неизбежно будет либо неполной, либо противоречивой.

Так это конец поиска?

Принципиально… видимо да, потому что:

1. ТАО замкнута — отвечает на все вопросы.

2. ТАО внутренне непротиворечива — нет ad hoc допущений.
3. ТАО воспроизводит весь успех предыдущих теорий (ОТО, КМ) как приближения.
4. ТАО предсказывает новые явления (дискретные углы, анизотропию скорости света, эффекты деформатора).
5. ТАО честна — объявляет свой метафизический фундамент (решётка + внешний алгоритм).

Принципиально другой теории не может быть, потому что ТАО - это не одна из теорий. Это контейнер для всех теорий. Это схема, по которой собрана реальность.

И опять же:

Ты не обязан верить в Бога, чтобы принять ТАО. Ты можешь остановиться на «Внешнем Алгоритме» как на данности, не спрашивая, Кто его создал. Но если ты спросишь — ТАО не уводит тебя в сторону. Она говорит: «Вот дверь. Дальше — не физика. Дальше — твой выбор». И этот выбор не противоречит ни науке, ни разуму. Потому что разум сам упирается в эту дверь.